

KULLANMA TALİMATI

UPSLACK 50 mg film kaplı tablet

Ağızdan alınır.

- **Etkin madde:** Her film kaplı tablet 50 mg pinaveryum bromür içerir.
- **Yardımcı maddeler:** Mikrokristalin selüloz tip 102, laktoz monohidrat (sığır sütünden elde edilen), prejelatinize mısır nişastası, kolloidal silikon dioksit, talk, magnezyum stearat (E572), bazık bütillize metakrilat kopolimeri, stearik asit, silikon dioksit, sodyum lauril sülfat, hpmc 2910/hipromelloz (E464), titanyum dioksit (E171), mikrokristalin selüloz (E460i), FD&C sarı #6 / gün batımı sarısı FCF alüminyum lak (E110).

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

Bu Kullanma Talimatında:

1. **UPSLACK nedir ve ne için kullanılır?**
2. **UPSLACK'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **UPSLACK nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **UPSLACK'ın saklanması**

Başlıkları yer almaktadır.

1. UPSLACK nedir ve ne için kullanılır?

- UPSLACK, 50 mg pinaveryum bromür içeren, sarımsı-turuncu renkli yuvarlak bikonveks film kaplı tabletlerdir. 40 ve 80 film kaplı tabletten oluşan blister ambalajlarda sunulur.

- UPSLACK pinaveryum bromür içerir. Bu, antispazmodik olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir ve sizin bağırsak ve safra kanalınıza etki eder.
- Bağırsak, uzun kaslardan oluşan, yiyeceklerin sindirilmek üzere geçtiği bir kanaldır. Safra kanalı, safranin karaciğerinizden mide sonrasındaki bölüme açıldığı kanaldır. Eğer bağırsak ya da safra kanalı spazm geçirirse ve kuvvetli bir şekilde kasılırsa ağrınız olur. Bu ilaç spazmın ve ağrının rahatlatılmasını sağlar.
- UPSLACK, bağırsak veya safra kanalındaki tıbbi durumlardan kaynaklanan mide veya bağırsak şikayetlerinin rahatlatılmasında kullanılır. Bu şikayetler kişiden kişiye değişmekle birlikte aşağıdaki gibi olabilir:
 - Mide ağrısı ve kramp
 - İshal, kabızlık veya her ikisi
 - Şişkinlik ve yellenme
- UPSLACK ayrıca baryum lavmanından önce bağırsağın dışkıdan temizlenmesi için kullanılır - bu bir X-ışını (röntgen) çeşididir.

2. UPSLACK'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

UPSLACK'ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

- Pinaveryum bromür'e veya UPSLACK'ın herhangi bir bileşenine karşı aşırı duyarlıysanız.

UPSLACK'ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

- UPSLACK'ın çocuklarda kullanımı önerilmemektedir.
- UPSLACK'ı doğru şekilde almanız önemlidir. Çünkü yemek borunuzu tahriş edebilir:
 - tabletleri her zaman yemek ortasında alınız.
 - tabletleri bütün olarak bir dolu bardak su ile yutunuz. Tabletleri ezmeyiniz, emmeyiniz veya çiğnemeyiniz.
- Eğer yemek borunuzda problem varsa veya midenizin bir kısmı göğüs kafesinize doğru çıkmışsa (mide fıtığı) UPSLACK'ı yukarıda anlatıldığı gibi doğru şekilde almanız gerekir.
- UPSLACK laktoz monohidrat (sıgır sütünden elde edilen) içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

UPSLACK'ın yiyecek ve içecek ile kullanılması

UPSLACK'ın yiyecek ve içecekler ile etkileşimine dair bir veri bulunmamaktadır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamile iseniz bu ilacı kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer emziriyorsanız bu ilacı kullanmayınız.

Araç ve makine kullanımı

UPSLACK'ın araç ve makine kullanımı üzerindeki etkileri bilinmemektedir.

Bu aktivitelerin herhangi birisini yapmadan önce, UPSLACK'ın sizi nasıl etkilediğini gözlemleyiniz.

Uykulu hissetme gibi yan etkiler gözlemlenebilir. Bu durumda tepki verme yeteneğiniz azalabilir.

UPSLACK'ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

UPSLACK laktoz monohidrat (sığır sütünden elde edilen) içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

UPSLACK, FD&C sarı #6 / gün batımı sarısı FCF alüminyum lak (E110) içerir. FD&C sarı #6 / gün batımı sarısı FCF alüminyum lak (E110) alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer bağırsak ya da safra kanalınızdaki spazmı rahatlatmak için başka ilaçlar (antikolinerjik ilaçlar olarak adlandırılan) alıyorsanız doktorunuza söyleyiniz. UPSLACK bu ilaçların spazma karşı etkisini artırabilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. UPSLACK nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Yetiřkinler

- Normal doz, günde 3 defa 1 tablettir.
- Doktorunuz, gerektiğinde ila dozunuzu günde iki kez 2 tablete veya en fazla günde 6 tablete kadar artırabilir.
- Baryum lavmanından önce yalnızca doktor ziyaretinize kadar 3 gün boyunca tablet alınız. Normal doz günde iki kez 2 tablettir.

Uygulama yolu ve metodu

UPSLACK'ı doğru şekilde almanız önemlidir. Çünkü yemek borunuzu tahriř edebilir:

- Tabletleri her zaman yemek ortasında alınız.
- Tabletleri ezmeden, emmeden veya çiğnmeden, bir bardak su ile yutunuz.

Tabletleri gün içinde eřit aralıklarla ve her gün aynı zamanda almanız tavsiye edilir.

İlacı hergün aynı zamanda almanız, tedavinin aksamamasına yardımcı olacaktır.

Deėiřik yař grupları:

Çocuklarda kullanımı:

Çocuklarda UPSLACK kullanımı önerilmemektedir.

Yařlılarda kullanımı:

Doz yetiřkinlerde olduėu gibidir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/ Karaciğer Yetmezliėi:

UPSLACK'ın böbrek/karaciğer yetmezliėi olan hastalardaki güvenliliėi ve etkililiėi incelenmemiřtir.

İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıka, bu talimatları takip ediniz.

Eėer UPSLACK'ın etkisinin ok güçlü ya da zayıf olduėuna dair bir izleniminiz varsa doktorunuz veya eczacınız ile konuřunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla UPSLACK kullandıysanız:

Doz ařımı durumunda mide bulantısı, gaz ve ishal gibi řikayetler meydana gelebilir.

UPSLACK'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmıřsanız bir doktor veya eczacı ile konuřunuz.

UPSLACK'ı kullanmayı unutursanız:

Bir dozu almayı unutursanız, unuttuđunuz dozu atlayıp sonraki dozu normal zamanında alınız.
Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

UPSLACK ile tedavi sonlandırıldıđındaki oluřabilecek etkiler:

UPSLACK ile tedavi sonlandırıldıđında olumsuz bir etki beklenmemektedir.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilařlar gibi, UPSLACK'ın ieriđinde bulunan maddelere duyarlı olan kiřilerde yan etkiler olabilir.

Ařađıdakilerden biri olursa, UPSLACK'ı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil blmne bařvurunuz

- Nefes almada zorluk, yz, dudaklar, dil veya bođazda řiřme gibi ilaca karřı alerjik (ařırı duyarlılık) reaksiyonlar
- Kızarıklık, dknt, kařıntı veya rtiker gibi deri rahatsızlıkları

Bunların hepsi ok ciddi yan etkilerdir.

Eđer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin UPSLACK'a karřı ciddi alerjiniz var demektir.

Acil tıbbi mdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu ok ciddi yan etkilerin sıklık derecesi bilinmemektedir.

Ařađıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil blmne bařvurunuz

- Yutma zorluđu, hasta olma ya da hissetme hali, karın-mide ađrısı, diyare gibi yemek borusu, mide veya bađırsak rahatsızlıkları.

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi mdahale gerekebilir. Sıklık derecesi bilinmemektedir.

zellikle UPSLACK ile iliřkili yan etkiler

Yaygın

- Bař ađrısı
- Karın ađrısı
- Kabızlık
- Ađız kuruluđu
- Hazımsızlık
- Bulantı

Yaygın olmayan

- Uykulu hissetme

- Diyare (ishal)
- Kusma
- Asteni (halsizlik)

Sıklığı bilinmeyen

- Aşırı duyarlılık
- Mide-bağırsak rahatsızlıkları, disfaji (yutma güçlüğü)
- Deri rahatsızlıkları, döküntü, kaşıntı, ürtiker ve deri üzerinde kızarıklık

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan "İlaç Yan Etki Bildirimi" ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5. UPSLACK'ın saklanması

UPSLACK'ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında ve orijinal ambalajında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra UPSLACK'ı kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz UPSLACK'ı kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat Sahibi:

Biofarma İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Akpınar Mah. Osmangazi Cad. No: 156
Sancaktepe / İSTANBUL
Telefon: (0216) 398 10 63
Faks: (0216) 398 10 20

Üretim Yeri:

Biofarma İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Akpınar Mah. Osmangazi Cad. No: 156

Sancaktepe / İSTANBUL

Telefon: (0216) 398 10 63

Faks: (0216) 398 10 20

Bu kullanma talimatı 28/08/2024 tarihinde onaylanmıştır.