

KULLANMA TALİMATI

DERİVERİN® Merhem

Cilt üzerine uygulanır.

- **Etkin madde:** Her 25 gram krem etkin madde olarak 2.50 g alüminyum hidroksit jel (kuru), 1.25 g çinko oksit, 1.25 g borik asit ve 1.25 g peru balsamı içerir.
- **Yardımcı maddeler:** Polietilen glikol 4000, polietilen glikol 400, setil alkol

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

Bu kullanma talimatında:

1. **DERİVERİN nedir ve ne için kullanılır ?**
2. **DERİVERİN 'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **DERİVERİN nasıl kullanılır ?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **DERİVERİN 'in saklanması**

Başlıkları yer almaktadır.

1. DERİVERİN nedir ve ne için kullanılır ?

DERİVERİN yarı-katı, deve tüyü rengi, 25 gram krem içeren alüminyum tüp içinde kullanıma sunulan merhemdir.

DERİVERİN, iltihaplı ve mikrop kapmış deri hastalıklarında, sürekli yatmaya ya da aynı pozisyona bağlı yaralarda, akne ve iltihaplı kabartılarda, deri döküntülerinde, terleme sonucu bebeklerin kasık ve koltuk altlarında oluşan iltihaplı kızarıklık ve pişiklerde kullanılır.

2. DERİVERİN 'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

DERİVERİN 'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer içeriğinde bulunan maddelere karşı allerji durumunuz varsa DERİVERİN'i kullanmayınız.

DERİVERİN 'in yiyecek ve içecek ile kullanılması:

DERİVERİN haricen kullanılır. Bu sebeple DERİVERİN'i yiyeceklerle temas ettirmeyiniz.

Hamilelik:

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamileliğinizin esnasında gerekli olmadığı sürece DERİVERİN kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme:

Emzirme döneminde doktorunuza danışmadan DERİVERİN kullanmayınız.

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Araç ve makine kullanımı

DERİVERİN 'in araç ve makine kullanma yeteneğiniz üzerine herhangi bir etkisi bildirilmemiştir.

DERİVERİN'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Deriverin içeriğinde bulunan peru balsamı deri reaksiyonlarına , setil alkol kontakt dermatit gibi lokal deri reaksiyonlarına sebebiyet verebilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

DERİVERİN'in herhangi bir ilaçla etkileşimine rastlanmamıştır.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. DERİVERİN nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Sadece dışarıdan (haricen) kullanım içindir. Yutmayınız!

Günde bir veya iki kez, doktorunuzun tavsiyesine uygun şekilde tekrarlanır.

Uygulama yolu ve metodu:

DERİVERİN yaranın iyice temizlenmesinden ve pansumanından sonra, etkilenmiş yüzeye ince bir tabaka halinde uygulanır. Sivilce ve bebek pişiklerinde etkili yüzeyi kaplayacak kadar uygun bir miktarda merhem, alan üzerinde iyice yayılır ve hafifçe oğuşturulur.

Çocuklarda kullanım:

Çocuklarda kullanımı kısıtlayan özel bir durum yoktur.

Yaşlılarda kullanım:

Yaşlılarda kullanımı kısıtlayan özel bir durum yoktur.

Özel kullanım durumları:

Karaciğer/Böbrek yetmezliği :

Karaciğer ve böbrek yetmezliği gibi hastalıklarda kullanımı kısıtlayan özel bir durum yoktur.

Kullanmanız gerekenden fazla DERİVERİN kullandıysanız:

DERİVERİN'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Etkin maddenin uygulama yolu dikkate alındığında zehirlenme mümkün değildir.

Ancak kaza ile yutulması durumunda hastanın semptomlarına yönelik uygun tedavi uygulanmalıdır. Böyle bir durumda lütfen doktorunuza başvurunuz.

Özel bir panzehiri yoktur.

DERİVERİN 'i kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları engellemek için çift doz almayınız.

Eğer DERİVERİN 'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, DERİVERİN'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, DERİVERİN'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

- Soluk almada güçlük, ani ve şiddetli deri döküntüsü

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin DERİVERİN'e karşı ciddi alerjiniz var demektir.

Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

- İlacı sürdüğünüz bölgede kızarıklık,
- İlacı sürdüğünüz bölgede kaşıntı,
- İlacı sürdüğünüz bölgede hassasiyet

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5. DERİVERİN 'in saklanması

DERİVERİN 'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Bu ilacı, 25 °C'nin altındaki oda sıcaklığında, ışıktan uzakta ve kapağı kapalı olarak saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız

Ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra DERİVERİN 'i kullanmayınız

Ruhsat Sahibi:

ADEKA İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Necipbey Cad. No: 88, 55020 – Samsun

Tel: (0362) 431 60 45-46

Fax:(0362) 431 96 72

Üretici:

ADEKA İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Necipbey Cad. No: 88, 55020 – Samsun

Tel: (0362) 431 60 45-46

Fax:(0362) 431 96 72

Bu kullanma talimatı tarihinde onaylanmıştır.