

KULLANMA TALİMATI

AVERFLU % 0,3 göz damlası, çözelti

Göze damlatılarak uygulanır.

Steril

- **Etkin madde:** Her mL’de 3 mg flukonazol içerir.
- **Yardımcı maddeler:** Disodyum fosfat dodekahidrat, sodyum dihidrojen fosfat monohidrat, propilen glikol, benzalkonyum klorür, enjeksiyonluk su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

Bu Kullanma Talimatında:

1. **AVERFLU nedir ve ne için kullanılır?**
2. **AVERFLU’yu kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **AVERFLU nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **AVERFLU’nun saklanması**

Başlıkları yer almaktadır.

AVERFLU nedir ve ne için kullanılır?

AVERFLU berrak, renksiz ve pratik olarak partikülsüz bir çözeltidir. HDPE koruyucu halka ve vidalı kapak ile kapatılan beyaz LDPE damlalıklı 5 mL’lik beyaz opak LDPE şişelerde kullanıma sunulmaktadır.

AVERFLU etkin madde olarak 1 mL çözeltide 3 mg flukanazol içerir.

AVERFLU, antifungal adı verilen ve mantar hastalıklarına karşı kullanılan bir grup ilaçtan biridir.



AVERFLU, mayalar dahil mantarlardan kaynaklanan iltihapları tedavi etmek için kullanılır. Mantar enfeksiyonlarının en yaygın nedeni *Candida* adı verilen bir mayadır.

AVERFLU, gözün beyaz tabakasının iltihabında (sklerite), göz içi iltihabında (endojen endoftalmi), ameliyat sonrası göz içi iltihabında (postoperatif endoftalmi), gözün renkli kısmının mantar iltihabında ve göz kanallarının iltihabında endikedir.

1. AVERFLU'yu kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

AVERFLU'yu aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

- AVERFLU'nun içindeki etkin veya yardımcı maddelerden herhangi birine karşı,
- Mantar enfeksiyonunu tedavi etmek için aldığınız diğer ilaçlara aşırı duyarlılığınız varsa.

Aşırı duyarlılık belirtileri kaşınma, ciltte kızarma veya nefes alma zorluğunu kapsayabilir.

Eş zamanlı olarak

- Alerjiyi tedavi etmeye yönelik antihistaminik olan terfenadin veya astemizol alıyorsanız veya
- Sindirim sistemi hastalığında kullanılan sisaprid alıyorsanız AVERFLU kullanmayınız.

AVERFLU'yu aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer,

- Karaciğer veya böbrek sorunlarınız varsa
- Bağışıklık sisteminizin baskılandığı özellikle AIDS ve kanser gibi ciddi hastalığınız varsa
- Potansiyel olarak birden fazla eşzamanlı karaciğeri zedeleyen veya tahriş eden ilaç alıyorsanız
- Toksik epidermal nekroliz ve ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap (Stevens-Johnson sendromu) gibi döküntülü deri yanıtları gelişirse
- Kandaki iyon ve minerallerde dengesizlik (elektrolit bozukluğu) varsa
- AVERFLU ile birlikte çeşitli kanserlerin tedavisinde kullanılan siklofosfamid, ağrı tedavisinde kullanılan parasetamol ve mide-bağırsak ülserlerinin tedavisinde kullanılan rabeprazol gibi ilaçlar kullanıyorsanız



Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

AVERFLU'nun yiyecek ve içecek ile kullanılması

Uygulama yolu bakımından besinlerle etkileşimi beklenmez.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Doktorunuz tersini söylemedikçe gebelik sırasında AVERFLU kullanmayınız.

Tedavi sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

Emzirme esnasında AVERFLU kullanmayınız.

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Araç ve makine kullanımı

AVERFLU, fazla dikkat ve tepki hızı gerektiren, potansiyel olarak tehlikeli aktivitelerde kullanılmamalıdır.

AVERFLU'nun içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Benzalkonyum klorür yumuşak kontakt lensler tarafından emilebilir ve kontakt lenslerin rengini değiştirebilir. Bu ilacı kullanmadan önce kontakt lensleri çıkarmalı ve 15 dakika sonra takmalısınız.

Benzalkonyum klorür özellikle kuru göz durumu ve kornea (gözün ön tarafındaki şeffaf katman) hastalıklarınız varsa gözde tahrişe neden olabilir. Kullanımdan sonra gözde anormal his, batma veya acı hissederseniz doktorunuza başvurunuz.

Bu ilaç her mL başına 1,93 mg fosfat içerir. Gözünüzün ön kısmındaki şeffaf katmanda (kornea) ağır hasar varsa, fosfatlar tedavi sırasında kalsiyum birikmesi nedeniyle nadir durumlarda bulanık parçalı kısımlara neden olabilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

AVERFLU ile alınmamaları gerektiğinden, derhal doktorunuza bildiriniz.

- Sülfonilüre türevleri gibi kan şekerini düşürücü ilaçlarla eşzamanlı uygulama kan şekerinin normalin altına düşmesine neden olabilir.



- Kan pıhtılarını önlemek için kullanılan, kan incelten varfarin gibi kumarinik antikoagulanlar
- Enfeksiyonlara yönelik antibiyotik olan rifampisin veya rifabutin
- Sara hastalığını kontrol altına almak için kullanılan fenitoin
- Organ nakil reddini önlemek için siklosporin

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

2. AVERFLU nasıl kullanılır?


Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

AVERFLU'yu her zaman yalnızca doktorunuzun söylediği gibi kullanınız. Emin değilseniz doktorunuza ve eczacınıza danışınız.


İlaç, hastanın gözünün konjunktival kesesine günde 4 defa 1-2 damla olmak üzere uygulanır. Mikrobiyal kontaminasyondan korunmak için damlalık ucunun herhangi bir yere temasından kaçınılmalıdır. Tedavi süresi 3 haftayı aşmamalıdır. Tedavi doktor gözetimi altında yapılmalıdır.

Uygulama yolu ve metodu:


AVERFLU'yu sadece gözlerinize uygulayınız.




1



2



3



4

1. AVERFLU'nun şişesini ve bir ayna alınız
2. Ellerinizi yıkayınız.
3. Şişenin kapağını açınız.
4. Şişeyi, başparmağınız ve orta parmağınız arasında ucu aşağı bakacak şekilde ters tutunuz (Şekil 1).
5. Başınızı arkaya yaslayınız. Temiz parmağınızla göz kapağınızı, göz kapağınız ile gözünüz arasında bir cep oluşana kadar açınız. Damla buraya damlatılacaktır (Şekil 2).
6. Şişenin ucunu gözünüze yakın bir noktaya getiriniz. Yardımı olacaksa aynayı kullanınız.



7. Damlayı gözünüze veya göz kapağınıza, gözünüzün çevresine veya başka yüzeylere değdirmeyiniz. Damlaya mikrop bulaşabilir.
8. Her seferinde bir damla AVERFLU damlatmak için ters şişenin dibine hafifçe basınız (Şekil 3).
9. AVERFLU'yu kullandıktan sonra, göz kapağınızı serbest bırakınız, gözünüzü kapatınız ve bir parmağınızla burnunuzun yanından gözünüzün kenarına bastırınız (Şekil 4). Bu AVERFLU'nun vücudunuzun diğer bölgelerine geçmesini engellemeye yardımcı olur.
10. Eğer damlayı iki gözünüzde de kullanıyorsanız, diğer gözünüz için aynı uygulamayı tekrarlayınız.
11. Kullanımdan hemen sonra şişenin kapağını sıkıca kapatınız.
12. Diğer şişeyi açmadan önce, bir şişeyi tamamen kullanınız.

Eğer damlayı gözünüzden dışarı damlatırsanız tekrar deneyiniz.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

Çocuklarda kullanımı önerilmez.

Yaşlılarda kullanımı:

Böbrek sorunu yoksa normal yetişkin dozu kullanılır.

Özel kullanım durumları:

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

Böbrek yetmezliği:

Böbrek yetmezliği olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

Eğer AVERFLU'nun etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla AVERFLU kullandıysanız

AVERFLU'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

AVERFLU'yu kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

AVERFLU ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler



AVERFLU tedavisi sonlandırıldığında herhangi bir olumsuz etki oluşması beklenmez.

3. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, AVERFLU'nun içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, AVERFLU'yu kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

- Ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap (Stevens-Johnson sendromu) ve toksik epidermal nekroliz adı verilen deri yanıtları, şiddetli alerjik yanıtlar, ciltte tek ya da daha çok, birkaç santim büyüklüğünde yuvarlak şişlikler.

Bunlar çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bu belirtilerden biri sizde mevcut ise, acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

Çok yaygın	: 10 hastanın en az 1'inde görülebilir.
Yaygın	: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan	: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Seyrek	: 1.000 hastanın birinden az görülebilir.
Çok seyrek	: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
Bilinmiyor	: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Seyrek:

- Gözde tahriş,
- Göz kızarıklığı.

İlacın damlatılmasından sonra görüş bulanıklığı meydana gelebilir.

Bilinmiyor:

- Mide bulantısı,
- İshal,
- Karın ağrısı,
- Mide-bağırsak kanalında aşırı gaz birikimi,
- Tat almada değişiklik,



- Karaciğer işlev bozukluğu,
- Karaciğer iltihabı,
- Karaciğere ait hücrelerin ölümü,
- Kandaki ALT ve AST adı verilen enzimlerin yükselişi,
- Böbrek işlev bozukluğu,
- Kandaki kolesterol ve trigliserid düzeyinde artış,
- Kan potasyum düzeyinin normalin altına düşmesi,
- Baş ağrısı,
- Baş dönmesi,
- Havale,
- Kurdeşen,
- Kandaki akyuvar sayısının azalması,
- Kandaki pıhtı sayısının azalması,
- Yüzde şişlikler,
- Kaşıntı.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz.

Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

4. AVERFLU’nun saklanması

AVERFLU’yu çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra AVERFLU’yu kullanmayınız.

Açıldıktan sonra 4 hafta içerisinde kullanılmalıdır.



Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz *AVERFLU*'yu kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat sahibi : Rompharm İlaç Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Çerkezköy / Tekirdağ

Üretim Yeri : World Medicine İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş

Çerkezköy / Tekirdağ

Bu kullanma talimatı 18/12/2025 tarihinde onaylanmıştır.

