

KULLANMA TALİMATI

DUGAST TRİO 500 mg + 267 mg + 160 mg / 10 ml oral süspansiyon

Ağız yoluyla alınır.

- **Etkin maddeler:** Her 10 mL oral süspansiyon; 500 mg sodyum aljinat ve 267 mg sodyum bikarbonat ve 160 mg kalsiyum karbonat içerir.
- **Yardımcı maddeler:** Metil parahidroksibenzoat (E218), propil parahidroksibenzoat (E216), sodyum sakkarin, karbomer, nane yağı, saf su.

Bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu ilaç sizin reçetesiz olarak temin edip bir doktor yardımı almadan eczacınızın tavsiyesi ile hafif bir hastalığı tedavi etmeniz içindir. Buna karşın, yine de DUGAST TRİO'dan en iyi sonuçları alabilmeniz için dikkatli kullanmanız gerekmektedir.

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

Bu Kullanma Talimatında;

1. **DUGAST TRİO nedir ve ne için kullanılır?**
2. **DUGAST TRİO'yu kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **DUGAST TRİO nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **DUGAST TRİO'nun saklanması**

Başlıkları yer almaktadır.

1. DUGAST TRİO nedir ve ne için kullanılır?

DUGAST TRİO; beyaz- hafif krem renkli, nane kokulu, oral süspansiyondur.

DUGAST TRİO; karton kutuda, amber renkli 200 mL'lik cam şişede kullanma talimatı ve bir adet 15 mL ölçek ile birlikte kullanıma sunulur.

DUGAST TRİO, reflü (mide ve yemek borusu iltihabı) baskılayıcılar diye adlandırılan ilaçlar grubuna dahildir.

DUGAST TRİO, reflü özofajit (yemek borusu iltihabı) kaynaklı şikayetleri olan hastalarda, gebelikte ya da yemeklerden sonra oluşan (reflüden kaynaklanan) hazımsızlık, mide yanması ve mideden ağza asit gelmesi gibi gastroözofageal reflü (mide ve yemek borusu iltihabı) belirtilerinin tedavisinde kullanılır.

2. DUGAST TRİO'yu kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

DUGAST TRİO'yu aşağıdaki durumda KULLANMAYINIZ

- DUGAST TRİO içeriğindeki herhangi bir maddeye karşı alerjiniz varsa (nefes almada güçlük veya deri döküntüleri meydana gelmişse)

DUGAST TRİO'yu aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Aşağıda belirtilen durumlardan herhangi biri sizin için söz konusuysa, tedaviniz doktorunuz tarafından dikkatli bir şekilde düzenlenmelidir:

- Doktorunuz tarafından sodyum ve/veya kalsiyum kısıtlaması önerilmişse,
- Böbrek ya da kalp rahatsızlığınız varsa ya da geçmişte olduysa (bazı tuzlar bu tür durumları etkileyebilir),
- Midenizdeki asit seviyesi çok düşükse (bu durumda ilacın etkisi azalabilir),
- Şiddetli böbrek yetmezliğiniz varsa,
- Yedi gün sonra belirtilerde düzelme olmazsa.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

DUGAST TRİO'nun yiyecek ve içecek ile kullanılması

DUGAST TRİO yemeklerden sonra ağız yoluyla uygulanır.

Hamilelik:

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

DUGAST TRİO, gebelik döneminde kullanılabilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme:

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

DUGAST TRİO, emzirme döneminde kullanılabilir.

Araç ve makine kullanımı:

DUGAST TRİO'nun araç ve makine kullanımına olumsuz bir etkisi yoktur.

DUGAST TRİO'nun içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün her 10 mL'sinde 6,3 mmol (ya da 145,0 mg) sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Bu tıbbi ürün bileşiminde kalsiyum karbonat içerir. Kanda kalsiyum miktarı yüksek olan ve tekrarlayan böbrek taşı olan hastalarda dikkatli olunmalıdır.

Bu tıbbi ürün bileşiminde metil parahidroksibenzoat (E218) ve propil parahidroksibenzoat (E216) içerdiğinden (muhtemelen gecikmiş) alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Bazı ilaçlar ile birlikte kullanıldığında DUGAST TRİO'nun ya da kullanılan diğer ilacın

etkisi deęiřebilir. Ařaęıdaki ilalarla birlikte DUGAST TRİO kullanımı arasında 2 saat ara verilmelidir:

- Tetrasiklinler, norfloksasin gibi kinolon grubu antibiyotikler (enfeksiyon tedavisi iin),
- Demir ieren ilalar,
- Ketokonazol (mantar iin),
- Tiroksin (tiroid hastalıęı iin),
- Atenolol, metoprolol, propanolol gibi beta-blokrler ve digoksin (kalp hastalıkları iin),
- Nroleptikler (sinir hastalıkları iin)
- Glukokortikoid (bir eřit hormon ilacı)
- Klorokin (sıtma iin)
- Bifosfonatlar (kemik erimesi iin)
- Estramustin (prostat bezi kanseri iin)
- Antihistamikler (alerji ve kařıntıyı nleyici ilalar)

Levotiroksin ieren ilaların (tiroid hastalıklarının tedavisinde kullanılan) DUGAST TRİO ile birlikte alındıęında emilimi bozulduęundan, iki ilacın en az 2 saat ara verilerek alınması gerekmektedir.

Eęer reeteli ya da reetesiz herhangi bir ilacı řu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız ltfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz

3. DUGAST TRİO nasıl kullanılır?

Doktorunuz alacaęınız doz miktarını ve DUGAST TRİO ile yapılacak tedavi sresini belirleyecektir. Tedaviyi kendi kendinize kesmeyiniz ve uzatmayınız.

Doktorunuz bařka řekilde nermemiřse, DUGAST TRİO'yu ařaęıdaki gibi kullanınız.

Uygun kullanım ve doz/ uygulama sıklıęı iin talimatlar:

DUGAST TRİO, ağızdan alınarak kullanılır. Kullanmadan nce iyice alkalanmalıdır.

DUGAST TRİO, yetiřkinler ve 12 yařından byk ocuklarda gnde en fazla drt defa olmak zere yemeklerden sonra ve yatarken 10-20 mL (2-4 tatlı kařıęı) kullanılır.

7 gn sonunda řikayetleriniz hala devam ediyorsa doktorunuza danıřmanız gerekmektedir.

Uygulama yolu ve metodu:

DUGAST TRİO, ağızdan alınarak kullanılır.

Deęiřik yař grupları:

ocuklarda kullanımı:

6-12 yař arası ocuklarda yemeklerden sonra ve yatarken 5-10 mL (1-2 tatlı kařıęı).

12 yařından byk ocuklar iin yemeklerden sonra ve yatarken 10-20 mL'dir (2-4 tatlı kařıęı).

12 yařın altındaki ocuklarda sadece doktor tavsiyesi zerine verilmelidir.

6 yař altındaki ocuklarda kullanımı nerilmez.

Yaşlılarda kullanımı:

Doz ayarlaması gerekmez.

Özel kullanım durumları:**Böbrek yetmezliği:**

Kalsiyum ve sodyum içerdiği için böbrek bozukluğu olan hastalarda dikkatli olunmalıdır.

Karaciğer yetmezliği:

Özel kullanımı yoktur.

Eğer DUGAST TRİO'nun etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla DUGAST TRİO kullandıysanız:

DUGAST TRİO'yu kullanmanız gerekenden daha fazla kullandıysanız herhangi bir zarar oluşması beklenmez, ancak karnınızda şişkinlik hissedebilirsiniz.

DUGAST TRİO'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

DUGAST TRİO'yu kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

DUGAST TRİO'yu belirtildiği gibi kullanmaya devam ediniz.

DUGAST TRİO ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

Doktorunuza danışmadan tedavinizi yarım bıraktığınız takdirde hastalığınızın belirtileri tekrar ortaya çıkabilir.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, DUGAST TRİO'nun içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkileri olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, DUGAST TRİO'yu kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

- Deri döküntüleri
- Nefes almada güçlük
- Baş dönmesi
- Yüz, dudaklar, dil veya boğazda şişme

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin DUGAST TRİO'ya karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Yan etkilerin raporlanması:

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5. DUGAST TRİO’nun saklanması

DUGAST TRİO’yu çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C altındaki oda sıcaklığında ve kendi ambalajında saklayınız. Buzdolabına koymayınız veya dondurmayınız.

Açıldıktan sonra 25°C altındaki oda sıcaklığında saklamak koşuluyla 6 ay içinde tüketilmelidir.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra DUGAST TRİO’yu kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat sahibi:

İlko İlaç San. Ve Tic. A.Ş.

Veysel Karani Mah. Çolakoğlu Sok.

No: 10/ 34885, Sancaktepe/ İstanbul

Tel: 0216 564 80 00

Üretim yeri:

Farmamag ambalaj San. Ve Tic. A.Ş.

Boğaziçi Cad. No: 1434325

Avcılar/ İstanbul

Bu kullanma talimatı tarihinde onaylanmıştır.