

## KULLANMA TALİMATI

### İSORDİL® 10 mg tablet

Ağızdan alınır.

- **Etkin madde:** 10 mg izosorbid dinitrata eşdeğer 40 mg seyreltilmiş % 25'lik izosorbid dinitrat içerir.
- **Yardımcı maddeler:** Mannitol (E421), sukroz, magnezyum stearat, mısır nişastası

**Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.**

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

### **Bu kullanma talimatında:**

1. **İSORDİL® nedir ve ne için kullanılır?**
2. **İSORDİL® kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **İSORDİL® nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **İSORDİL®'in saklanması**

**Başlıkları yer almaktadır.**

### **1. İSORDİL® nedir ve ne için kullanılır ?**

İSORDİL®, damar genişletici organik nitratlar ismi verilen ve kalp hastalıklarında kullanılan bir ilaç grubuna dahil olan izosorbid dinitrat içeren damar genişletici bir ilaçtır.

İSORDİL® tablet yuvarlak, düz kenarlı, bir yüzü çentikli, diğer yüzünde “Ayerst” baskısı bulunan beyaz renkli tablet şeklindedir ve ambalajın içinde 50 tablet bulunur.

İSORDİL®, kan damarlarını gevşeterek kalbin iş gücünü azaltır ve kalbin kanı daha kolay pompalamasına yardımcı olur. Ayrıca kalbin gereksinim duyduğu oksijen miktarı da azalmış olur. Kalbi besleyen kan damarlarını da genişlettiği için kalbe sunulan kan ve oksijen miktarı da artar.

İSORDİL® 10 mg tablet,

- Koroner kalp hastalığına bağlı olarak kalbin yeterli oksijen alamaması nedeniyle oluşan ani göğüs ağrılarının (anjina pectoris) önlenmesinde,

- Kalbin kanı pompalama gücünün azaldığı bir hastalık olan kalp yetmezliğinde diğer ilaçlar [glikozit (kalp yetmezliğinde kullanılır), diüretik (idrar söktürücü) ve arteryel vazodilatörler (damar genişleticiler)] ile birlikte kullanılır.

## **2. İSORDİL® kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**

### **İSORDİL®'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ**

Eğer:

- İzosorbid dinitrat veya İSORDİL®'in bileşimindeki herhangi bir maddeye karşı alerjiniz varsa,
- Nitrat içeren diğer ürünlere karşı alerjiniz varsa
- Kan basıncınız çok düşükse
- Kanamanız varsa
- Aşırı su kaybettiyseniz (kusma veya ishal nedeni ile olabilir)
- Kafanıza şiddetli darbe aldıysanız veya kafa içi basıncınızı artıracak bir hastalığınız varsa (beyin tümörü, beyin kanaması gibi)
- Ciddi kansızlığınız varsa
- Göz tansiyonunuz yüksekse (glokom)
- Yeni kalp krizi geçirdiyseniz
- Sertleşme kusuru için viagra gibi bir ilaç kullanıyorsanız
- Kalp kasınızda kalınlaşma ile birlikte kalp yetmezliğiniz varsa
- Kalbi saran zarlar arasında sıvı toplanmış ve kalbinizi sıkıştırıyorsa
- Kor pulmonale (bir akciğer hastalığına bağlı olarak ortaya çıkan sağ kalp hipertrofisi) varsa

### **İSORDİL®'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ**

Eğer:

- Ciddi karaciğer ve böbrek problemlerinizi varsa
- Tiroidiniz (guatr beziniz) az çalışıyorsa
- Yetersiz ve kötü beslenmekteyseniz
- Vücut sıcaklığınız aşırı düşükse
- Kalp kapakçıklarınızda (mitral ve aort) darlık varsa

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse, lütfen doktorunuza danışınız ve doktorunuzla konuşana kadar ilacı almayınız.

### **İSORDİL®'in yiyecek ve içecek ile kullanılması**

Alkol ile birlikte alındığında kan basıncını düşürücü etkisi artabilir.

### **Hamilelik:**

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

Hamilelik sırasında doktorunuz mutlaka gerekli görmedikçe İSORDİL® kullanmayınız.

*Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu farkederseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız hemen doktorunuza danışınız.*

**Emzirme:**

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

İSORDİL® kullanırken bebeğinizi emzirmeyiniz.

**Araç ve makine kullanımı**

Baş ağrısı, yorgunluk ve baş dönmesi gelişebilir. Bu olaylar araç ve makine kullanımınızı etkileyebileceğinden, İSORDİL® kullanırken araç ve makine kullanmayınız.

**İSORDİL®'nin içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler**

İSORDİL® 10 mg tablet 154 mg mannitol içerdiği için, hafif derecede laksatif etkisi olabilir.

İSORDİL® 10 mg tablet 3.08 mg sukroz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

**Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı**

- Bazı ilaçlar İSORDİL®'in kan düzeyini artırarak veya azalatarak etkisini değiştirebilirler.
- Erkeklerde sertleşme kusuru için kullanılan ilaçlar İSORDİL® tedavisinden en az 24 saat sonra alınmalıdır. BİRLİKTE KULLANILMAMALIDIR.
- Yüksek kan basıncının tedavisinde kullanılan ilaçlarla veya damarları genişleten ilaçlar ile birlikte alındığında kan basıncını düşürücü etki güçlenir.
- Şizofreni ve depresyon (ruhsal çöküntü) ilaçları ile birlikte kullanıldığında kan basıncını düşürücü etki artar.
- Damar büzücü etkileri olan bazı ilaçların (migren tedavisinde kullanılan ergotamin ve şok durumlarında kullanılan adrenalin gibi) kan basıncını yükseltici etkilerini artırabilir.
- Böbrek yetmezliği nedeni ile kan temizleme makinasına (hemodiyaliz) giren hastalar İSORDİL®'i diyalizden sonra almalı veya 10-20 mg'lık ek doz almalıdır.

*Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.*

**3. İSORDİL® nasıl kullanılır?****Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:**

İSORDİL®'i tam olarak doktorunuzun önerdiği şekilde almanız çok önemlidir. Gerektiği şekilde almazsanız, giderek ilacınızın etkisi azalır ve yarar görmeme olasılığınız artar.

İSORDİL®'i kalbinize yeterli kan gitmediği için gelişen göğüs ağrınızın tedavisi için kullanıyorsanız genellikle 5-20 mg İSORDİL® ile tedaviye başlanır ve günde 4 kez (6 saatte bir) 10-40 mg alınır.

İSORDİL®'i kalbin pompalama gücünün tedavisi için kullanıyorsanız, günde 3-4 kez 20 mg ile tedaviye başlanıp doktorunuzun önerisine göre doz günde toplam 120-160 mg olacak şekilde artırılır.

İSORDİL®'in sürekli kullanımında etkisinin azalmaması için aldığınız iki doz arasında 14 saat veya daha fazla zaman bırakmalısınız (örneğin; İSORDİL®'i günde 3 kez kullanıyorsanız ilk dozu sabah 8.00'de, ikinci dozu 14.00'de ve son dozu 18.00'de alınız; böylece akşam son aldığınız doz ile bir sonraki sabah alacağınız ilk doz arasındaki zaman 14 saat olacaktır) .

**Uygulama yolu ve metodu:**

İSORDİL® bir miktar sıvı ile yutularak kullanılır.

**Değişik yaş grupları:**

**Çocuklarda kullanımı:**

Çocuklarda kullanımı önerilmez.

**Yaşlılarda kullanımı:**

Yaşlılarda önerilen en düşük dozla tedaviye başlanıp yavaş yavaş doz artırılır.

**Özel kullanım durumları:**

**Böbrek yetmezliği:**

Doz yavaş yavaş artırılır ve hastalar tedavi süresince dikkatle izlenir.

**Böbrek yetmezliği:**

Doz yavaş yavaş artırılır ve hastalar tedavi süresince dikkatle izlenir.

*Eğer İSORDİL®'in etkisinin çok güçlü veya çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.*

**Kullanmanız gerekenden daha fazla İSORDİL® kullandıysanız:**

*İSORDİL®'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.*

İSORDİL® aşırı dozda alındığında kan basıncında ani düşme; inatçı ve şiddetli baş ağrısı, baş dönmesi, çarpıntı; görme bozuklukları, deride kızarıklık ve terleme (daha sonra soğuma ve morarma), bulantı ve kusma (bazen kanlı ishal), bayılma, solunum sayısında artma, solunum güçlüğü, kalp atımlarında yavaşlama, kalp atımlarında düzensizlik, kasılma nöbetleri, koma ve ölüm görülebilir. Alyuvarlarınızda parçalanma ve kansızlık gelişebilir.

İSORDİL®'i aşırı dozda kullanmışsanız hekiminiz sizi izleyerek gereken destekleyici tedaviyi verecektir.

**İSORDİL®'i kullanmayı unutursanız**

İSORDİL®'i almayı unutursanız, normal alma zamanına yakınsa alabilirsiniz. İSORDİL®'in normal alınma zamanınızdan daha uzun bir süre geçmişse, unuttuğunuz dozu almamalı ve normal zamanında bir sonraki tableti almalısınız.

*Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.*

#### **İSORDİL® ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:**

Kalbin yeterli oksijen alamamasına bağlı gelişen göğüs ağrısının tedavisi için İSORDİL® kullanıyorsanız ve tedavinizi aniden keserseniz bu tür göğüs ağrısı ataklarında artış görülebilir. O nedenle ilacınızı aniden değil yavaş yavaş azaltarak kesmelisiniz.

#### **4. Olası yan etkiler nelerdir?**

Tüm ilaçlar gibi, İSORDİL®'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

Çok yaygın: 10 hastanın en az 1'inde görülebilir.

Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek: 1.000 hastanın birinden az görülebilir, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

**Aşağıdakilerden biri olursa, İSORDİL®'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:**

- Kan basıncınızda aşırı düşme olursa (buna bağlı olarak halsizlik, baş dönmesi, kalp atımlarında hızlanma, kalbe ve beyne giden kan akımında azalma, göğüs ağrısı, kalp krizi ve inme gibi bulgular olabilir. Şok ve bayılma meydana gelebilir).
- Nefes almada zorlanma meydana getirebilecek ciddi alerji bulguları gelişirse
- Ani başlayan morarma ve oksijensizlik bulguları gelişirse (methemoglobinemi)
- Ağızda, yüzde ve dilde şişme (anjioödem)

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin İSORDİL®'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

**Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:**

#### **Diğer yan etkiler:**

##### **Çok yaygın:**

- Baş ağrısı; tedavinin başlangıcında görülen baş ağrısı, devam eden tedavinin ardından hastaların birçoğunda düzelir veya geriler.
- Deride kızarıklık
- Damar genişlemesi

**Yaygın:**

- Baş dönmesi
- Halsizlik
- Sersemlik
- Huzursuzluk
- Postural hipotansiyon (ani tansiyon düşmesi, özellikle otururken veya yatariken aniden ayağa kalkınca baş dönmesi veya bayılma hissi yaşanması)
- Kalp ritminin hızlanması

**Yaygın olmayan:**

- Hipotansiyon
- Bulantı, kusma
- Alerjik deri reaksiyonları (örn; döküntü)

**Seyrek:**

- Kalp ritim bozukluğu
- Şok, bayılma
- Sıcak basması
- Artan göğüs ağrısı
- Bacaklarda ve ayak bileklerinde ödem
- Rebound hipertansiyon (ani tansiyon yükselmesi, tansiyon ilaçlarının aniden kesilmesi veya etkisinin azalması sonucu tansiyonun hızla yükselmesi)

**Çok seyrek:**

- Ani başlayan morarma ve oksijensizlik bulguları gelişirse (methemoglobinemi)
- Ciltte kızarıklık ve pullanma
- Ağızda, yüzde ve deride şişme (anjiyoödem)
- Alerjik deri reaksiyonları (örn; cilt soyulması)
- Dar açılı glokom (göz tansiyonunun yükselmesi, göz içi basıncının aniden yükselmesiyle şiddetli göz ağrısı, bulanık görme ve mide bulantısı gibi belirtilere yol açan bir durum)

**Bilinmiyor:**

- Kabızlık
- Ağız kuruluğu
- Dışkı ve idrar kaçırma
- Bulanık görme
- Solukluk
- Soğuk terleme

Bunlar İSORDİL®'in hafif yan etkileridir.

*Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.*

#### Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri [www.titck.gov.tr](http://www.titck.gov.tr) sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

#### **5. İSORDİL®’in saklanması**

*İSORDİL®’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.*

İSORDİL®’i 25 °C altındaki oda sıcaklığında ve kuru bir yerde saklayınız.

**Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.**

*İSORDİL®’i kutusunda belirtilen son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız.*

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz İSORDİL®’i kullanmayınız.

#### ***Ruhsat Sahibi:***

Teva İlaçları San. ve Tic. A.Ş.  
Ümraniye/İstanbul

#### ***Üretim yeri:***

Nobel İlaç San. ve Tic. A.Ş.  
Sancaklar/Düzce

*Bu kullanma talimatı ../../. tarihinde onaylanmıştır.*