

## KULLANMA TALİMATI

**PANLİD %1,5+%1,5+%5 jel**

**Deriye uygulanır.**

- **Etkin madde:** 1 g jel; 15 mg mepiramin maleat, 15 mg lidokain hidroklorür ve 50 mg dekspantenol içermektedir.
- **Yardımcı maddeler:** Benzalkonyum klorür, hidroksietil selüloz, tween 80, disodyum EDTA, propilen glikol, karbomer (synthalen KP), trietanolamin, saf su.

**Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.**

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

### **Bu kullanma talimatında:**

1. **PANLİD nedir ve ne için kullanılır?**
2. **PANLİD'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **PANLİD nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **PANLİD'in saklanması**

**Başlıkları yer almaktadır.**

#### **1. PANLİD nedir ve ne için kullanılır?**

PANLİD, 30 gramlık alüminyum tüplerde sunulan bir jeldir.

PANLİD, etkin madde olarak mepiramin maleat, lidokain hidroklorür ve dekspantenol içerir.

PANLİD deriye uygulandığında, lokal olarak antialerjik (alerjiyi giderici), antienflamatuar (iltihabı giderici), antipruritik (kaşıntıyı giderici) ve anesteziik etki gösterir.

PANLİD, güneş yanıkları, böcek sokmaları, ürtiker (kurdeşen), kaşıntı ve birinci derece (hafif) yanıklarda kullanılır.

## **2. PANLİD'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler PANLİD'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ**

Eğer;

- PANLİD'nin bileşenlerine karşı alerjiniz var ise,
- İltihaplı deri hastalıkları ile enfekte yaralar, iltihaplı deri enfeksiyonları ve bulaşıcı hastalıklar var ise ilacı kullanmayınız.

### **PANLİD'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ**

PANLİD, gözlere ve ıslak dokulara (mukoza) temas ettirilmemelidir. Gözler ile temas durumunda, gözlerin bol su ile yıkanması önerilir. PANLİD, geniş vücut yüzeylerine uygulanmamalıdır.

PANLİD'in 7 gün süre ile kullanımına rağmen, mevcut yakınmaların sürmesi veya artması durumunda bir doktora danışınız.

Özellikle geniş deri yüzeylerine ve bilhassa da oklüzyon altında uygulandıklarında kalp ritm bozuklukları, nefes alma zorluğu, koma ve hatta ölüme yol açabilmektedir

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

### **PANLİD'in yiyecek ve içecek ile kullanılması**

PANLİD, cilde sürüldüğünden aç ya da tok uygulanabilir.

### **Hamilelik**

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

PANLİD'in bileşiminde bulunan mepiramin, lidokain ve dekspantenol ile hayvanlar üzerinde yapılmış çalışma da mevcut değildir.

PANLİD, gerekli değilse gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

*Tedavi sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

### **Emzirme**

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

PANLİD'in bileşiminde bulunan mepiramin, lidokain ve dekspantenolün anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir.

Söz konusu maddelerin süt ile atılımı hayvanlar üzerinde de araştırılmamıştır.

Emzirme döneminde PANLİD kullanımı konusunda doktorunuza danışınız.

### **Araç ve makine kullanımı**

PANLİD'in araç ve makine kullanımı üzerine bir etkisi yoktur.

**PANLİD'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler**

Bu ilaç her 1 g'ında 200 mg propilen glikol içerir. PANLİD'in içeriğinde bulunan propilen glikol ciltte tahrişe neden olabilir. Bu ilaç propilen alkol içerdiği için doktorunuza veya eczacınıza danışmadan açık yaralara veya geniş hasarı olan cilt üzerine uygulamayınız.

Bu ilaç her 1 g'ında 0,00083 mg benzalkonyum klorür içerir. PANLİD'in içeriğinde bulunan benzalkonyum klorür ciltte tahrişe neden olabilir. Emziriyorsanız göğüs üzerine bu ilacı sürmeyiniz çünkü emzirme sırasında sütle birlikte bebeğe geçebilir.

**Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı**

Herhangi bir ilaç ile etkileşimi bildirilmemiştir.

*Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.*

**3. PANLİD nasıl kullanılır?****Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:**

PANLİD günde birkaç kez lezyonlu bölgeye sürülür.

PANLİD'i, 7 günden daha uzun süre kullanmayınız.

**Uygulama yolu ve metodu:**

PANLİD, ince bir tabaka halinde ciltteki lezyonlu bölgeye sürülür.

**Değişik yaş grupları:****Çocuklarda kullanımı:**

2 yaşın altındaki çocuklarda, doktor onayı olmaksızın kullanılmamalıdır.

**Yaşlılarda kullanımı:**

Bildirilmemiştir.

**Özel kullanım durumları:****Böbrek/Karaciğer yetmezliği:**

Bildirilmemiştir.

*Eğer PANLİD'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.*

**Kullanmanız gerekenden daha fazla PANLİD kullandıysanız**

*PANLİD'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.*

## **PANLİD'i kullanmayı unutursanız**

*Unutulan dozları dengelemek için çift doz kullanmayınız.*

## **PANLİD ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler**

PANLİD tedavisi sonlandırıldığında, herhangi bir olumsuz etki oluşması beklenmez.

### **4. Olası yan etkiler nelerdir?**

Tüm ilaçlar gibi, PANLİD'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler görülebilir.

İlaçların yan etkileri aşağıdaki şekilde sınıflanmaktadır:

Çok yaygın :10 hastanın en az 1'inde görülebilir.

Yaygın :10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan :100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek :1.000 hastanın birinden az görülebilir.

Çok seyrek :10.000 hastanın birinden az görülebilir, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Sıklığı bilinmeyen :Eldeki veriler ile belirlenemeyecek kadar az hastada görülebilir.

**Aşağıdakilerden biri olursa, PANLİD'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:**

- Ciltte yaygın ve şiddetli kızarıklık ve kaşıntı, soluk almada zorluk, yüz, dudak, dil veya boğazda şişme, ani kan basıncı düşmesi.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin PANLİD'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

**Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:**

- Ciltte yaygın ama şiddetli olmayan kızarıklık ve kaşıntı, yüksek ateş, kusma, çarpıntı.

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

**Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:**

- Deride hafif kızarıklık ve kaşıntı, iştah kaybı, halsizlik, yorgunluk, uykusuzluk, baş ağrısı, baş dönmesi, bulantı, ishal.

Bunlar PANLİD'in hafif yan etkileridir.

Bu yan etkiler doz azaltıldığında veya tedavi kesildiğinde kaybolur.

*Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.*

**Yan etkilerin raporlanması**

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri [www.titck.gov.tr](http://www.titck.gov.tr) sitesinde yer alan "İlaç Yan Etki Bildirimi" ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

**5. PANLİD'in saklanması**

*PANLİD'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C altındaki oda sıcaklığında saklayınız.*

**Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.**

*Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra PANLİD'i kullanmayınız.*

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

***Ruhsat sahibi:***

İlko İlaç San. ve Tic. A.Ş.  
Veysel Karani Mah. Çolakoğlu Sok.  
No:10 34885 Sancaktepe / İstanbul  
Tel no: 0216 564 80 00

***Üretim yeri:***

Adeka İlaç San. ve Tic. A. Ş.  
Kale Mah. Hacıhatun Sok. No:6  
Necipbey Cad. No:88 İlkadım/SAMSUN

*Bu kullanma talimatı 13.07.2026 tarihinde onaylanmıştır.*