

## KULLANMA TALİMATI

**VEYNUA™ 45 mg/0,8 mL enjeksiyonluk çözelti içeren kullanıma hazır kalem**

**Deri altına uygulanır.**

**Steril**

- **Etkin madde:** Bir adet kullanıma hazır kalem, 0,8 mL çözeltide 45 mg eplontersen (eplontersen sodyum olarak) içerir.
- **Yardımcı maddeler:** Sodyum dihidrojen fosfat dihidrat, disodyum fosfat, sodyum klorür, hidroklorik asit (konsantre), sodyum hidroksit, enjeksiyonluk su

▼ Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlik bilginin hızlı olarak belirlenmesini sağlayacaktır. Meydana gelen herhangi bir yan etkiyi raporlayarak yardımcı olabilirsiniz. Yan etkilerin nasıl raporlanacağını öğrenmek için 4. Bölümün sonuna bakabilirsiniz.

**Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.**

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç yalnızca sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde, doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

### **Bu Kullanma Talimatında:**

1. **VEYNUA nedir ve ne için kullanılır?**
2. **VEYNUA'yı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **VEYNUA nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **VEYNUA'nın saklanması**

**Başlıkları yer almaktadır.**

#### **1. VEYNUA nedir ve ne için kullanılır?**

VEYNUA, berrak, renksiz ila sarı renkli enjeksiyonluk çözeltidir (enjeksiyon).

VEYNUA, 1 adet tek kullanımlık kullanıma hazır kalem içeren bir ambalajda bulunmaktadır.

VEYNUA'nın etkin maddesi, antisens oligonükleotid adı verilen bir ilaç türü olan eplontersendir.

VEYNUA, kalıtsal transtiretin amiloidoz ile ilişkili polinöropatisi (ATTRv) (*vücudun farklı bölgelerine hareket ve duyu iletimini sağlayan sinirlerde hasara veya işlev bozukluğuna bağlı olarak ortaya çıkan bir sinir hastalığı*) olan yetişkinlere yönelik bir tedavidir. Transtiretin (TTR), çoğunlukla karaciğerde üretilir ve A vitamini ile diğer maddeleri vücutta taşımaktadır.

ATTRv'si olan kişilerde TTR proteini kümelenerek 'amiloid' adı verilen birikintiler oluşturur. Amiloid sinirlerin, kalbin ve vücudun diğer yerlerinin çevresinde veya içinde birikir ve bunların normal çalışmasını engeller. Bu yaygın sinir hasarı, bacaklarda ve kollarda ilerleyen güçsüzlük ve his kaybının yanı sıra baş dönmesi, ishal ve kabızlık gibi hastalık belirtilerine neden olur.

VEYNUA, karaciğer tarafından üretilen TTR proteini miktarını azaltarak çalışır. Sonuç olarak, kanda amiloid birikintileri oluşturacak daha az TTR proteini yer alır. Bu, hastalığın etkilerini azaltmaya yardımcı olabilir.

## **2. VEYNUA'yı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**

### **VEYNUA'yı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ**

Eğer,

- Eplontersene veya bu ilacın bileşenlerinden herhangi birine alerjiniz varsa (bkz. yardımcı maddeler).

### **VEYNUA'yı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ**

**A vitamini takviyeleri almanız gerekecektir.** VEYNUA ile tedavi kanınızdaki A vitamini miktarını azaltır. Doktorunuz tedavi öncesinde A vitamini seviyenizi ölçecektir.

- Tedaviniz sırasında doktorunuz sizden **ağızdan (oral) günlük A vitamini takviyesi almanızı** isteyecektir.

**A vitamini düşüklüğünün belirtileri şunları içerebilir:** özellikle geceleri **görme bozukluğu**, göz kuruluğu, puslu veya bulutlu görmek veya göz enflamasyonu (kızarıklık, ağrı, aşırı gözyaşı veya diğer akıntılar, ya da gözde bir şey varmış hissi).

- VEYNUA kullanırken görmede bir sorun veya başka bir göz sorunu fark ederseniz doktorunuzla konuşunuz. Gerekli durumlarda doktorunuz sizi kontrol için bir göz doktoruna yönlendirecektir.

VEYNUA tedavisine başlamadan önce **hamile olmadığınızı doğrulamanız gerekir.** A vitamini seviyeleri, çocuğun anne karnında gelişimini etkileyebilir. Çocuk doğurma çağındaki kadınlar, tedavi sırasında etkili bir doğum kontrol yöntemi kullanmalıdır (aşağıdaki “Hamilelik” ve “Emzirme” Bölümlerine bakınız).

- Son VEYNUA dozundan sonra A vitamini düzeyleri 15 haftadan daha uzun bir süre düşük kalabilir.
- **Hamile kalmayı planlıyorsanız doktorunuza söyleyiniz.** Doktorunuz size VEYNUA ve A vitamini takviyesi almayı bırakmanızı söyleyecektir. Doktorunuz ayrıca hamile kalmaya çalışmadan önce A vitamini düzeyinizin normale döndüğünden emin olacaktır.

- **Planlanmamış bir hamileliğiniz varsa doktorunuza söyleyiniz.** Doktorunuz size VEYNUA almayı bırakmanızı söyleyecektir. Hamileliğinizin ilk 3 ayında doktorunuz size A vitamini takviyesi almayı bırakmanızı söyleyebilir. Hamileliğinizin son 3 ayında A vitamini eksikliği riskinin artması nedeniyle, A vitamini düzeyiniz henüz normale dönmediyse doktorunuz, hamileliğinizin son 6 ayında A vitamini takviyesine devam etmenizi söyleyebilir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse, lütfen doktorunuza danışınız.

### **VEYNUA'nın yiyecek ve içecek ile kullanılması**

Uygulama yolu nedeniyle VEYNUA'nın yiyecek ve içecek ile kullanılmasıyla ilgili herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

### **Hamilelik**

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

Hamileyseniz, hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız veya hamile kalmaya çalışıyorsanız VEYNUA kullanmaya başlamadan önce tavsiye için doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Doğurganlık çağındaki kadınlar

VEYNUA, kanınızdaki A vitamini seviyesini azaltacaktır ve A vitamini, anne karnındaki çocuğunun normal gelişimi için önemlidir (bu kullanma talimatının öncesinde yer alan “VEYNUA'yı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ” Bölümüne bakınız).

- Hamile kalma ihtimaliniz var ise, VEYNUA ile tedaviniz sırasında **etkili bir doğum kontrol yöntemi kullanmalısınız.**
- Size uygun doğum kontrol yöntemleri ile ilgili doktorunuz ile görüşmelisiniz.
- VEYNUA ile tedaviye başlamadan önce hamile olmadığınızı doğrulamalısınız.
- Tedaviniz sırasında hamile kalmayı planlıyorsanız veya hamileyseniz **doktorunuza bildiriniz.** Doktorunuz size VEYNUA almayı bırakmanızı tavsiye edecektir.

Hamileyseniz, VEYNUA kullanmamalısınız.

*Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

### **Emzirme**

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

Emziriyorsanız, VEYNUA kullanmaya başlamadan önce tavsiye için doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

VEYNUA'nın etkin maddesinin anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Emzirilen çocuğa yönelik risk göz ardı edilemez. Tedaviye başlamadan önce, emziriyorsanız veya emzirmeyi planlıyorsanız doktorunuza bildiriniz. Doktorunuz size VEYNUA almayı bırakmanızı söyleyebilir.

### **Araç ve makine kullanımı**

VEYNUA'nın araç ve makine kullanma yeteneğinizi etkilemesi pek olası değildir. Doktorunuz, durumunuzun güvenli bir şekilde araç ve makine kullanmanıza izin verip vermediğini size söyleyecektir.

### **VEYNUA'nın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler**

Bu tıbbi ürün her 0,8 mL'lik dozunda 1 mmol (23 mg)'dan daha az sodyum ihtiva eder; yani aslında "sodyum içermez".

### **Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı**

*Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.*

### **3. VEYNUA nasıl kullanılır?**

#### **Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:**

Bu ilacı her zaman tam olarak doktorunuzun, eczacınızın veya hemşirenizin size söylediği şekilde kullanınız. Emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

VEYNUA'nın normal dozu

Önerilen doz her ay 45 mg'lık tek enjeksiyondur.

Doktorunuz ne kadar uzun süre VEYNUA almanız gerektiğini size söyleyecektir. Doktorunuz size söylemediği sürece tedaviyi bırakmayınız.

#### **Uygulama yolu ve metodu:**

VEYNUA deri altına enjeksiyon (subkütan kullanım) şeklinde verilir. Enjeksiyon karından, uyluktan veya hastayla ilgilenen kişi veya sağlık mesleği mensubu tarafından yapılacaksa kolunuzun üst kısmından yapılabilir.

VEYNUA'nın sizin tarafınızdan mı yoksa sizinle ilgilenen kişi veya sağlık mesleği mensubu tarafından mı enjekte edileceğine siz ve doktorunuz karar vereceksiniz. Siz veya sizinle ilgilenen kişi bu ilacı hazırlamanın ve enjekte etmenin doğru yolu konusunda eğitim alacaksınız. Kalem kullanmadan önce 'Kullanım Talimatları'nı dikkatlice okuyunuz.

#### **Değişik yaş grupları:**

##### **Çocuklarda kullanımı:**

Çocuklarda ve 18 yaş altı ergenlerde VEYNUA'nın kullanılması önerilmemektedir.

##### **Yaşlılarda kullanımı:**

Yaşlı hastalarda (65 yaş ve üzeri) doz ayarlaması gerek değildir.

## **Özel kullanım durumları:**

### **Böbrek yetmezliği:**

Hafif ila orta derecede böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekli değildir. Şiddetli veya son evre böbrek hastalığı olan hastalarda araştırılmamıştır.

### **Karaciğer yetmezliği:**

Hafif karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekli değildir. Orta veya şiddetli karaciğer yetmezliği olan hastalarda araştırılmamıştır.

*Eğer VEYNUA'nın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.*

### **Kullanmanız gerekenden daha fazla VEYNUA kullandıysanız:**

*VEYNUA'dan kullanmanız gerekenden daha fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.*

Çok fazla enjekte ederseniz derhal tıbbi yardım alınız veya bir hastanenin acil servisine gidiniz. Hiçbir belirtiniz olmasa bile bunu yapınız. İlacınızın karton kutusunu veya kaleminizi yanınızda getiriniz.

### **VEYNUA'yı kullanmayı unutursanız:**

VEYNUA dozunuzu kaçıırırsanız, bir sonraki dozunuzu mümkün olan en kısa sürede alınız ve sonrasında aylık enjeksiyonlarınıza devam ediniz.

*Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.*

Bu ilacın kullanımına ilişkin ilave sorularınız varsa doktorunuza, eczacınıza veya hemşirenize sorunuz.

### **VEYNUA ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler**

VEYNUA tedavisinin kesilmesi sonucunda herhangi bir yoksunluk veya güvenlik sorunu yaşanması beklenmemektedir, ancak belirtilen hastalığın semptomları tedavi olmaksızın ilerlemeye devam edecektir.

## **4. Olası yan etkiler nelerdir?**

Tüm ilaçlar gibi VEYNUA'nın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Bu yan etkiler herkeste görülmez.

Yan etkiler aşağıdaki sıklıklarla gerçekleşebilir:

Çok yaygın: 10 hastanın en az 1'inde görülebilir.

Yaygın: 10 hastanın 1'inden az, fakat 100 hastanın 1'inden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın 1'inde az, fakat 1.000 hastanın 1'inden fazla görülebilir.

Seyrek: 1.000 hastanın 1'inden az, 10.000 hastanın 1'inden fazla görülebilir.

Çok seyrek: 10.000 hastanın 1'inden az görülebilir.

Bilinmeyen: Eldeki verilerden hareketle sıklığı tahmin edilemiyor.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

**Çok yaygın:**

- Kan testlerinde görülen etkiler: A vitamini düşüklüğü (A vitamini düşüklüğünün belirtileri için bu kullanma talimatının öncesinde yer alan “VEYNUA’yı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ” Bölümüne bakınız)

**Yaygın:**

- Katarakt
- Kusma
- Proteinüri (idrarda normalden fazla protein bulunması)
- Enjeksiyonun yapıldığı yerde kızarıklık, kaşıntı, ağrı

**Yan etkilerin raporlanması:**

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri [www.titck.gov.tr](http://www.titck.gov.tr) sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

*Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.*

**5. VEYNUA’nın saklanması**

*VEYNUA’yı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.*

Buzdolabında (2°C ila 8°C) saklayınız. Dondurmayınız.

Gerekli durumlarda, VEYNUA buzdolabının dışında 30°C'nin altında, orijinal karton kutusunda 6 haftaya kadar saklanabilir. 6 hafta içerisinde kullanılmazsa atılmalıdır.

Işıktan korumak için orijinal ambalajında saklayınız.

**Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.**

Kullanıma hazır kalem etiketinde ve karton kutusunda 'SKT' şeklinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra bu ilacı kullanmayınız. Son kullanma tarihi o ayın son gününü ifade eder.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

***Ruhsat Sahibi:***

AstraZeneca İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti.  
Şişli/İstanbul

***Üretim Yeri:***

Vetter Pharma-Fertigung GmbH & Co KG  
Schuetzenstrasse, Ravensburg, Almanya

*Bu kullanma talimatı 12/08/2026 tarihinde onaylanmıştır.*

## KULLANIM TALİMATLARI

### VEYNUA™ 45 mg/0,8 mL Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Kullanıma Hazır Kalem (eplontersen)

Bu Kullanım Talimatları, kullanıma hazır kalem kullanılarak VEYNUA 45 mg/0,8 mL Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Kullanıma Hazır Kalemin nasıl enjekte edileceğine ilişkin bilgiler içerir.

**Kullanıma hazır kaleminizi ilk kez kullanmadan önce ve her yeni bir kalem aldığınızda bu Kullanım Talimatlarını okuyunuz. Yeni bilgiler içerebilir.** Bu bilgiler, tıbbi durumunuz veya tedaviniz hakkında sağlık mesleği mensubu ile konuşmanın yerini almaz.

Sağlık mesleği mensubu sizinle ilgilenen kişiye veya size kullanıma hazır kalemi nasıl doğru şekilde kullanacağınızı göstermelidir. Sizinle ilgilenen kişinin veya sizin herhangi bir sorunuz varsa, sağlık mesleği mensubunuzla görüşünüz.

#### **Kalemi kullanmadan önce bilmeniz gereken önemli bilgiler**

- VEYNUA kalemi kullanıma hazır oluncaya kadar orijinal karton kutusunda, 2°C ila 8°C arasındaki buzdolabında saklayınız. İhtiyaç halinde açılmamış bir karton kutu, 30°C'nin altındaki oda sıcaklığında 6 haftaya kadar saklanabilir.
- Kalemi kullanıma hazır olana kadar karton kutusunda saklayınız.
- Her bir kalem 1 doz içerir ve yalnızca 1 kez kullanılabilir.
- Doz, sadece deri altına (subkütan) enjeksiyon olarak verilir.

Aşağıdaki durumlarda kaleminizi **kullanmayınız**:

- Dondurulmuşsa.
- Düşürülmüşse, hasar görmüşse veya kurcalanmış gibi görünüyorsa.
- Son kullanma tarihi (SKT) geçmişse.

Kaleminizi kimseyle **paylaşmayınız**.


- Kaleminizi ve tüm ilaçlarınızı çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde saklayınız.

## Kullanıma hazır kaleminizin


Enjeksiyon verilmeden hemen öncesine kadar kapağı **çıkarmayınız**.

Turuncu iğne koruyucusuna **dokunmayınız**.

### Kullanmadan önce




### Kullandıktan sonra



## Enjeksiyona hazırlanma

### Adım 1 – Enjeksiyonunuz için malzemeleri toplayınız.



### Adım 2 – Buzdolabından çıkarınız ve 30 dakika bekleyiniz.

Enjeksiyondan önce, kullanıma hazır kalemi karton kutusunda 30 dakika 20°C ila 25°C arası oda sıcaklığında tutunuz.

- Başka bir şekilde ısıtmayınız. Örneğin mikrodalgada, sıcak suda veya diğer ısı kaynaklarının yakınında ısıtmayınız.
- Işıktan veya doğrudan güneş ışığından uzak tutunuz.




### Adım 3 – Kullanıma hazır kalem karton kutusundan çıkarınız ve inceleyiniz.

Kullanıma hazır kalemde hasar olup olmadığını kontrol ediniz.

Son kullanma (SKT) tarihini kontrol ediniz.

#### Görüntüleme penceresinden sıvıyı kontrol ediniz.

- Sıvının içinde küçük hava kabarcıklarının görülmesi normaldir.
- Sıvı berrak ve renksiz ila hafif sarı arası kadar renkte olmalıdır.
- Sıvı bulanıksa, rengi bozulmuşsa veya görünür parçacıklar içeriyorsa **kullanmayınız**.



### Kullanıma hazır kaleminizle enjeksiyon yapılması


#### Adım 4 – Bir enjeksiyon bölgesi seçiniz.

Sizinle ilgilenen kişi veya siz uyluğunuzun ön kısmına veya midenizin alt kısmına (karın) enjeksiyon yapabilirsiniz.

Sizinle ilgilenen kişi veya sağlık mesleği mensubu ayrıca üst kolunuzun arkasına da enjeksiyon yapabilir. Kendinize üst koldan enjeksiyon yapmaya **çalışmayınız**.

Her enjeksiyon için, en son enjeksiyon yaptığınız yerden en az 3 cm uzakta bir enjeksiyon bölgesi seçiniz.

- Göbek deliğinizin etrafındaki 5 cm'lik alana,
- Cildin kızarmış, sıcak, hassaslaşmış, morarmış, pullu veya sert olduğu yerlere,
- Yara izlerine, hasar görmüş, rengi solmuş veya dövme cilde,
- Giysi üzerinden enjeksiyon yapmayınız.




### Adım 5 – Ellerinizi yıkayınız ve enjeksiyon bölgesini temizleyiniz.

Ellerinizi sabun ve suyla iyice yıkayınız.

Enjeksiyon bölgesini alkollü mendille veya sabun ve suyla temizleyiniz. Açık havada kurumasını bekleyiniz.


Enjeksiyondan önce temizlenmiş alana **dokunmayınız**.



### Adım 6 – Kapağı çekiniz.

Kalem gövdesini bir elinizle tutunuz ve diğer elinizle şeffaf kapağı dikkatlice çekerek çıkarınız. Turuncu iğne koruyucu artık açığa çıkmıştır ve iğne altına gizlenmiştir.

- Şeffaf kapağı atınız.
- İğneye **dokunmayınız** veya turuncu iğne koruyucusunu parmağınızla itmeyiniz.
- Kullanıma hazır kalemin kapağını tekrar **kapatmayınız**. Bu, ilacın çok erken çıkmasına veya kullanıma hazır kalemin hasar görmesine neden olabilir.




## Adım 7 –Enjeksiyon yapılması

Şekil a, b, c ve d'deki adımları takip ederek kullanıma hazır kalemi kullanarak enjekte ediniz.




Enjeksiyon yaparken, turuncu piston görüntüleme penceresini doldurana kadar kalemi 10 saniye basılı tutun. Enjeksiyonun başlangıcında ilk 'tık' sesini ve enjeksiyonun sonunda ikinci bir 'tık' sesini duyabilirsiniz. Bu normaldir.

Enjeksiyon başladıktan sonra kullanıma hazır kalemi **hareket ettirmeyiniz** veya konumunu **değiştirmeyiniz**.



### Kullanıma hazır kalemi konumlandırınız

- Turuncu iğne korumasını cildinize düz bir şekilde (90 derecelik açı) yerleştiriniz.
- Görüntüleme penceresini görebildiğinizden emin olunuz.



### Sıkıca bastırınız ve tutunuz.

- İlk 'tık' sesini hemen duyabilirsiniz; bu size enjeksiyonun başladığını gösterir.
- Turuncu piston görüntüleme penceresinde aşağı doğru hareket edecektir.

### Yaklaşık 10 saniye boyunca sıkıca basılı tutunuz.

- Turuncu piston görüntüleme penceresini dolduracaktır.
- Enjeksiyonun sonunda ikinci 'tık' sesini duyabilirsiniz

### Enjeksiyonunuz tamamlandıktan sonra kalemi düz bir şekilde yukarı kaldırınız.



- Turuncu iğne koruyucusu aşağıya doğru kayacak ve iğnenin üzerindeki yerine kilitlenecektir.

#### Adım 8 – Görüntüleme penceresini kontrol ediniz.

İlacın tamamının enjekte edildiğinden emin olmak için görüntüleme penceresini kontrol ediniz.

Turuncu piston çubuğu görüntüleme penceresini doldurmuyorsa dozun tamamını almamış olabilirsiniz.

Böyle bir durumla karşılaşırsanız veya başka endişeleriniz varsa doktorunuza veya sağlık mesleği mensubunuza başvurunuz.



Enjeksiyondan önce




Enjeksiyondan sonra

#### Adım 9 – Enjeksiyon bölgesini kontrol ediniz.

Enjeksiyon bölgesinde az miktarda kan veya sıvı olabilir. Bu normaldir.

Gerekirse bölgeye bir pamuk veya gazlı bez bastırınız ve küçük bir bandaj uygulayınız.



#### Adım 10 – Kullanılmış kullanıma hazır kalemi atınız.

Kullanılmış kaleminizi kullanımdan hemen sonra delinmeye dayanıklı **kesici alet atık kutusuna** koyunuz.

Kalemi ev atıklarınızla birlikte **atmayınız**.



**İmha etme kuralları**

Dolu kabı sađlık mesleđi mensubunuz veya eczacınızın talimatına gre atınız. Kullanılmıř kesici alet atık kabını **geri dnřtrmeyiniz.**