

## KULLANMA TALİMATI

### NOTUSS 15 mg/5 ml şurup

Ağız yoluyla alınır.

- **Etkin madde:** Her 5 ml şurup, 15 mg butamirat sitrat (3 mg/ml) içerir.
- **Yardımcı maddeler:** Sitrik asit monohidrat, sodyum sitrat, sorbitol, likit (non-kristalin) (%70), propilen glikol, gliserol, sukraloz, sodyum benzoat (E 211), masking flavor 501522 T, portakal aroması FM053918, saf su.

**Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin/çocuğunuz için önemli bilgiler içermektedir.**

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin/çocuğunuz için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size/çocuğunuza önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

### **Bu Kullanma Talimatında:**

1. **NOTUSS nedir ve ne için kullanılır?**
2. **NOTUSS’u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **NOTUSS nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **NOTUSS’un saklanması**

Başlıkları yer almaktadır.

#### **1. NOTUSS nedir ve ne için kullanılır?**

- NOTUSS etkin madde olarak butamirat sitrat içeren, şurup formunda bir ilaçtır.
- NOTUSS, “öksürük baskılayıcı ilaçlar” olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir.
- NOTUSS şurup, çocuk korumalı kapaklı, bal renkli 100 ml’lik şişelerde, 5 ml’lik ölçü kaşığı ile birlikte kullanıma sunulmaktadır.
- NOTUSS çeşitli nedenlerden kaynaklanan öksürüğün şikayetlere yönelik (semptomatik) tedavisinde kullanılır.

#### **2. NOTUSS’u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**

#### **NOTUSS’u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ**

Eğer sizin/çocuğunuzun butamirat veya NOTUSS’un bileşiminde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı (yardımcı maddeler listesine bakınız) alerjiniz/alerjisi varsa  
Eğer çocuğunuz 3 yaşın altında ise NOTUSS’u kullanmayınız.



## **NOTUSS'u ařağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ**

Eęer siz/çocuęunuz aynı zamanda başka balgam söktürücü ilaçlar alıyorsanız, dikkatli olmalısınız. NOTUSS'un bu tür ilaçlarla aynı anda kullanılmaması önerilir.

6 yařın altında önerilmez.

Bu uyarılar geçmiřteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin/çocuęunuz için geçerliyse lütfen doktorunuza danıřınız.

Öksürük kötüleřirse ya da 7 günden daha uzun süre devam ederse ve/veya ateř ya da inatçı bař ağrısı olursa doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

## **NOTUSS'un yiyecek ve iecek ile kullanılması**

NOTUSS'un yiyecek ve ieceklerle etkileřimi yoktur.

NOTUSS'u aç ya da tok karına kullanabilirsiniz.

## **Hamilelik**

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.*

Hamile iseniz, ilk üç ay NOTUSS kullanmamanız önerilmektedir. Daha sonrakidönemde, ancak doktorunuz kesin gereklilik olduęuna karar verirse NOTUSS kullanabilirsiniz.

*Tedaviniz sırasında hamile olduęunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.*

## **Emzirme**

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.*

Bebeęinizi emziriyorsanız, NOTUSS almadan önce doktorunuza danıřınız.

## **Ara ve makine kullanımı**

NOTUSS uyukulu hissetmenize neden olabilir. Bu nedenle ara ve makine kullanırken veya dikkat gerektiren dięer iřleri yaparken dikkatli olunuz.

## **NOTUSS'un ierięinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler**

NOTUSS, her 5 ml řurup başına 2,5 g sorbitol ierir. Sorbitol gastrointestinal rahatsızlıęa ve hafifderecede laksatif etkiye neden olabilir.

NOTUSS, her 5 ml řurup başına 1 mmol (23 mg)'dan daha az sodyum ihtiva eder; yani aslında "sodyum iermez".

NOTUSS, her 5 ml řurup başına 1,5 g propilen glikol ierir. Bebeęiniz 4 haftadan küçük ise özellikle eęer bebeęe propilen glikol veya alkol ieren dięer ilaçlar veriliyorsa bu ilacı vermeden önce doktorunuzla veya eczacınızla temasa geiniz.

NOTUSS, her 5 ml řurup başına 5 mg sodyum benzoat ierir. Sodyum benzoat yeni doęmuş bebeklerde (4 haftalık olana kadar) sarılık riskini arttırabilir.

## **Dięer ilaçlar ile birlikte kullanımı**

Eęer balgam söktürücü özellięi olan başka ilaçlar kullanıyorsanız doktorunuzu mutlaka bilgilendiriniz.



*Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.*

### **3. NOTUSS nasıl kullanılır?**

#### **Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:**

Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde kendiniz/çocuğunuz için belirtilen dozlarda kullanınız:

6 yaşın altındaki çocuklarda kullanımı önerilmez.

6-12 yaşındaki çocuklarda: Günde 3 defa 1 kaşık (5 ml)

12 yaş üzeri ergenlerde (adolesanlarda): Günde 3 defa 1,5 kaşık (7,5 ml)

Yetişkinlerde: Günde 4 defa 1,5 kaşık (7,5 ml)

Doktorunuz farklı bir tavsiyede bulunmadıkça, NOTUSS'u 7 günden daha uzun süre kullanmayınız.

#### **Uygulama yolu ve metodu:**

NOTUSS ağız yoluyla kullanılır.

İlacınızın dozunu ayarlanmak için dereceli kaşığı kullanınız. Dereceli kaşığı her kullanımda yıkayıp kurutunuz.

#### **Değişik yaş grupları:**

##### **Çocuklarda kullanımı:**

NOTUSS Şurup 3 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır. NOTUSS Şurup'un, 6 yaş altındaki çocuklarda kullanımı önerilmez.

##### **Yaşlılarda kullanımı:**

NOTUSS'un yaşlılarda kullanımı araştırılmamıştır.

#### **Özel kullanım durumları:**

##### **Böbrek/Karaciğer yetmezliği:**

NOTUSS böbrek veya karaciğer yetmezliği olan hastalarda araştırılmamıştır.

*Eğer NOTUSS'un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.*

#### **Kullanmanız gerekenden daha fazla NOTUSS kullandıysanız:**

NOTUSS'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor ve eczacı ile konuşunuz.

#### **NOTUSS'u kullanmayı unutursanız:**

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Aşırı dozda NOTUSS alınması halinde şu belirtiler görülebilir: Uyku hali, bulantı, kusma, ishal, sersemlik ve tansiyon düşmesi. Bu etkiler doz azaltılınca veya tedavi kesilince ortadan kalkabilir. Eğer ilaç kesildiğinde bu etkiler devam ediyorsa doktorunuz veya eczacınıza danışınız.

#### **NOTUSS ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler**

Bulunmamaktadır.



#### 4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, NOTUSS Şurup'un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler görülme sıklıklarına göre aşağıdaki şekilde sıralanmıştır.

- Çok yaygın: 10 hastanın en az birinde görülebilir.
- Yaygın : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
- Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.
- Seyrek : 1000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
- Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
- Bilinmiyor: Eldeki veriler ile tahmin edilemiyor.

**Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:Seyrek:**

- Uyku hali
- Bulantı, ishal
- Ürtiker (kurdeşen)

Bunlar NOTUSS'un hafif yan etkileridir.

#### Yan etkilerin raporlanması

Kullanma talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri [www.titck.gov.tr](http://www.titck.gov.tr) sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

*Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.*

#### 5. NOTUSS'un saklanması

*NOTUSS'u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.*

25°C altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

**Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.**

*Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra NOTUSS'u kullanmayınız.*

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz NOTUSS'u kullanmayınız.

*Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.*

#### **Ruhsat Sahibi :**

Tripharma İlaç San. ve Tic. A.Ş.  
Maslak / İstanbul



**Üretim Yeri:**

Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.  
Esenyurt / İstanbul

*Bu kullanma talimatı 20/09/2025 tarihinde onaylanmıştır.*

