

KULLANMA TALİMATI

GLOSFATE 216 mg/mL infüzyonluk çözelti konsantresi

Damar içine uygulanır.

Steril

- **Etkin madde:** Sodyum gliserofosfat 5H₂O: 306,1 mg*
*216 mg sodyum gliserofosfata eşdeğerdir.
- **Yardımcı madde(ler):** Hidroklorik asit, enjeksiyonluk su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

Bu Kullanma Talimatında:

1. **GLOSFATE nedir ve ne için kullanılır?**
2. **GLOSFATE kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **GLOSFATE nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **GLOSFATE'in saklanması**

Başlıkları yer almaktadır.

1. GLOSFATE nedir ve ne için kullanılır?

GLOSFATE; vücut için gerekli olan fosfat bileşiklerini içeren berrak, renksiz ve gözle görülebilir partikül içermeyen konsantre bir çözeltidir.

Kutuda; 10 adet, bromobutil tıpa ve alüminyum flip-off kapak ile kapatılmış, tip I cam flakon şeklinde piyasaya sunulmaktadır.

GLOSFATE; yetişkinlerin ve bebeklerin damar yoluyla beslenmesinde fosfat gereksinimi karşılamak üzere destekleyici olarak kullanılır.

2. GLOSFATE'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

GLOSFATE'ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

- Vücudunuzda su kaybı varsa

- Kandaki sodyum düzeyiniz yüksek ise
- Kandaki potasyum düzeyiniz yüksek ise
- Ağır böbrek yetmezliğiniz varsa
- Şok durumundaysanız

GLOSFATE'ı kullanmayınız.

GLOSFATE'ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer; böbrek fonksiyon bozukluğunuz varsa GLOSFATE'ı dikkatli kullanınız.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

GLOSFATE'ın yiyecek ve içecek ile kullanılması

GLOSFATE'ın uygulama yöntemi açısından yiyecek ve içecekler ile etkileşmesi beklenmemektedir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ürünle ilgili, hamilelik sırasında klinik araştırmalar ve hayvanlarda üreme çalışmaları gerçekleştirilmemiştir. Buna rağmen, hamile bir kadında fosfat gereksinimi hamile olmayan bir kadınla karşılaştırıldığında hafif oranda artış göstermektedir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

GLOSFATE'ın emzirme döneminde kullanımından önce risk/yarar ilişkisi dikkate alınmalıdır.

Araç ve makine kullanımı

Araç ve makine kullanma üzerine etkisinin olabileceği düşünülmemektedir.

GLOSFATE'ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu ilaç her 1 mL'de 46 mg sodyum (ana yemek bileşeni/sofra tuzu) içerir. Bu erişkin için önerilen günlük maksimum diyetle sodyum alım miktarının %2,3'üne eşdeğerdir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Diğer tıbbi ürünlerle herhangi bir etkileşim gözlenmemiştir ancak damardan karbonhidrat infüzyonu sırasında kanınızdaki fosfat seviyesinde orta derecede bir düşme görülebilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. GLOSFATE nasıl kullanılır?

- **Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:**

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

Yetişkinlerde kullanımı: Doz kişiye göre ayarlanır. Damardan beslenme boyunca tavsiye edilen günlük fosfat miktarı, 10-20 mmol'dür. Bu miktar 10-20 mL GLOSFATE'ın infüzyon çözeltisine veya geçimliliği kanıtlanmış karışıma ilave edilmesiyle karşılanır.

- **Uygulama yolu ve metodu:**

Damarınıza yerleştirilen küçük bir borudan (kateter) verilir.

GLOSFATE seyreltilmeden verilmemelidir.

- **Değişik yaş grupları:**

Çocuklarda kullanımı:

Doz kişiye göre ayarlanır. Bebekler ve yeni doğanlar için tavsiye edilen doz 1-1,5 mmol/kg vücut ağırlığı/gün'dür.

Yaşlılarda kullanımı:

Doz kişiye göre ayarlanır. Damardan beslenme boyunca tavsiye edilen günlük fosfat miktarı, 10-20 mmol'dür. Bu miktar 10-20 mL GLOSFATE'ın infüzyon çözeltisine veya geçimliliği kanıtlanmış karışıma ilave edilmesiyle karşılanır.

- **Özel kullanım durumları:**

Karaciğer/Böbrek yetmezliği:

Karaciğer/böbrek yetmezliği ile ilgili özel bir veri bulunmamaktadır.

Eğer GLOSFATE'ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla GLOSFATE kullandıysanız:

GLOSFATE'tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

GLOSFATE'ı kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

GLOSFATE ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

GLOSFATE tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkilere dair herhangi bir veri bulunmamaktadır.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi GLOSFATE'ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Bununla birlikte bu ilacın kullanımıyla ilgili önemli bir yan etki bildirilmemiştir.

Yan etkilerin raporlanması:

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan 'İlaç Yan Etki Bildirimi' ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5. GLOSFATE'ın saklanması

GLOSFATE'ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Dondurmayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra GLOSFATE'ı kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz GLOSFATE'ı kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat sahibi: POLİFARMA İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Küçükçekmece / İstanbul
Tel: 0212 481 00 13

Üretim yeri: AROMA İlaç San. Ltd. Şti.
Ergene / Tekirdağ

Bu kullanma talimatı 22/07/2026 tarihinde onaylanmıştır.



AŞAĞIDAKİ BİLGİLER BU İLACI UYGULAYACAK SAĞLIK PERSONELİ İÇİNDİR.

GLOSFATE seyreltilmeden verilmemelidir.

İlaveler aseptik olarak yapılmalıdır.

- 120 mL GLOSFATE ve 48 mmol kalsiyum (CaCl_2 halinde), 1.000 mL Vamin Glukoz Çözeltisi içerisine enjekte edildikten sonra,
- 120 mL GLOSFATE ve 48 mmol kalsiyum (CaCl_2 halinde), 1.000 mL Vamin 18 Elektrolitsiz Çözeltisi içerisine enjekte edildikten sonra,
- 10 mL GLOSFATE ve 10 mmol kalsiyum (CaCl_2 halinde), 1.000 mL Glukoz 50 mg/mL Çözeltisi içerisine enjekte edildikten sonra,
- 20 mL GLOSFATE ve 20 mmol kalsiyum (CaCl_2 halinde), 1.000 mL Glukoz 200 mg/mL Çözeltisi içerisine enjekte edildikten sonra,
- 60 mmol GLOSFATE ve 24 mmol kalsiyum (CaCl_2 halinde), 1.000 mL Glukoz 500 mg/mL Çözeltisi içerisine enjekte edildikten sonra kullanılabilir.

İnfüzyon zamanı:

İnfüzyon süresi 8 saatten az olmamalıdır.

Stabilite:

İnfüzyon çözeltisine ilaveler yapıldığında, mikrobiyolojik kontaminasyonu önlemek amacıyla infüzyon 24 saat içerisinde gerçekleştirilmelidir. Açılan flakonlardan arta kalan kısım atılmalıdır ve sonraki bir kullanım için saklanmamalıdır.

Bu ilaçla ilgili ayrıntılı ve güncel bilgilere, akıllı telefon/tablet veya bir karekod okuyucu ile karekodu tarayarak ulaşabilirsiniz.