

KULLANMA TALİMATI

ORLOFF 60 mg sert kapsül

Ağızdan alınır.

- **Etkin madde:** Her bir kapsül 120 mg orlistat pellet % 50'liğe eşdeğer 60 mg orlistat içerir.
- **Yardımcı maddeler:** Laktoz monohidrat (sığır kaynaklı), povidon K-30, sodyum nişasta glikolat, sodyum lauril sülfat, indigotin –FD&C Blue2, titanyum dioksit ve jelatin (sığır kaynaklı).

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlacınız hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük doz** kullanmayınız.*

Bu Kullanma Talimatında:

- 1. ORLOFF nedir ve ne için kullanılır?**
- 2. ORLOFF'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
- 3. ORLOFF nasıl kullanılır?**
- 4. Olası yan etkiler nelerdir?**
- 5. ORLOFF'un saklanması**

Başlıkları yer almaktadır.

1. ORLOFF nedir ve ne için kullanılır?

ORLOFF, aşırı kilolu (beden kütle indeksi [BKİ] 28 veya üzeri) 18 ve üstü yaşındaki yetişkinlerde düşük kalorili, düşük yağ içerikli besinlerle birlikte kullanılır.

BKİ, boyunuza göre sağlıklı bir kiloda veya fazla kiloda olup olmadığınızı öğrenmenin bir yoludur. Aşağıdaki tablo aşırı kilolu olup olmadığınızı ve ORLOFF'un size uygun olup olmadığını bulmanıza yardımcı olacaktır. Tablodan kilonuzu bulun, boyunuza göre verilen vücut ağırlığından daha zayıfsanız ORLOFF kullanmayınız.

Boy	Kilo
1,50 m	63 kg
1,55 m	67,25 kg
1,60 m	71,75 kg
1,65 m	76,25 kg
1,70 m	81 kg
1,75 m	85,75 kg
1,80 m	90,75 kg
1,85 m	95,75 kg
1,90 m	101 kg

Aşırı kilolu olmak çeşitli ciddi sağlık problemlerinin gelişme riskini artırır. Örneğin, şeker hastalığı (diyabet) ve kalp hastalığı. Bu durumlar iyi hissetmemenize neden olabilir, bu yüzden genel sağlık kontrolü için doktorunuzla görüşmelisiniz.

ORLOFF'un etken maddesi orlistat sindirim sistemindeki yağı hedeflemek için tasarlanmıştır. Orlistat, yemeklerdeki yağın dörtte birinin emilimini durdurur. Bu yağ vücutta dışkı ile atılır. Diyet ile ilişkili tedavi etkilerini deneyimleyebilirsiniz. Bu yüzden bu etkileri engellemek için düşük yağ içerikli gıdalar alınması önemlidir. Kapsüller tek başına diyet ile karşılaştırıldığında daha fazla kilo kaybetmenize yardımcı olacaktır. Tek başına diyetle kaybedilen her bir 2 kg (4 lb) için ORLOFF 1 kg (2 lb) daha vermenize yardımcı olabilir.

2. ORLOFF'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ORLOFF'u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

- Orlistat veya ORLOFF'un içeriğindeki herhangi bir maddeye karşı alerjik iseniz.
- Hamileyseniz veya emziriyorsanız
- Siklosporin (organ nakillerinden sonra, ciddi eklem iltihabı ve ciddi bazı deri etkileri için kullanılan bir ilaç) alıyorsanız
- Varfarin veya diğer kan pıhtılaşmasını önleyici ilaçlar alıyorsanız
- Kolestazınız (karaciğerden safra akışının kesildiği durum) varsa
- Kronik malabsorbsiyon sendromunuz (alınan besinlerin sindirim kanalından yeterli derecede emilememesi) varsa

ORLOFF'u kullanmayınız.

ORLOFF'u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

- Şeker hastalığınız (diyabet) varsa. Şeker hastalığı için kullandığınız ilacın dozunun ayarlanmasına ihtiyaç duyulabileceğinden doktorunuzu bilgilendiriniz.
- ORLOFF kullanımı kronik böbrek bozukluğu olan hastalarda böbrek taşına yol açabilir. Böbrekleriniz ile ilgili rahatsızlığınızın olup olmadığı konusunda doktorunuzu bilgilendiriniz.
- ORLOFF, barsak alışkanlıklarınızda, sindirilmemiş olan yağın dışkıyla atılmasından ötürü yağlı dışkılama gibi zararsız değişikliklere sebep olabilir. Eğer ORLOFF yüksek oranda yağ içeren bir diyetle birlikte alınırsa, yağlı dışkılama ihtimali artar. ORLOFF yüksek oranda yağ içeren bir diyetle alındığında sindirim sisteminiz üzerindeki (gastrointestinal sistem) etkileri artabileceğinden, günlük yağ alımınız üç ana öğüne dağıtılmalıdır.
- Rektal (makat bölgesinde) kanamanız varsa.
- Kilo kaybı, diğer rahatsızlıklarınız için (örneğin yüksek kolesterol, hipertansiyon diyabet,) kullanmakta olduğunuz ilaçların dozunu etkileyebilir. Almakta olduğunuz veya gelecekte alabileceğiniz ilaçlar hakkında doktorunuzla konuşunuz. Kilo kaybı nedeniyle bu ilaçların dozlarında yeni düzenlemelere ihtiyacınız olabilir.
- Her gün bir adet multivitamin almalısınız. ORLOFF vücudunuz tarafından emilen bazı vitaminlerin seviyelerini düşürebilir. Multivitamin A, D, E, K vitaminlerini

içermelidir. Vitaminlerin emildiğinden emin olmak için multivitamini yatmadan önce, ORLOFF almayıorken kullanın.

- Amiodaron alan hastalar ORLOFF ile tedaviye başlamadan önce doktora danışmalıdır (Bkz. Bölüm 4.5).
- Şiddetli diyare durumunda oral kontrasepsiyon (hamile kalmayı önlemek için ağızdan yutularak ilaç alınması) yetersiz kalabileceği için, ek bir korunma yöntemi düşünülmelidir.
- Orlistat ve levotiroksin eşzamanlı uygulandıklarında hipotiroidizm ve/veya hipotiroidizm kontrolünde azalma meydana gelebilir (Bkz. Bölüm 4.5). Levotiroksin alan hastalar ORLOFF ile tedaviye başlamadan önce doktora danışmalıdır, çünkü levotiroksinin farklı zamanlarda alınmasına ihtiyaç duyulabilir ve levotiroksin dozunun ayarlanması gerekebilir.
- Hastalar ORLOFF'u antiretroviral ilaçla eşzamanlı almadan önce doktora danışmalıdır. Orlistatın HIV için kullanılan antiretroviral ilaçların absorpsiyonunu azaltma potansiyeli bulunur ve HIV için kullanılan antiretroviral ilaçların etkililiğini negatif olarak etkileyebilir.

ORLOFF laktoz içerir. Nadir kalıtsal galaktoz intoleransı, Lapp laktoz yetmezliği ya da glikoz-galaktoz malabsorpsiyon problemi olan hastaların bu ilacı kullanmamaları gerekir.

ORLOFF her dozunda 1 mmol (23 mg)'dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında sodyum içermez.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerli ise lütfen doktorunuza danışınız.

ORLOFF'un yiyecek ve içecek ile kullanılması

ORLOFF, düşük kalorili, düşük yağ içerikli diyet ile beraber kullanılmalıdır. Bu diyetle tedaviye başlamadan önce başlamayı deneyiniz.

Yüksek yağ içerikli bir yemek yiyorsanız, tavsiye edilen dozdan daha fazla doz almayınız. Kapsülü çok fazla yağ içeren yemekle birlikte almak diyet ile ilişkili tedavi etkilerinin ortaya çıkma olasılığını arttırır. ORLOFF alırken yüksek yağ içerikli gıdaların alınmasından kaçınılmalıdır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

ORLOFF hamilelik döneminde kullanılmamalıdır.

Tedavi sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

ORLOFF emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

Araç ve makine kullanımı

ORLOFF, araç ve makine kullanımı üzerinde bir etkiye sahip değildir veya ihmal edilebilir bir etkiye sahiptir.

ORLOFF'un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

ORLOFF laktoz monohidrat içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı duyarlılığınız olduğu söylenmişse, bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

ORLOFF her dozunda 1 mmol (23 mg)'dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında sodyum içermez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Aşağıdaki ilaçları alıyorsanız ORLOFF kullanmayınız;

- Siklosporin (organ nakillerinden sonra, ciddi eklem iltihabı ve ciddi bazı deri etkileri için kullanılan bir ilaç)
- Varfarin veya diğer kan pıhtılaşmasını önleyici ilaçlar

ORLOFF aldığınız bazı ilaçları etkileyebilir.

- Doğum kontrol hapları ciddi ishaliniz varsa daha az etkili olabilir. Ciddi ishal durumunda ilave doğum kontrol metodu tavsiye edilir.
- ORLOFF vücuttan emilen bazı vitaminlerin düzeyini azaltacağından her gün çok vitaminli ilaçlar almalısınız. Çok vitaminli ilaçlar A, D, E, K vitaminlerini içermelidir. Çok vitaminli ilaçları yatma zamanı almalısınız.

Aşağıdaki ilaçları alıyorsanız ORLOFF almadan önce doktorunuzla konuşunuz.

- Amiodaron (kalp ritim problemleri için kullanılan bir ilaç)
- Akarboz (tip 2 şeker hastalığının tedavisi için kullanılan bir ilaç), ORLOFF akarboz alan bireyler için tavsiye edilmez.
- Levotroksin içeren ilaçların; orlistat etkin maddesini içeren ilaçlarla birlikte alındığından emilimi bozulduğundan, iki ilacın en az 2 saat ara verilerek alınması gerekmektedir.
- Sara tedavisinde etkili ilaçlar (antiepileptik ilaçlar), havalenizin (tutarık) sıklığındaki ve ciddiyetindeki değişimler doktorunuzla tartışılmalıdır.
- HIV tedavisinde kullanılan ilaçlar. HIV tedavisi alıyorsanız ORLOFF almadan önce doktorunuza danışınız.
- Yüksek kan basıncı için bir ilaç alıyorsanız, ORLOFF dozunun ayarlanması gerekebilir.
- Yüksek kolesterol için bir ilaç alıyorsanız, ORLOFF dozunun ayarlanması gerekebilir.
- Depresyon, psikiyatrik hastalıklar ve kaygı için kullanılan ilaçlar.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı su anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. ORLOFF nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

18 yaş ve üstü yetişkinler için:

ORLOFF'u her zaman doktorunuzun size söylediği şekilde kullanınız. Emin olmadığınız durumlarda doktor veya eczacınıza danışınız.

- Kullanılması gereken ORLOFF dozu günde üç kere 1 adet kapsüldür.
- Kapsüller her ana öğüne başlamadan hemen önce, öğün sırasında veya öğünden bir saat sonrasına kadar su ile alınmalıdır Buna göre kahvaltıda bir kapsül, öğle yemeğinde bir kapsül ve akşam yemeğinde bir kapsül alınması anlamına gelmektedir. Üç ana öğününüzün dengeli, kalorisi azaltılmış ve az yağlı olmasına dikkat ediniz.
- Eğer bir öğün atlanırsa veya yemekte yağ alınmadıysa, ORLOFF dozu atlanmalıdır.
- Kapsülü bütün olarak suyla yutunuz.

- Günde 3 kapsülden fazla almayınız.
- Diyet ile ilişkili tedavi etkilerinin ortaya çıkma durumunu azaltmak için düşük yağ içerikli yemekler yenmelidir.
- Kapsülleri almaya başlamadan önce fiziksel olarak daha aktif olmaya çalışın. Fiziksel aktivite kilo verme programının önemli bir parçasıdır. Daha önce egzersiz yapmadıysanız doktorunuza danışmayı unutmayın. ORLOFF kullanırken ve bıraktığınızda bu aktifliği sürdürünüz.

Kilo kaybı için hazırlık

Başlangıç tarihinin seçimi

Önceden kapsülleri almaya başlayacağınız günü seçiniz. Kapsülleri almaya başlamadan önce düşük kalorili, düşük yağ içerikli diyetle başlamak vücudu yeni yeme alışkanlıklarına alıştıırılır. Yemek günlüğünüzde hangi yemekleri yediğinizin kaydını tutunuz. Yemek günlükleri etkilidir, çünkü ne yediğiniz, ne kadar yediğiniz hakkında bir farkındalık yaratır, değişim yapmak için bilgi sağlar.

Kilo kaybı hedefine karar vermek

Ne kadar kilo kaybetmek istediğiniz hakkında düşününüz ve sonrasında hedef bir ağırlık belirleyiniz. Amaç başlangıç ağırlığının %5'i ila %10'u arasında bir ağırlık kaybıdır. Kaybettiğiniz ağırlık miktarı haftadan haftaya değişebilir. Amacınız haftada kararlı bir halde yaklaşık 0,5 kg'lık (1 lb) bir ağırlık kaybı olmalıdır.

Kalori ve yağ hedeflerinizin düzenlenmesi

Kilo kaybı amacınıza ulaşmak için biri kaloriler diğeri de yağ için olmak üzere günlük iki hedefe ihtiyaç duyulur.

Eğer bir öğünü kaçıırırsanız veya yediğiniz yemek yağ içermiyorsa ORLOFF almayınız. ORLOFF öğününüzde yağ mevcutsa işlevini görür.

ORLOFF'u 6 aydan daha uzun süre kullanmayın. ORLOFF kullandıktan 12 hafta sonra kilo kaybetmezseniz, tavsiye için doktorunuza veya eczacınıza danışınız. ORLOFF'u bırakmanız gerekebilir.

Başarılı kilo kaybı sadece kısa bir periyot boyunca farklı yeme alışkanlıklarıyla elde edilmez, ayrıca hayat tarzı değişiklikleri (Örneğin yenilen yiyecekler ve ne kadar aktif olduğunuz) de gereklidir.

Uygulama yolu ve metodu:

ORLOFF ağızdan alınmalıdır.

Kapsülleri çiğnmeden yeterli miktarda sıvı ile yutunuz (örneğin, bir bardak su ile).

Değişik yaş grupları**Çocuklarda kullanım:**

18 yaşın altındaki çocuklarda ORLOFF alınmamalıdır.

Yaşlılarda kullanım:

ORLOFF'un yaşlılarda kullanımı sırasında doz ayarlaması gerekli değildir.

Özel kullanım durumları**Böbrek yetmezliği:**

ORLOFF'un böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekli değildir.

Karaciğer yetmezliği:

ORLOFF karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekli değildir.

Eğer ORLOFF'un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla ORLOFF kullandıysanız:

Kullanmanız gerekenden daha fazla ORLOFF kullandıysanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

ORLOFF'u kullanmayı unutursanız

Eğer ORLOFF'u almayı unutursanız son öğününüzden sonra bir saat içinde olmak koşulu ile hatırlar hatırlamaz alınız, sonra normal zamanında almaya devam ediniz. Son ana yemeğinizin üzerinden bir saatten fazla zaman geçtiyse unutulmuş kapsülü almayınız. Bekleyiniz ve bir sonraki kapsülü her zamanki gibi bir sonraki ana öğünüze yakın bir zamanda alınız.

Eğer birden fazla dozu almayı unutursanız, lütfen doktorunuzu bilgilendiriniz ve size verilen tavsiyeye uyunuz. Doktorunuz söylemeden dozunuzu değiştirmeyiniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

ORLOFF ile tedavi sonlandığında oluşabilecek etkiler

ORLOFF tedavisini bırakmayı düşünüyorsanız, önce doktorunuza danışınız.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi ORLOFF'un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler görülebilir.

ORLOFF ile ilişkili yan etkilerin çoğu (örneğin daha sık bağırsak hareketleri ve yumuşak dışkı) etki mekanizması ile ilişkilidir.

Diyet ile ilişkili tedavi etkilerine yardım etmek için daha düşük yağ içerikli gıdalar alınmalıdır.

Aşağıdakilerden biri olursa ORLOFF'u kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

- Ciddi alerjik reaksiyon – ani kaşıntı, döküntü (kurdeşen), eller, ayaklar, bilekler, yüz, dudaklar, ağız veya boğazın şişmesi (yutkunmayı veya nefes almayı zorlaştırabilen) hızlı kalp atışı, baygınlık

Bunlar çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bu belirtilerden biri sizde mevcut ise, acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Ciddi yan etkiler

- Rektumda (kalın barsağın son bölümü) kanama
- Kalın bağırsak iltihabı. Belirtiler arasında karın ağrısı (özellikle sol tarafta), ateş, kabızlık
- Pankreas iltihabı. Belirtiler arasında bazen arkaya yayılan ciddi karın ağrısı, ateş, mide bulantısı ve kusma
- Deride kabarma
- Safra taşlarının neden olduğu ciddi mide ağrısı
- Karaciğer iltihabı. Belirtileri arasında derinin ve gözlerin sararması, kaşıntı, koyu renkli idrar, mide ağrısı, karaciğer hassasiyeti, bazen iştah kaybı
- Oksalat nefropati (böbrek taşlarının oluşumuna neden olan kalsiyum oksalat birikimi)

Bu ciddi yan etkilerden herhangi biri meydana gelirse ORLOFF almayı bırakınız. Doktorunuza söyleyiniz.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

Çok yaygın : 10 hastanın en az 1'inde görülebilir.

Yaygın : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan : 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek	: 1.000 hastanın birinden az görülebilir.
Çok seyrek	: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
Bilinmiyor	: Eldeki veriler ile belirlenemeyecek kadar az hastada görülebilir.

Çok yaygın

- Yağlı lekelenme varlığında veya yokluğunda gaza bağlı mide-bağırsakta şişkinlik
- Ani bağırsak hareketleri
- Yağlı dışkı
- Yumuşak dışkı
- Gaz çıkarma

Yaygın

- Karın ağrısı
- Dışkı kaçıрма
- Sıvı dışkı
- Daha sık bağırsak hareketleri
- Endişe

Bilinmiyor

- Bazı karaciğer enzimlerinin düzeylerinde artışlar
- Kan pıhtılaşmasını önleyen ilaçlar (varfarin) veya kan inceltici ilaçlar (anti-koagülant) alan bireylerde kan pıhtılaşması üzerine etkiler
- Kan pıhtılaşmasını sağlayan protein (protrombin) azalması ve kanama zamanının uzaması. Kanın pıhtılaşmasını önleyici ilaçlarla (antikoagulan ilaçlar) pıhtılaşma üzerine etki
- Ciddi alerjik durumları olan bazı insanlarda bu etkili alerjenlere maruziyet sonrasında yaşamı tehdit edici bir olay (Anafilaksi)
- Akciğerlerinizdeki hava yollarını (bronşları) çevreleyen kasların kasılması (Bronkospazm) ve buna bağlı hava yollarının daralması
- Yüz, el ve ayaklarda şişme (Anjiyoödem)
- Kaşıntı (Pruritus)
- Döküntü (raş) ve kurdeşen (ürtiker) dahil aşırı duyarlılık reaksiyonları
- Bağırsak duvarının dışarıya doğru kesecik halde çıkıntı yapması ve bu yapının iltihaplanması (Divertikülit)

- Pankreas iltihabı (Pankreatit)
- Hafif rektal kanama
- Ciddi olabilen hepatit (Bazı ölümcül vakalar veya karaciğer nakli gerektiren vakalar bildirilmiştir)
- Safra kesesi taşı (Kolelityazis)
- Transaminazlarda ve alkalen fosfatazda artış
- Deride su toplanarak kabarcık oluşması (kabarcıklar patlayabilir)
- Böbrek taşına ve buna bağlı son dönem böbrek yetmezliğine neden olabilen kalsiyum oksalat birikmesi (Oksalat nefropati)

En yaygın olarak görülen yan etkiler kapsüllerin etki mekanizması nedenlidir. Böyle etkiler tipik olarak kapsüllerin kullanımında ilk birkaç hafta içerisinde meydana gelir. Diyet ile ilişkili tedavi etkileri önceden daha fazla yağ aldığınızı gösterebilir.

Aşağıdaki kılavuzlarla diyet ile ilişkili tedavinin etkilerini minimize etmeyi öğrenebilirsiniz.

- Kapsülleri almaya başlamadan birkaç gün önce veya bir hafta önce düşük yağ içerikli diyetle başlanır.
- Sevdiğiniz gıdaların ne kadar yağ içerdiği hakkında ve ne kadar aldığınız hakkında bilgi sahibi olunuz. Kendinizi az miktarlara alıştırmak hedef yağ içeriğinizi kazara aşmazsınız.
- Kullanmanız gereken yağ içeriğini gün içerisinde yemekler arasında bölünüz.
- Etkileri deneyimleyen çoğu kullanıcı besinlerini ayarlayarak onları kontrol altına alabilir.

Bu problemlerin hiçbirini yaşamazsanız bu, kapsüllerin kullanılmadığı anlamına gelmez.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etkileri Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans

Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5. ORLOFF'un saklanması

ORLOFF'u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajındaki son kullanma tarihinden sonra ORLOFF'u kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluk fark ederseniz ORLOFF'u kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat Sahibi:

World Medicine İlaç San ve Tic A.Ş.

Bağcılar, İstanbul

Üretim yeri:

World Medicine İlaç San ve Tic A.Ş.

Bağcılar, İstanbul

Bu kullanma talimatı 08.02.2024 tarihinde onaylanmıştır.