

## KULLANMA TALİMATI

**PİASKY 340 mg/2 mL SC/IV enjeksiyonluk/infüzyonluk çözelti**

**Damar içine/deri altına uygulanır.**

**Steril**

- **Etkin madde:** Bir flakon, 340 mg/2 mL konsantrasyonda 340 mg crovalimab içerir. 1 mL çözelti 170 mg crovalimab içerir. Crovalimab, Çin Hamster Yumurtalık hücrelerinden üretilmiştir.
- **Yardımcı maddeler:** L-histidin, l-aspartik asit, l-arjinin hidroklorür, poloksamer 188, enjeksiyonluk su.

▼ Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini sağlayacaktır. Meydana gelen herhangi bir yan etkiyi raporlayarak yardımcı olabilirsiniz. Yan etkilerin nasıl raporlanacağını öğrenmek için 4. Bölümün sonuna bakabilirsiniz.

**Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.**

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

### **Bu Kullanma Talimatında:**

1. **PİASKY nedir ve ne için kullanılır?**
2. **PİASKY'yi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **PİASKY nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **PİASKY'nin saklanması**

**Başlıkları yer almaktadır.**

Bu kullanma talimatına ek olarak, doktorunuz size meningokokkal enfeksiyonu ve sepsis belirtilerini listeleyen bir '**Hasta Kartı**' verecektir:

- Bu kartı tedavi sırasında her zaman, ve
- Son PİASKY dozunuzdan sonraki 11 ay boyunca üzerinizde taşıyın

### **1. PİASKY nedir ve ne için kullanılır?**

PİASKY, berrak ila yoğun opeskan ve neredeyse renksiz ila kahverengimsi sarı



çözeltidir. Bir karton kutu, 2 mL'lik enjeksiyonluk/infüzyonluk çözelti içeren 1 cam flakon içermektedir.

PİASKY, crovalimab etkin maddesini içerir. Vücuttaki belli bir hedefe bağlanmak üzere tasarlanmış proteinler olan 'monoklonal antikorlar' adı verilen bir ilaç sınıfına aittir.

PİASKY aynı zamanda kompleman bileşeni 5 (C5) inhibitörü olarak da adlandırılır.

PİASKY'nin etkin maddesi olan crovalimab, vücudun 'kompleman sistemi' adı verilen savunma sisteminin bir parçası olan kompleman 5 (C5) proteinine bağlanır. Bunu yaparak, C5 aktivasyonunu bloke eder ki bu da bağışıklık sisteminin kırmızı kan hücrelerine saldırmasını ve zarar vermesini önleyerek kırmızı kan hücrelerinin parçalanmasını azaltır. Bu, PNH belirtilerinin ve gereken kan nakli sayısının azaltılmasına yardımcı olur.

PİASKY, paroksizmal noktürnal hemoglobinüri (PNH) adı verilen bir hastalığın tedavisinde kullanılır. Hemoliz (kırmızı kan hücrelerinin parçalanması) görülen ve yüksek hastalık aktivitesini gösteren klinik belirtileri olan hastalar ve en az son 6 aydır bir C5 inhibitörü ile tedavi edildikten sonra hastalığı stabil olan hastalar dahil olmak üzere, 40 kg veya üzerindeki 12 yaş ve üzeri çocuklarda ve yetişkinlerde kullanılır.

PNH bağışıklık sisteminin vücudun kırmızı kan hücrelerine saldırmasına neden olarak hemolize yol açabilir, bu da aşağıdakilerle sonuçlanabilir:

- Yorgunluk hissi veya düşük enerji ve koyu idrar gibi anemi (düşük kırmızı kan hücresi düzeyleri) belirtileri
- Karın ağrısı
- Yutma güçlüğü
- Ereksiyon olma veya ereksiyonu sürdürme güçlüğü (erektil disfonksiyon)
- Böbreklerin düzgün çalışmaması
- Bir bacakta ilerleyen şişlik veya yorucu aktiviteler yapmadığında nefes darlığı gibi belirtilerle birlikte kan pıhtıları

PNH'li hastalar düzenli kan nakline ihtiyaç duyabilir.

## 2. PİASKY'yi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

### PİASKY'yi aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

- Crovalimaba veya bu ilacın diğer bileşenlerinden herhangi birine alerjiniz varsa
- Meningokokkal enfeksiyonunuz varsa (*Neisseria meningitidis* bakterisinin neden olduğu, beyin ve omurilik zarını etkileyebilen ve kana yayılabilen ciddi bir enfeksiyon)
- Meningokokkal enfeksiyonuna karşı aşılanmamışsanız (aşı olduktan sonraki 2 haftaya kadar önleyici olarak antibiyotik kullanılmalıdır)

Yukarıdakilerden herhangi biri sizin için geçerliyse PİASKY'yi kullanmayın.

Emin değilseniz, PİASKY'yi kullanmadan önce doktorunuzla veya hemşirenizle



konusunuz.

### **PİASKY’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ.**

Biyoteknolojik tıbbi ürünlerin izlenebilirliğinin sağlanması için uygulanan ürünün ticari adı ve seri numarası mutlaka hasta dosyasına kaydedilmelidir.

#### Ciddi meningokokkal enfeksiyonları

PİASKY, bağışıklık sisteminin bir kısmını bloke ettiği için *Neisseria meningitidis* bakterisinin neden olduğu meningokokkal enfeksiyonları riskinizi artırabilir. Bu, septisemi (kan zehirlenmesi) ve menenjit (beyin ve omuriliği çevreleyen zarların iltihabı) gibi ciddi enfeksiyonları içerir.

- Meningokokkal enfeksiyonunun belirtileri olabilecek aşağıdakilerden herhangi birini yaşarsanız derhal doktorunuza bildirin:
  - Ateş
  - Hasta hissetme (mide bulantısı)
  - Kusma
  - Baş ağrısı
  - Kafa karışıklığı veya asabiyet
  - Boyun veya sırt sertliği
  - Grip benzeri belirti veya semptomlarla birlikte kas ağrıları
  - Gözlerin ışığa karşı hassasiyeti
  - Cildinizde döküntüler veya lekeler

PİASKY’ye başlamadan önce meningokokkal enfeksiyonlarına karşı aşılamanızın güncel olduğundan emin olmak için doktorunuzla konuşun – PİASKY’yi kullanmaya başlamadan en az 2 hafta önce tam olarak aşılanmış olmanız gerekir. Çocukken aşılanmış olsanız bile, doktorunuz tekrar aşılanmanız gerektiğine karar verebilir.

Tam aşıli değilseniz ancak PİASKY’ye hemen ihtiyacınız varsa, aşığı mümkün olan en kısa sürede yaptırmalısınız. Doktorunuz enfeksiyon riskinizi azaltmak için PİASKY’ye başladığınız andan aşidan 2 hafta sonrasına kadar size antibiyotik reçete edecektir.

Aşılama bu tür enfeksiyonları her zaman önleyemeyebilir. Doktorunuz enfeksiyonu önlemek için ekstra önlemlere ihtiyacınız olduğuna karar verebilir.

#### **Hasta kartı**

Doktorunuz size meningokokkal enfeksiyonu ve sepsis belirtilerini listeleyen bir ‘**Hasta Kartı**’ verecektir; bunu:

- PİASKY ile tedavi sırasında her zaman, ve
- son PİASKY dozundan sonraki 11 ay boyunca yanınızda taşıyın

#### Diğer ciddi enfeksiyonlar

PİASKY, *Streptococcus pneumoniae* ve *Haemophilus influenzae*’nın neden olduğu enfeksiyonlar gibi diğer ciddi enfeksiyonlar açısından riskinizi de artırabilir.

- Enfeksiyon belirtileri olabilecek aşağıdakilerden herhangi birini yaşarsanız eczacınıza veya doktorunuza bildirin:
  - Ateş
  - Öksürük



- Göğüs ağrısı
- Yorgunluk
- Nefes darlığı hissetmek
- Ağrılı döküntü
- Boğaz ağrısı
- İdrar yaparken yanma şeklinde ağrı
- Halsiz hissetme veya genel olarak iyi hissetmeme

PİASKY'ye başlamadan önce *Streptococcus pneumoniae* ve *Haemophilus influenzae*'nin neden olduğu enfeksiyonlara karşı aşılarınızın güncel olduğundan emin olmak için doktorunuzla konuşun – PİASKY'yi kullanmaya başlamadan en az 2 hafta önce tam olarak aşılanmış olmanız gerekir. Çocukken aşılanmış olsanız bile, doktorunuz tekrar aşılanmanız gerektiğine karar verebilir

Tam aşıli değilseniz ancak PİASKY'ye hemen ihtiyacınız varsa, aşırı mümkün olan en kısa sürede yaptırmalısınız. Doktorunuz enfeksiyon riskinizi azaltmak için PİASKY'ye başladığınız andan aşıdan 2 hafta sonrasına kadar size antibiyotik reçete edecektir.

Doktorunuz tedaviden önce başka aşılar olmanızı önerebilir. Tedaviye başlamadan önce doktorunuza danışın.

#### Başka bir C5 inhibitöründen geçişe bağlı reaksiyon

PİASKY'yi almadan önce, daha önce başka bir C5 inhibitörü ile tedavi görüp görmediğinizi doktorunuza söyleyin. Bunun nedeni, başka bir C5 inhibitöründen PİASKY'ye geçtikten sonraki ilk 30 gün sırasında Tip III immün kompleks reaksiyonu olarak bilinen bir tür geçici reaksiyon yaşayabilecek olmanızdır. Bu durum, PİASKY'yi kullanmayı bırakıp farklı bir C5 inhibitörüne geçerseniz de meydana gelebilir.

- Bu tür bir reaksiyonun herhangi bir belirtisini gösterirseniz doktorunuza söyleyin, örneğin
  - eklem ağrısı veya kaslar, kemikler ve dokularla ilgili diğer sorunlar
  - özellikle ellerde ve ayaklarda uyuşma ve sızlama veya karıncalanma hissi
  - döküntü veya diğer cilt sorunları
  - ateş

#### İnfüzyon ve enjeksiyon reaksiyonları

PİASKY intravenöz infüzyon (damar içine damlatma) veya subkutan enjeksiyon (deri altına enjeksiyon) olarak verildiğinde, infüzyona veya enjeksiyona karşı reaksiyon gösterebilirsiniz. Bir infüzyon veya enjeksiyon reaksiyonunun belirtileri olabilecek aşağıdakilerden herhangi birini yaşarsanız derhal doktorunuza veya hemşirenize söyleyin:

- Baş ağrısı
- Bel ağrısı
- İnfüzyon bölgesinde ve başka yerlerde ağrı
- Şişlik
- Morarma veya kanama
- Kızarmış deri
- Kaşıntı ve döküntü



Ayrıca infüzyon veya enjeksiyona karşı alerjik reaksiyon gösterebilirsiniz. Aşağıdaki ciddi alerjik reaksiyon belirtilerinden herhangi birini yaşıyorsanız derhal doktorunuza veya hemşirenize söyleyin:

- Göğüste sıkışma veya hırıltılı solunum,
- Nefes darlığı hissi,
- Ateş veya titreme
- Şiddetli baş dönmesi veya sersemlik hissi
- Dudaklarda, dilde, yüzde şişme
- Ciltte kaşıntı, kurdeşen veya döküntü

Alerjik reaksiyon da dahil olmak üzere bir infüzyon veya enjeksiyon reaksiyonu geçirdiyseniz, PİASKY tedavisine devam edilip edilmeyeceğini doktorunuz veya hemşirenizle teyit etmelisiniz.

#### PİASKY ile tedavinin durdurulması

PİASKY almayı bırakır ve PNH için başka bir tedaviye geçmezseniz, aşağıdakiler de dahil olmak üzere intravasküler hemoliz (kan damarlarındaki kırmızı kan hücrelerinin parçalanması) belirtileri olan semptomların gelişmesi halinde derhal doktorunuza bildirin:

- Yorgunluk hissi veya düşük enerji ve koyu idrar gibi anemi (düşük kırmızı kan hücresi seviyeleri) belirtileri
- Karın ağrısı
- Yutma güçlüğü
- Ereksiyon olma veya ereksiyonu sürdürme güçlüğü (erektil disfonksiyon)
- Böbreklerin düzgün çalışmaması
- Bir bacakta ilerleyen şişlik veya yorucu aktiviteler yapmazken nefes darlığı gibi belirtilerle birlikte kan pıhtıları

#### Antikor oluşumu (immünojenisite)

Bağışıklık sisteminiz crovalimaba karşı antikorlar (istenmeyen bir maddeye karşı vücut tarafından üretilen proteinler) oluşturarak PİASKY'ye verilen yanıtın azalmasına veya kaybolmasına neden olabilir. Aşağıdaki belirtilerden herhangi birini yaşıyorsanız, derhal doktorunuza söylemelisiniz

- Yorgunluk hissi veya düşük enerji ve koyu idrar gibi anemi (düşük kırmızı kan hücresi seviyeleri) belirtileri
- Karın ağrısı
- Yutma güçlüğü
- Ereksiyon olma veya ereksiyonu sürdürme güçlüğü (erektil disfonksiyon)
- Böbreklerin düzgün çalışmaması
- Bir bacakta ilerleyen şişlik veya yorucu aktiviteler yapmazken nefes darlığı gibi belirtilerle birlikte kan pıhtıları

#### **Çocuklar ve ergenler:**

PİASKY'yi 12 yaşın altındaki çocuklara veya vücut ağırlığı 40 kg'ın altındaki çocuklara vermeyin. Bunun nedeni, ilacın bu grupta henüz çalışılmamış olmasıdır.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.



## **PİASKY'nin yiyecek ve içecek ile kullanılması:**

Uygulama yöntemi açısından yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.

## **Hamilelik**

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

- Gebeyseniz veya emziriyorsanız, gebe olabileceğinizi düşünüyorsanız veya bebek sahibi olmayı planlıyorsanız, bu ilacı almadan önce doktorunuza danışın.
- PİASKY'nin gebe kadınlarda kullanımı hakkında bilgi yoktur ve doğmamış bir bebek üzerindeki etkileri bilinmemektedir. Doktorunuz gebelik sırasında PİASKY kullanmanın olası risklerini sizinle görüşecektir.

## **Emzirme**

- Emziriyorsanız, PİASKY'nin anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir, ancak özellikleri göz önüne alındığında süte geçmesi beklenmektedir. Doktorunuz emzirme döneminde PİASKY kullanmanın olası risklerini sizinle görüşecektir.

## **Araç ve makine kullanımı**

PİASKY'nin araç ve makine kullanma becerisi üzerinde hiçbir etkisi yoktur ya da çok az etkisi vardır.

## **PİASKY'nin içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler**

PİASKY uyarı gerektiren herhangi bir yardımcı madde içermemektedir.

## **Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı**

*Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.*

Başka herhangi bir ilaç kullanıyorsanız, yakın zamanda kullandıysanız veya kullanma ihtimaliniz varsa doktorunuza, eczacınıza veya hemşirenize söyleyin.

Özellikle, şu anda başka bir C5 inhibitörü ile tedavi ediliyorsanız veya daha önce tedavi edildiyse doktorunuza söylemelisiniz. Bunun nedeni, Tip III immün kompleks reaksiyonu olarak bilinen bir tür geçici reaksiyon yaşama ihtimalinizdir (bkz. “Uyarılar ve önlemler”).

## **3. PİASKY nasıl kullanılır?**

Bu ilacı her zaman tam olarak doktorunuzun size söylediği şekilde kullanın. Emin değilseniz doktorunuza danışın.



### **PİASKY'yi kullanmadan önce yapılan aşılar**

PİASKY ile tedaviye başlamadan en az 2 hafta önce, daha önce aşı olmamışsanız veya aşınızın tarihi geçmişse doktorunuz size meningokokkal enfeksiyonlarına karşı bir aşı yapacaktır.

PİASKY ile tedaviye bu aşığı olduktan sonra 2 haftadan daha kısa bir süre içinde başlarsanız, doktorunuz enfeksiyon riskini azaltmak için aşıdan sonraki en az 2 hafta boyunca antibiyotik reçete edecektir.

### **Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:**

Sadece ilk doz, bir sağlık mesleği mensubu tarafından intravenöz infüzyon olarak verilecektir. Sonraki dozlar subkutan enjeksiyon olarak verilir. Eğitimden sonra, siz veya size bakım veren kişi PİASKY'nin subkutan enjeksiyonunu tıbbi gözetim olmadan evde yapabilirsiniz.

Doktorunuz veya hemşireniz size veya size bakım veren kişiye bu ilacın nasıl hazırlanacağı ve subkutan enjeksiyonların sizin yada bakım veren kişi tarafından nasıl yapılacağı konusunda eğitim verecektir. Bu broşürün sonundaki '**Kullanma Talimatları**' bölümünde verilen talimatları dikkatlice okuyun ve uygulayın.

### **PİASKY'yi ne zaman kullanacaksınız?**

İlk dozunuz 1. Günde bir sağlık mesleği mensubu tarafından verilecektir. Bu, tedavinizde daha sonra verilen dozlardan daha yüksek olan ilk yükleme dozudur. İlave yükleme dozları 2, 8, 15 ve 22. Günlerde verilecektir.

Bundan sonra, PİASKY 29. Günde ve daha sonra her 4 haftada bir subkutan enjeksiyon olarak verilecektir. Bunlar idame dozlarıdır.

Daha önce PNH için 'kompleman inhibitörü' olarak bilinen başka bir ilaç alıyorsanız, PİASKY'nin ilk yükleme dozu, o ilacın bir sonraki dozunu almanızın planlandığı tarihte verilmelidir.

### **Ne kadar PİASKY kullanacaksınız?**

Doktorunuz kilonuza göre bir doz ve tedavi planı belirleyecektir.

Vücut ağırlığınız 40 kg veya üzerinde, ancak 100 kg'ın altındaysa:

- 1. Gündeki ilk yükleme dozunuz, 60 dakika boyunca intravenöz infüzyon yoluyla verilen 1 000 mg olacaktır.
- 2, 8, 15 ve 22. Günlerdeki sonraki yükleme dozlarınız 340 mg olacak ve tek bir subkutan enjeksiyon olarak verilecektir
- Size 29. Günde ve daha sonra her 4 haftada bir iki subkutan enjeksiyon olarak 680 mg'lık bir idame dozu verilecektir.

Vücut ağırlığı 100 kg veya üzerindeyse:

- 1. Gündeki ilk yükleme dozunuz 1 500 mg olacak ve 90 dakika boyunca intravenöz infüzyon yoluyla verilecektir.
- 2, 8, 15 ve 22. günlerdeki sonraki yükleme dozlarınız 340 mg olacak ve tek bir subkutan enjeksiyon olarak verilecektir
- Size 29. Günde ve daha sonra her 4 haftada bir üç subkutan enjeksiyon olarak 1 020 mg'lık bir idame dozu verilecektir.

PİASKY ile tedavi sırasında vücut ağırlığınız değişirse idame dozunuz değişebilir. Kilonuz 100 kg'ın üzerine çıkarsa veya altına düşerse doktorunuzla konuşun.



Doktorunuz veya hemşireniz kilonuzu sürekli olarak izlemelidir.

**Uygulama yolu ve metodu:**

PİASKY intravenöz infüzyon (damar içine damlatma) veya deri altına enjeksiyon (deri altı enjeksiyon) şeklinde verilir.

**Değişik yaş grupları:**

**Çocuklarda kullanımı:**

PİASKY’i 12 yaşından küçük çocuklarda ve vücut ağırlığı <40 kg olan çocuklarda kullanmayınız. Bu grupta henüz çalışılmamıştır.

**Yaşlılarda kullanımı:**

≥65 yaşındaki hastalarda doz ayarlaması gerekli olmamakla birlikte klinik çalışmalarda yaşlı hastalarda PİASKY ile deneyim sınırlıdır.

**Özel kullanım durumları:**

**Böbrek yetmezliği:**

Hafif, orta veya şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalar için herhangi bir doz ayarlaması önerilmemektedir.

**Karaciğer yetmezliği:**

Hafif karaciğer yetmezliği olan hastalar için herhangi bir doz ayarlaması önerilmemektedir. PİASKY orta ila şiddetli karaciğer bozukluğu olan hastalarda araştırılmamıştır ve bu nedenle bu hastalarda kullanımı ile ilgili herhangi bir öneride bulunulamaz.

*Eğer PİASKY’nin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.*

**Kullanmanız gerekenden daha fazla PİASKY kullandıysanız**

*PİASKY’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.*

**PİASKY’yi kullanmayı unutursanız**

Tedavinin tam olarak etkili olabilmesi için PİASKY’yi reçete edildiği şekilde almanız çok önemlidir.

- Enjeksiyonlarınızı yaptırmak için doktorunuzla veya hemşirenizle olan randevunuzu kaçırsanız, hemen başka bir randevu alın.
- Siz veya bakım veren, evde PİASKY dozunuzun tamamını veya bir kısmını enjekte etmeyi unutursanız, atlanan dozu veya dozun atlanan kısmını mümkün olan en kısa sürede alın ve ardından bir sonraki dozu planlanan normal zamanda alın. Atlanan bir dozu telafi etmek için bir dozu iki katına çıkarmayın. Emin değilseniz doktorunuza, eczacınıza veya hemşirenize danışın.

*Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.*

**PİASKY ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler**



PİASKY ile tedaviyi doktorunuzla görüşmeden bırakmayın. Bunun nedeni tedaviyi bırakmanın ilacın etkisini durduracak olmasıdır. Bu durum PNH belirtilerinizin geri gelmesine veya kötüleşmesine neden olabilir.

#### 4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi PİASKY'nin içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Doktorunuz tedaviden önce olası yan etkileri sizinle görüşecek ve PİASKY'nin risklerini ve faydalarını size açıklayacaktır.

PİASKY, doktorunuza hemen söylemeniz gereken bazı yan etkilere neden olabilir.

En ciddi yan etkiler **meningokokkal enfeksiyonu ve şiddetli alerjik reaksiyondur.**

**Aşağıdakilerden biri olursa, PİASKY'yi kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:**

- Aşağıdaki **meningokokkal enfeksiyonu** belirtilerinden herhangi birini yaşarsanız, derhal doktorunuzu bilgilendirmelisiniz:
  - Ateş
  - Mide bulantısı veya kusma
  - Baş ağrısı
  - Kafa karışıklığı veya asabiyet
  - Boyun veya sırt sertliği
  - Grip benzeri belirti veya semptomlarla birlikte kas ağrıları
  - Gözlerin ışığa karşı hassasiyeti
  - Cildinizde döküntüler veya lekeler
- Aşağıdaki **şiddetli alerjik reaksiyon** belirtilerinden herhangi birini yaşarsanız, derhal doktorunuzu bilgilendirmelisiniz:
  - Göğüste sıkışma veya hırıltılı solunum,
  - Nefes darlığı hissi,
  - Ateş veya titreme
  - Şiddetli baş dönmesi
  - Sersemlik hissi
  - Dudaklarda, dilde, yüzde şişme
  - Ciltte kaşıntı, kurdeşen veya döküntü

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

|            |                                                                           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Çok yaygın | : 10 hastanın en az 1'inde görülebilir.                                   |
| Yaygın     | : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir. |



|                |                                                                              |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Yaygın olmayan | : 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir. |
| Seyrek         | : 1.000 hastanın birinden az, 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.    |
| Çok seyrek     | : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.                                   |
| Bilinmiyor     | : Eldeki veriler ile belirlenemeyecek kadar az hastada görülebilir.          |

### **Çok yaygın**

- Ateş
- Başka bir C5 inhibitöründen geçişin neden olduğu bir reaksiyon (Tip III immün kompleks reaksiyonu; belirtiler kızamık cilt, kaşıntı veya ağrıyı içerebilir)
- Burun ve boğaz (üst solunum yolu) enfeksiyonu. Belirtiler arasında burun akıntısı, hapşırma, boğaz ağrısı ve öksürük yer alabilir
- İnfüzyona karşı reaksiyonlar
- Baş ağrısı

### **Yaygın**

- Alerjik reaksiyonlar (aşırı duyarlılık)
- İdrar yolu enfeksiyonu
- Akciğer enfeksiyonu (pnömoni)
- Enjeksiyona karşı reaksiyon
- Boğaz ağrısı ve burun akıntısı (nazofarenjit)
- Eklem ağrısı (artralji)
- Karın ağrısı
- İshal
- Aşırı yorgunluk/halsizlik (bitkinlik)
- Yorgunluk
- Döküntü
- Solunum yolu enfeksiyonu

### **Yaygın olmayan**

- Bakteriyel enfeksiyon (bakteriyemi)
- Böbrek enfeksiyonu (piyelonefrit)
- Ciddi tansiyon düşüklüğünün eşlik edebileceği bir enfeksiyona (sepsis) karşı şiddetli reaksiyon (septik şok)
- Enjeksiyon bölgesinde lokal reaksiyon

Eğer yukarıda listelenen diğer yan etkilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza, eczacınıza veya hemşirenize söyleyin. Yukarıdaki yan etkilerin ne olduğundan emin değilseniz, doktorunuzdan bunları size açıklamasını isteyin.

*Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.*

### **Yan etkilerin bildirilmesi**

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri [www.titck.gov.tr](http://www.titck.gov.tr) sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna



tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

## 5. PİASKY’nin saklanması

*PİASKY’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında bir saklayınız.*

- Bu ilacı karton ve flakon etiketi üzerinde SKT kısaltmasından sonra belirtilen son kullanma tarihinden sonra kullanmayın. Son kullanma tarihi o ayın son gününü ifade eder.
- Buzdolabında saklayın (2°C – 8°C). Buzdolabından çıkarıldıktan sonra, orijinal kutusundaki açılmamış flakonlar oda sıcaklığında (30°C’ye kadar) en fazla 7 gün tutulabilir.
- Dondurmayın.
- Flakonu ışıktan korumak için dış kartonunda saklayın.
- Bu ilaç ile doldurulmuş enjektörleri saklamayın. PİASKY ile doldurulmuş enjektörler derhal kullanılmalıdır.
- Eğer bulanık, rengi bozulmuş olduğunu veya partikül içerdiğini fark ederseniz bu ilacı kullanmayın.
- Herhangi bir ilacı atık su veya evsel atık yoluyla atmayın. Artık kullanmadığınız ilaçları nasıl atacağınızı eczacınıza sorun. Bu önlemler çevrenin korunmasına yardımcı olacaktır.

PİASKY, intravenöz infüzyon için seyreltilmiş olarak veya subkutan enjeksiyon için seyreltilmemiş olarak uygulanır. Seyreltilmiş çözeltinin ve seyreltilmemiş çözeltinin saklama koşulları aşağıdaki gibidir.

Sağlık mesleği mensubu tarafından uygulanacak olan seyreltilmiş (%0,9 sodyum klorür) intravenöz infüzyonluk çözelti:

Mikrobiyolojik açıdan bakıldığında, seyreltme yöntemi mikrobiyal kontaminasyon riskini engellemediği sürece, seyreltilmiş intravenöz infüzyonluk çözelti hemen kullanılmalıdır.

Seyreltilmiş çözelti kontrollü ve valide edilmiş aseptik koşullar altında hazırlanırsa, tıbbi ürün buzdolabında 2°C ila 8°C’de ve oda sıcaklığında (30°C’ye kadar) saklanabilir. Kullanılan infüzyon torbalarının tipine bağlı olarak hazırlanan infüzyonluk çözeltinin ayrıntılı saklama koşulları aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.

Aseptik koşullar kullanılarak hazırlanan infüzyonluk çözelti için saklama koşulları:

| İnfüzyon torbaları | Saklama koşulları                                                                                                                                                     |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PO/PE/PP           | İşıktan korunarak 2°C ila 8°C’de 30 güne kadar ve ortam ışığı koşulları altında oda sıcaklığında (30°C’ye kadar) 24 saate kadar.<br>Doğrudan güneş ışığından koruyun. |



|     |                                                                                                                                                                        |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PVC | Işıktan korunarak 2°C ila 8°C'de 12 saate kadar ve ortam ışığı koşulları altında oda sıcaklığında (30°C'ye kadar) 12 saate kadar.<br>Doğrudan güneş ışığından koruyun. |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

poliolefinler (PO), polietilen (PE), polipropilen (PP), polivinil klorür (PVC)

Siz veya size bakım veren kişi tarafından uygulanacak seyreltilmemiş subkutan enjeksiyonluk çözelti:

Mikrobiyolojik açıdan ürün hemen kullanılmalıdır. Hemen kullanılmadığı takdirde, kullanım öncesi kullanım sırasındaki saklama süreleri ve koşulları kullanıcının sorumluluğundadır ve hazırlık kontrollü ve valide edilmiş aseptik koşullarda yapılmadığı sürece normalde 2-8°C'de 24 saatten uzun olmamalıdır.

PİASKY flakondan enjektöre kontrollü ve valide edilmiş aseptik koşullar altında aktarılırsa, kapaklı enjektördeki tıbbi ürün buzdolabında 2°C ila 8°C'de ışıktan korunarak 14 güne kadar ve ortam ışığında oda sıcaklığında (30°C'ye kadar) 24 saate kadar saklanabilir.

PİASKY çözeltisi doğrudan güneş ışığından korunmalıdır.

**Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.**

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına belirlenen toplama sistemine veriniz.

***Ruhsat Sahibi:***

Roche Müstahzarları Sanayi Anonim Şirketi,  
Uniq İstanbul,  
Ayazağa Cad. No:4, D/101  
Maslak 34396, Sarıyer- İstanbul

***Üretim Yeri:***

Roche Diagnostics GmbH,  
Sandhofer Str. 116, D-63805  
Mannheim, Almanya

*Bu kullanma talimatı 13/12/2025 tarihinde onaylanmıştır.*



## Kullanma talimatları

### Flakonu kullanmadan önce

Siz veya bakım veren PİASKY flakonunu kullanmaya başlamadan önce ve her yeni reçete aldığınızda **bu Kullanma Talimatının tamamını okuyun**. Yeni bilgiler olabilir. Bu bilgiler, tıbbi durumunuz veya tedaviniz hakkında doktorunuzla konuşmanızın yerini tutmaz.

Doktorunuz PİASKY enjeksiyonlarını sizin veya bakım verenin yapabileceğine karar verebilir.

- Bu durumda, doktorunuz veya hemşireniz size veya bakım verene PİASKY dozunuzu doğru şekilde nasıl enjekte edeceğinizi gösterecektir.
- Doktorunuz veya hemşireniz sizi veya bakım veren doğru enjeksiyon şekli konusunda eğitene kadar PİASKY flakonunu **kullanmayın**.
- Damar içine enjekte (intravenöz enjeksiyon) **etmeyin**.

### Saklama ve idare şekli

- PİASKY flakonunu kullanıma hazır olana kadar orijinal kutusunda buzdolabında 2°C – 8°C arasında saklayın. Orijinal kutusundaki açılmamış PİASKY flakonu 30°C'ye kadar oda sıcaklığında en fazla 7 gün tutulabilir.
- Mikrobiyolojik açıdan ürün hemen kullanılmalıdır. Hemen kullanılmadığı takdirde, kullanım öncesi kullanım sırasındaki saklama süreleri ve koşulları kullanıcının sorumluluğundadır ve hazırlık kontrollü ve valide edilmiş aseptik koşullarda yapılmadığı sürece normalde 2-8°C'de 24 saatten uzun olmamalıdır.
- PİASKY flakondan enjektöre kontrollü ve valide edilmiş aseptik koşullar altında aktarılırsa, kapaklı enjektördeki tıbbi ürün buzdolabında 2°C ila 8°C'de ışıktan korunarak 14 güne kadar ve ortam ışığında oda sıcaklığında (30°C'ye kadar) 24 saate kadar saklanabilir.
- PİASKY flakonunu ışıktan korumak için dış kartonunda saklayın.
- **PİASKY flakonunu kartonundan çıkardıktan sonra, PİASKY'yi doğrudan güneş ışığından uzak tutun.**
- PİASKY flakonlarını, enjektörlerini ve iğnelerini çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın.
- Her PİASKY flakonu, enjektörü ve iğnesi sadece 1 kez kullanılabilir.
- Kullanım ve imha sırasında ellerinizi iğnenin ucundan uzak tutun.
- Flakonu **dondurmayın**. Dondurulmuşsa flakonu **kullanmayın**. Flakonu bir keskin-delici alet kabına koyarak güvenli bir şekilde atın (bkz. 43. adım) ve doktorunuza veya eczacınıza başvurun.
- 30°C'ye kadar oda sıcaklığında, 7 günden daha uzun süre bekletilmişse flakonu **kullanmayın**. Flakonu keskin-delici alet kabına koyarak güvenli bir şekilde atın (bkz. 43. adım) ve doktorunuza veya eczacınıza başvurun.
- PİASKY ile doldurulmuş enjektörleri **saklamayın**. İlaç ile doldurulmuş bir enjektör derhal kullanılmalıdır.
- Flakonu **sallamayın**.
- Flakonu, enjektörleri veya iğneleri başka bir enjeksiyon için tekrar **kullanmayın**.
- Enjektörünüzü ve iğnelerinizi başkalarıyla **paylaşmayın**.



### Tam doz ve enjeksiyon sayısı

PİASKY dozunuz, **birbiri ardına 3 enjeksiyon gerektirebilir. Tam dozunuzu almak için 3 PİASKY flakonuna kadar ihtiyacınız olabilir.**

- Doktorunuz veya eczacınız size veya bakıcınıza kaç enjeksiyona ihtiyacınız olduğunu ve ilacı ne sıklıkta enjekte etmeniz gerektiğini söyleyecektir.
- **Eğer size reçete edilen PİASKY dozu 680 mg ise, birbiri ardına 2 ayrı enjeksiyon yapın.**
- **Eğer size reçete edilen PİASKY dozu 1020 mg ise, birbiri ardına 3 ayrı enjeksiyon yapın.**
- Her enjeksiyon için daima yeni bir PİASKY flakonu kullanın.
- Dozdan emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza sorun.
- İhtiyacınız olan tüm PİASKY flakonlarına sahip değilseniz tam dozunuzu **bölmeyin.** Doktorunuzu veya eczacınızı arayın.

### 1 enjeksiyon için gerekli malzemeler

**Bu liste tek bir enjeksiyon içindir.** İhtiyaç duyulan enjeksiyon sayısına göre malzeme sayısını değiştirin (yukarıdaki “Tam doz ve enjeksiyon sayısı” bölümüne bakın).


#### Karton kutuya dahil olanlar:

- 1 PİASKY flakonu

#### Kartona dahil olmayanlar:

- Tek eğimli transfer iğneli 18 veya 21 ölçü standart iğne
- 25, 26 veya 27 ölçü enjeksiyon iğnesi ve emniyet kılıfı. İğne uzunluğu 3/8” (9 mm) ila 1/2” (13 mm) arasında olmalıdır.
- 2 mL veya 3 mL’lik enjektör
- 2 alkollü bez (1 tanesi cildiniz için, 1 tanesi de flakon için)
- 1 steril pamuk veya gazlı bez
- 1 küçük yara bandı
- 1 keskin-delici alet atık kabı veya delinmeye dayanıklı kap (bkz. 43. adım)

### Kartonu açın



**1** İhtiyacınız olan PİASKY flakonu kartonunu (kartonlarını) buzdolabından çıkarın.

Kartonu (kartonları) açın ve flakonu (flakonları) çıkarın.

**Doktorunuzun reçete ettiği dozu kontrol edin. Tam doz için birbiri ardına 3 enjeksiyon gerekebilir.** Tam dozu almak için 3 flakona kadar ihtiyacınız olabilir. İhtiyacınız olan tüm flakonları bir araya toplayın.



2 Flakonu (flakonları) temiz, düz bir yüzeye yerleştirin.

- Karton hasar görmüşse veya açma perforasyonu yırtılmışsa flakonu **kullanmayın**. Flakonu bir keskin-delici alet kabına güvenli bir şekilde atın (bkz. 43. adım) ve doktorunuza veya eczacınıza başvurun.

### Flakonu (flakonları) kontrol edin



3 Flakon(lar) üzerindeki son kullanma tarihini (SKT) kontrol edin.

4 İlacın görünümünü kontrol edin. İlaç berrak ila kuvvetli opelesan ve neredeyse renksiz ila kahverengimsi sarı olmalıdır.

5 Flakon(lar)da çatlak veya çizik gibi herhangi bir hasar olup olmadığını kontrol edin.

- Son kullanma tarihi (SKT) geçmişse **kullanmayın**.
- İlaç bulanık görünüyorsa, rengi değişmişse veya içinde parçacıklar varsa **kullanmayın**.
- Flakon çatlamış veya kırılmışsa **kullanmayın**.
- Eğer yukarıdakilerden biri ile karşılaşırsanız, flakonu keskin-delici alet kabına koyarak güvenli bir şekilde atın (bkz. 43. adım) ve doktorunuza veya eczacınıza başvurun.

### Isınma süresi



6 Flakonu (flakonları) 30 dakika boyunca temiz, düz bir yüzeye, **doğrudan güneş ışığından uzak** bir yere koyun. Bu, ilacın oda sıcaklığına ulaşmasını sağlar.


Eğer flakon oda sıcaklığında değilse, soğuk ila ilacın çekilmesini ve enjekte edilmesini zorlaştırabilir. Ayrıca rahatsızlığa da neden olabilir.

- Isınma sürecini mikrodalga, ılık su veya doğrudan güneş ışığı gibi yollarla hiçbir şekilde **hızlandırmayın**.
- Flakon oda sıcaklığına ulaştığında flakon kapağını **çıkarmayın**.




A collection of icons representing different types of waste: a glass thermometer, a medical syringe, a green pill, a white pill, a stack of white pills, a white bandage, a white cloud, a white mobile phone, and a red trash can.

- ## Enjeksiyon bölgesini seçin




- ## Enjeksiyon bölgesini temizleyin




- 9 Ellerinizi su ve sabunla yıkayın.
- 10 Enjeksiyon bölgesini alkollü bir bezle silin ve kurumaya bırakın.
- Temizlediğiniz alana **dokunmayın, havalandırmayın** veya **üflemeyin**.

#### Flakonun üstünü temizleyin




- 11 Renkli kapağı flakondan çıkarın. Renkli kapağı keskin-delici alet kabına atın (bkz. 43. adım).
- 12 Kauçuk tıpayı diğer alkollü bezle ile silin.
- Temizlendikten sonra kauçuk tıpayı **dokunmayın**.

#### Transfer iğnesini takın



- 13 Enjektörü ve transfer iğnesini ambalajlarından çıkarın.
- 14 Transfer iğnesini enjektöre iyice takılana kadar itin ve döndürün. Kapağı iğnede tutun.
- İlacı çekmek için enjeksiyon iğnesini (emniyet kılıflı) **kullanmayın**.


#### Enjektörü hava ile doldurun



- 15 İğne kapağı hala takılıyken, pistonu yavaşça geri çekin ve **2 mL çizgisine** kadar enjektörün içine hava çekin.  
Not: Flakon hava içermez. Flakona enjekte edilen hava ilacın daha kolay çekilmesini sağlayacak ve pistonun hareket etmesini önleyecektir.



### Transfer iğnesinin kapağını çıkarın




16 Enjektörü ortasından tutun ve iğne kapağını enjektörden dikkatlice çekin.

17 Kapağı düz bir yüzeyde tutun.

İlacı aktardıktan sonra iğneye geri takmanız gerekecektir.

- Kapağı **atmayın**.
- Kapak çıkarıldıktan sonra iğneye **dokunmayın** veya iğnenin herhangi bir yüzeye temas etmesine izin **vermeyin**.

### Havayı flakonun içine enjekte edin



18 Flakonu düz bir yüzeyde tutun ve iğneyi düz bir şekilde kauçuk tıpanın ortasına sokun.

19 İğneyi flakonun içinde tutun ve flakonu ters çevirin.


20 İğnenin ucunun ilacın üzerinde olduğundan emin olun.

21 Flakon üstteyken, flakonun içine hava enjekte etmek için pistonu itin.

22 Hareket etmesini engellemek için parmaklarınızı pistonun üzerinde basılı tutun.

- Havayı ilacın içine enjekte **etmeyin**, çünkü bu ilacın içinde kabarcıklar oluşmasına neden olur.

### Tüm ilacı aktarın



23 İğnenin ucunu ilacın içine girecek şekilde aşağı kaydırın.


24 Tüm ilacı enjektöre aktarmak için pistonu yavaşça geri çekin.



İlaç enjektöre aktarılırken **iğnenin ucunu her zaman ilacın içinde tuttuğunuzdan** emin olun. **İğneyi aşağı kaydırmanız gerekebilir** veya enjektörün içine biraz hava aktarabilirsiniz.


- İğneyi flakondan tamamen dışarı **çekmeyin**.
- Pistonu enjektörden tamamen **çekmeyin**.

#### Hava kabarcıklarını çıkarın



- 25 Enjektörün içinde hava kabarcıkları veya hava ile dolu boşluk varsa, hava kabarcıkları enjektörün üstüne çıkana kadar parmağınızla enjektörün yan tarafına hafifçe vurun.
- 26 Hava kabarcıklarını flakonun içine geri itmek için pistonu yavaşça yukarı itin. Eğer flakonun içine biraz ilaç iterseniz, tüm flakondaki ilacı aktarmak için pistonu yavaşça geri çekin (bu sefer daha yavaş) (bkz. 23. ve 24. adım).

#### Transfer iğnesinin kapağını kapatın




- 27 Enjektörü flakondan çıkarın.
- 28 **Sadece tek elinizi kullanarak** iğneyi düz yüzeye yerleştirilmiş kapağın içine kaydırın.
- 29 İğne kaplandığında, enjektörü yukarı kaldırın ve kapağı iğnenin üzerine tamamen takılması için itin.
- İğneyi içine kaydırırken kapağı parmaklarınızla **tutmayın**.

**Uyarı:** İlacı enjekte etmek için transfer iğnesini **kullanmayın**. Transfer iğnesi ilacı enjekte etmek için çok büyüktür.




### Transfer iğnesini çıkarın




- 30 Enjektörü tutun, çıkarmak için transfer iğnesini döndürün.
- 31 Transfer iğnesini bir keskin-delici alet atık kabına atın (bkz. 43. adım).
- Transfer iğnesi çıkarıldıktan sonra enjektörün ucuna **dokunmayın**.

### Enjeksiyon iğnesini takın



- 32 Enjeksiyon iğnesini ambalajından çıkarın.
- 33 Enjeksiyon iğnesini enjektöre iyice takılana kadar itin ve döndürün.
- 34 Emniyet kılıfını yukarıdaki şekilde gösterildiği gibi enjektöre doğru geri hareket ettirin.


### Enjeksiyon iğnesinin kapağını açın



- 35 Enjektörü ortasından tutun ve iğne kapağını dikkatlice çekerek enjektörden çıkarın.
- Çekerken kapağı **bükmeyin** veya **eğmeyin**.
  - İğne kapağını çıkardıktan sonra iğneye **dokunmayın** veya herhangi bir yüzeye temas etmesine izin **vermeyin**.
  - Kapağı çıkardıktan sonra tekrar **takmayın** çünkü bu iğneye zarar verebilir.
  - Düşürülmüş veya hasar görmüşse enjektörü **kullanmayın**.




### Pistonu ayarlayın



36 Pistonu yavaşça **2 mL çizgisine** kadar itin.

### İğneyi sokun




37 Bir elinizle temizlenmiş deri bölgesini sıkıştırın.

38 Diğer elinizle enjektörü ortasından, deriye 45° ile 90° arasında bir açıyla tutun.

39 Hızlı bir hareketle iğneyi sıkıştırılmış deriye sonuna kadar sokun.

- İğneyi sokarken pistonu **tutmayın** veya **itmeyin**


### İlacı enjekte edin



40 Tüm ilacı enjekte etmek için pistonu yavaşça sonuna kadar aşağı itin.

41 Sıkıştırılmış deriyi serbest bırakın ve iğneyi çıkarın.

### Enjeksiyon iğnesinin üstünü örtün



42 Enjeksiyondan sonra, **bir “klik” sesi duyana veya hissedene kadar** başparmağınızla emniyet kılıfını iğnenin üzerine bastırın. Bir “klik” sesi duymazsanız, iğnenin emniyet kılıfı tarafından tamamen örtüldüğünü görmek için bakın.

- İğneyi orijinal kapakla tekrar **kapatmayın**.
- İğneyi örtmek için iki elinizi **kullanmayın**.
- İğneyi enjektörden **çıkarmayın**.

#### Enjektörü ve flakonun atın



43 Kullanılmış PİASKY flakonunuzu, enjektörünüzü, iğnelerinizi ve kalan malzemeyi kullandıktan hemen sonra bir keskin-delici alet atık kabına koyun

- Serbest iğnelerinizi, enjektörlerinizi ve flakonunuzu ev çöpinüze **atmayın**.
- Enjektörü parçalarına ayırmaya **çalışmayın**.

#### Enjeksiyon bölgesini kontrol edin



44 Enjeksiyon bölgesinde az miktarda kan veya ilaç olabilir.

Kanama durana kadar bir pamuk ya da gazlı bezle bastırabilirsiniz. Gerekirse enjeksiyon bölgesini küçük bir yara bandıyla kapatın. Kanama durmazsa doktorunuza başvurun.

Enjeksiyonunuz artık tamamlanmıştır.

- Enjeksiyon yaptığınız bölgeyi **ovmayın** veya masaj **yapmayın**.

#### İkinci veya üçüncü enjeksiyonlar

**Reçete edilen doz birbirini ardına 2 veya 3 enjeksiyon ise, başka bir PİASKY flakonun ve yeni malzemelerle 8. adımdan tekrar başlayın.** Tam doz için 3 flakona kadar ihtiyacınız olabilir. Bir sonraki enjeksiyonun daha önce kullandığınız noktaya yapılmadığından emin olun.



### **Enjektörlerin ve flakonların atılması**



Hiçbir ilacı atık su veya evsel atık yoluyla atmayın. Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Kap dolduğunda, doktorunuzun, hemşirenizin veya eczacınızın talimatlarına göre attığınızdan emin olun.

