

KULLANMA TALİMATI

POTASYUM Klorür %7,5 Sibü Pharm Enjeksiyonluk Çözelti

Damar içine uygulanır.

Steril

Etkin madde: 10 ml'lik ampulde 0.75 g potasyum klorür içerir.

Yardımcı madde: Enjeksiyonluk su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

Bu Kullanma Talimatında:

- 1. POTASYUM Klorür %7,5 Sibü Pharm Enjeksiyonluk Çözelti nedir ve ne için kullanılır?**
 - 2. POTASYUM Klorür %7,5 Sibü Pharm Enjeksiyonluk Çözelti'yi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
 - 3. POTASYUM Klorür %7,5 Sibü Pharm Enjeksiyonluk Çözelti nasıl kullanılır?**
 - 4. Olası yan etkiler nelerdir?**
 - 5. POTASYUM Klorür %7,5 Sibü Pharm Enjeksiyonluk Çözelti'sinin saklanması**
- Başlıkları yer almaktadır.**

1. POTASYUM Klorür %7,5 Sibü Pharm Enjeksiyonluk Çözelti nedir ve ne için kullanılır?

POTASYUM Klorür %7,5 Sibü Pharm Enjeksiyonluk Çözelti, 10 ml'lik 1 ampulde 0.75 g potasyum klorür içermektedir.

POTASYUM Klorür %7,5 Sibü Pharm Enjeksiyonluk Çözelti'sinin etkin maddesi olan potasyum klorür, belirli nedenler sonucu meydana gelen vücuttaki potasyum kayıplarını yerine koymak amacıyla kullanılmaktadır.

Potasyum kaybına neden olan durumlar ise;

- İshal, kusma ve mide-bağırsak sistemindeki fistüllerde,
- Birincil ve ikincil hiperaldosteronizmde (aşırı aldosteron salgılanması),
- Mineralokortikoid (Aldosteron) ve glukokortikoid (ACTH, kortizon v.b.) tedavilerinde,
- Parenteral sıvı tedavisinde (Potasyum ihtiva etmeyen),
- Diyabetik ketoasidoziste (Belirtileri; bulantı, kusma, aşırı miktarda idrar yapma, uyuklama, bilinç kaybı),
- Metabolik alkaloziste (vücut sıvılarında baz fazlası olması) ,
- Digitalis zehirlenmelerinde,
- Tuz kaybına neden olan böbrek iltihabı,

- Tiyazid sınıfından diüretiklerin (idrar söktürücüler) uzun süreli kullanımında,
- Kronik protein yıkımında

2. POTASYUM Klorür %7,5 Sibü Pharm Enjeksiyonluk Çözelti'sini kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

POTASYUM Klorür %7,5 Sibü Pharm Enjeksiyonluk Çözelti'sini aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

- Eğer POTASYUM Klorür %7,5 Sibü Pharm Enjeksiyonluk Çözelti'sinin bileşenlerine karşı alerjiniz var ise kullanmayınız.
- POTASYUM Klorür %7,5 Sibü Pharm Enjeksiyonluk Çözelti'sinin, hiperkalemi (kanda potasyum seviyelerinin yüksek olması) ile oligüri (idrarın normalden az çıkması), anüri (idrarın çıkarılamaması) ya da azotemi (kanda aşırı miktarda azot bulunması) ile şiddetli böbrek yetmezliği söz konusu ise veya tedavi edilemeyen kronik adenokortikal yetmezlik (Addison Hastalığı) durumlarında,
- Akut dehidratasyon (kısa sürede gelişen su kaybı, hiperkloremi (kandaki klorür seviyesinin yüksek olması) ve kramp durumlarında kullanmayınız.

POTASYUM Klorür %7,5 Sibü Pharm Enjeksiyonluk Çözelti'sini aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

- Magnezyum eksikliğiniz (hipomagnezemi) varsa,
- Kardiyak rahatsızlığınız varsa, potasyum destekleyiciler ya da plazma potasyum seviyesini arttıran ilaçlarla birlikte kullanacaksanız,

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

POTASYUM Klorür %7,5 Sibü Pharm Enjeksiyonluk Çözelti'sinin yiyecek ve içecek ile kullanılması

Uygulama yöntemi açısından yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç doktor tarafından gerekli görülmedikçe hamilelik döneminde kullanılmamalıdır. *Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

POTASYUM Klorür %7,5 Sibü Pharm Enjeksiyonluk Çözelti'sinin anne sütüne geçip geçmediği belli değildir. Bu nedenle emzirme döneminde doktor kontrolünde kullanınız.

Araç ve makine kullanımı

Araç ve makine kullanma üzerine normal değerlerde kaldığı sürece bilinen bir etkisi bulunmamaktadır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

POTASYUM Klorür %7,5 Sibu Pharm Enjeksiyonluk Çözelti'sinin aşağıdaki ilaçlarla birlikte alıyorsanız doktorunuza danışınız.

- ACE inhibitörleri (Yüksek kan basıncının tedavisinde kullanılmaktadır.)
- Amfoterisin, amikasin sülfat, dobutamin hidroklorür ve sabit yağ emülsiyonları
- Amilorid, spironolakton ve triamteren gibi potasyum tutucu diüretikler
- İnsülin, İnsülin+glukoz, sodyum bikarbonat infüzyonları
- Siklosporin (Organ nakli sonrasında kullanılır.)

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

POTASYUM Klorür %7,5 Sibu Pharm Enjeksiyonluk Çözelti'sinin içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler:

Uyarı gerektiren yardımcı madde içermemektedir.

3. POTASYUM Klorür %7,5 Sibu Pharm Enjeksiyonluk Çözelti nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır. Genel olarak saatte 20 mEq/L'yi geçmemek kaydıyla günde 20-150 mEq verilebilir. Maksimum doz 3.7 mEq/kg/24 saattir.

Uygulama yolu ve metodu:

POTASYUM Klorür %7,5 Sibu Pharm Enjeksiyonluk Çözelti 1000 mL'lik dekstroz solüsyonuna katılır. İntravenöz infüzyon şeklinde verilir. Dozlar vakanın durumuna göre doktor tarafından ayarlanır. Ağız yoluyla potasyum tedavisi yapmak için ampuller kırılıp, sıvı yiyecekler içine karıştırılarak verilebilir.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

Maksimum doz 2-3 mEq/kg/24 saattir.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlı hastalarla yapılmış bir çalışma bulunmamaktadır.

Özel kullanım durumları

Böbrek yetmezliği:

Böbrek yetmezliği olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer yetmezliği olan hastalarla yapılmış çalışma bulunmamaktadır.

Eğer POTASYUM Klorür %7,5 Sibu Pharm Enjeksiyonluk Çözelti'sinin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla POTASYUM Klorür %7,5 Sibu Pharm Enjeksiyonluk Çözelti kullandıysanız:

POTASYUM Klorür %7,5 Sibu Pharm Enjeksiyonluk Çözelti'sinin kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

POTASYUM Klorür %7,5 Sibu Pharm Enjeksiyonluk Çözelti kullanmayı unutursanız:
Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

POTASYUM Klorür %7,5 Sibu Pharm Enjeksiyonluk Çözelti ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler
Bulunmamaktadır.

4. Olası Yan Etkiler Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, POTASYUM Klorür %7,5 Sibu Pharm Enjeksiyonluk Çözelti'sinin içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, POTASYUM Klorür %7,5 Sibu Pharm Enjeksiyonluk Çözelti'sini kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

- Hiperkalemi
- Felç
- Kol ve bacaklarda uyuşma
- Zihin karışıklığı
- Gri deri
- Ciltte soğukluk
- Kan basıncında düşme
- Kardiyak aritmi (ritim bozukluğu)
- Kalp bloğu (kalp içi iletiminin zayıflaması)

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

- Nefes darlığı
- Kusma
- İshal
- Kan ve lenf sıvısının içinde bulunduğu damardan dışarı sızması ve lokal doku hasarı
- Karın ağrısı

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

- Güçsüzlük
- Enjeksiyon yerinde ağrı
- Mide gazı

Bunlar POTASYUM Klorür %7,5 Sibu Pharm Enjeksiyonluk Çözelti'sinin hafif yan etkileridir.

Yan etkilerin raporlanması:

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’a bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5. POTASYUM Klorür %7,5 Sibu Pharm Enjeksiyonluk Çözelti'sinin saklanması

POTASYUM Klorür %7,5 Sibu Pharm Enjeksiyonluk Çözelti'sini çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra POTASYUM Klorür %7,5 Sibu Pharm Enjeksiyonluk Çözelti kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat sahibi:

SİBU Pharm İlaç Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi

Oruç Reis Mah. Giyimkent 6.Sk. Giyimkent Sitesi B59

Blok No.:57A Esenler / İSTANBUL

Tel: 0 212 438 28 78

Faks: 0 212 438 46 77

Üretim yeri:

Haver Trakya İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Ulaş OSB Mah. D100 Cad. No:28/1, Ergene 2 OSB

Ergene/TEKİRDAĞ

Tel: 0 282 655 55 05

Faks: 0 282 655 55 32

Bu kullanma talimatı 10/02/2023 tarihinde onaylanmıştır.