

KULLANMA TALİMATI

REDUCEROL 20 mcg/2 ml nebulizasyon çözeltisi

Nefes yoluyla alınır.

Steril

- **Etkin madde:** Her bir flakon 20 mikrogram formoterol fumarat'a eşdeğer 21 mikrogram formoterol fumarat dihidrat içerir.
- **Yardımcı maddeler:** Sitrik asit monohidrat, sodyum sitrat dihidrat, sodyum klorür, enjeksiyonluk su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksekveya düşük doz** kullanmayınız.*

Bu kullanma talimatında:

1. **REDUCEROL nedir ve ne için kullanılır?**
2. **REDUCEROL'ü kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **REDUCEROL nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **REDUCEROL'ün saklanması**

Başlıkları yer almaktadır.

1. REDUCEROL nedir ve ne için kullanılır?

REDUCEROL, formoterol fumarat dihidrat adlı etkin maddeyi içeren ve nefes yolunuzun açık tutulmasını sağlayan bir ilaçtır.

REDUCEROL, her şaşıde 5 adet tek doz flakon olacak şekilde ambalajlanmıştır. Her flakon 2 ml ürün içermektedir. REDUCEROL, 30 veya 60 adet flakon içeren şaşıde ambalajlarda takdim edilmektedir.

REDUCEROL, bronş adı verilen akciğere giden hava yollarını genişletici bir ilaçtır. Kronik obstrüktif (tıkayıcı) akciğer hastalığı (kısaca KOAH) olarak da bilinen anfizem ve kronik bronşit (kronik bronş iltihabı) gibi diğer hava yolu hastalıklarında nefes alma problemlerinin, hırıltı, öksürük, göğüste baskı hissi ve nefes darlığı gibi semptomların tedavisinde kullanılır. REDUCEROL, akut olarak kötüleşen KOAH hastalarında kullanılmamalıdır. Astım hastalarında kullanılmaz.

REDUCEROL akciğerlere ulaşan küçük hava yollarını genişletmek ve bunların yaklaşık 12 saat süreyle gevşemiş ve açık kalmasına yardımcı olmak suretiyle nefes almayı kolaylaştırır. Eğer doktorun talimatlarına göre kullanılırsa, REDUCEROL hem gündüz hem de gece hastalığınızın belirtilerini azaltacaktır.

2. REDUCEROL'ü kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Doktorunuzun ya da eczacınızın size verdiği talimatları, bu kullanma talimatında bulunan bilgilerden farklı olsalar bile dikkatlice uygulamalısınız.

REDUCEROL'ü aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

- Formoterole ya da REDUCEROL'ün içerdiği yardımcı maddelere karşı aşırı duyarlı (alerjik) iseniz (eğer alerjiniz olabileceğini düşünüyorsanız, doktorunuzdan tavsiyede bulunmasını isteyiniz).
- Astımınız varsa ve astımınız için uzun dönemli astım kontrol ilacı kullanmıyorsanız
- Düşük ila orta bir dozda verilen inhale kortikosteroid gibi diğer bir astım kontrol ilacıyla iyi derecede kontrol ediliyorsanız,
- Sadece kısa etkili beta₂-agonisti ilaçlara (nadiren) gereksinim duyuyorsanız.

REDUCEROL'ü aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer:

- Ciddi kalp hastalığınız varsa, özellikle yakın zamanda kalp krizi geçirdiyseniz veya konjestif kalp yetmezliğiniz (kalp damarlarında bir hastalık veya kalp kaslarında ciddi güçsüzlük) olduysa,
- Kalp atış hızında artış, kalp kapak bozukluğu veya elektrokardiyogram anormallikleri gibi kalp ritim bozukluğunuz veya başka herhangi bir kalp hastalığınız varsa,
- Kan damarlarınızda (özellikle atardamarlarınız) daralma olduysa veya damar duvarlarında anormal kalınlaşma varsa
- Yüksek kan basıncı (hipertansiyon) probleminiz varsa,
- Diyabetiniz varsa,
- Düşük kan potasyum seviyeniz varsa
- Nöbet geçirme rahatsızlığınız varsa,
- Tiroid beziniz normalden fazla çalışıyorsa,
- Karaciğer problemlerinizi varsa,
- Yakın zamanda ameliyat olacaksınız ya da halojenlenmiş anestezi alacaksınız,
- Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız,
- Emziriyorsanız.
- Adrenal medulla (böbreküstü bezi) tümörünüz varsa

Eğer REDUCEROL kullanırken hırıltı veya nefes alma zorluğu yaşarsanız, ilacı kullanmaya devam etmelisiniz, fakat başka bir ilaç kullanma gereksiniminiz olabileceğinden mümkün olan en kısa süre içinde doktorunuza gitmelisiniz.

REDUCEROL ile yapılan bazı klinik alıřmalarda, ciddi astım krizleri gözlenmiştir (bkz. Bölüm 4).

Solunum problemlerinizi kontrol altına almak ya da tedavi etmek amacıyla inhale kortikosteroid ilacınızı düzenli kullanmanız önemlidir. REDUCEROL kullanmaya başladığınızda, bu ilaçları kullanmayı bırakmayınız veya dozunu deęiřtirmeyiniz.

Uzun etkili beta agonist preparatlarına (formoterol, salmeterol vb.) baęlı olarak nadiren, ciddi ve bazen ölümcül olabilen astım ile ilgili solunum problemleri meydana gelebilir.

REDUCEROL astım hastalığının başlangı tedavisi için önerilmez.

Uzun etkili beta agonistler (formoterol, salmeterol vb.) astım semptom kontrolünü saęlayan en kısa süre boyunca kullanılmalı ve astım kontrolüne ulařıldığında doktorunuz eęer mümkünse kullanımınızı durduracaktır. Sonrasında doktorunuz kontrol edici bir tedaviyle süreklilięini saęlayacaktır.

İnhale kortikosteroide (siklesonid, flutikazon, budesonid vb.) ek olarak uzun etkili beta agonist (formoterol, salmeterol vb.) kullanan pediyatrik ve adölesan hastaysanız, her iki ilaca uyumu garanti altına almak için, doktorunuz size hem inhale kortikosteroid (siklesonid, flutikazon, budesonid vb.) hem de uzun etkili beta agonist (formoterol, salmeterol vb.) içeren bir kombinasyon preparatı kullanmanızı önerecektir.

Eęer alevlenme döneminde iseniz ya da önemli ölçüde veya akut olarak kötüye giden astım řikayetleriniz varsa, uzun etkili beta agonist (formoterol, salmeterol vb.) ile tedaviye başlanmamalıdır.

REDUCEROL astımlı hastalarda tek başına tek tedavi olarak kullanılmamalıdır. REDUCEROL'ü KOAH'ın ani belirtilerini gidermek için kullanmayınız. Ani KOAH belirtilerinizi tedavi etmek için yanınızda kurtarıcı inhalerinizi taşıyınız. Eęer kurtarıcı inhaleriniz yoksa doktorunuzu bilgilendiriniz.

REDUCEROL'ü günde 2 defa kullanırken:

- Uzun etkili beta₂-agonist sınıfına dahil olan dięer ilaçlarla birlikte kullanmayınız.
- Kısa etkili beta₂-agonist ilacınızı sürekli ve düzenli olarak (günde 4 kez) kullanmayınız.

REDUCEROL tedavisi kan potasyum düzeyini düşürebilir. Bu sizi anormal bir kalp ritmine karşı daha yatkın hale getirebilir. Bu nedenle, doktorunuz özellikle de řiddetli astımınız varsa, kan potasyum düzeyinizi izleyebilir.

Benzer ilaçlar için önemli bilgi:

REDUCEROL, uzun etkili beta₂-agonistleri (LABA) olarak adlandırılan bir ilaç sınıfına dahildir.

Farklı bir uzun etkili beta₂-agonisti (salmeterol) ile yapılan büyük bir alıřmada astıma baęlı

ölüm riskinde artış görülmüştür. REDUCEROL'ün da böyle bir etkisinin olup olmadığını incelemek için herhangi bir çalışma yapılmamıştır.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

REDUCEROL'ün yiyecek ve içecek ile kullanılması

REDUCEROL'ün, uygulama yöntemi açısından yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamileyseniz ya da hamile kalmayı planlıyorsanız, bunu doktorunuza bildirin.

Doktorunuz önermediği sürece, hamilelik sırasında REDUCEROL kullanmamalısınız. Doktorunuz sizi hamilelik sırasında REDUCEROL kullanmanın potansiyel riskleri konusunda bilgilendirecektir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

REDUCEROL kullanırken bebeğinizi emzirmeniz tavsiye edilmez. Bebeğinizi emziriyorsanız veya emzirmeyi planlıyorsanız, REDUCEROL almadan önce doktorunuzla konuşunuz. Emziren kadınlarda, yalnızca yararı hasta ve bebeğe olan riskten daha fazla ise kullanılmalıdır. Buna doktorunuz karar verecektir.

Araç ve makine kullanımı

REDUCEROL'ün araç ve makine kullanımına etkisi bulunmamaktadır.

REDUCEROL'ün içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

REDUCEROL her “doz”unda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani aslında “sodyum içermez”.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Aşağıdaki ilaçlardan birini alıyorsanız, dozu değiştirmeniz ve/veya başka önlemler almanız gerekebilir:

- Astım ve burun tıkanıklığını tedavi etmek için kullanılan adrenalin benzeri ilaçlar olan sempatomimetik ilaçlar (örn. epinefrin),
- Cerrahi sırasında kullanılan halojenli hidrokarbonlar (örneğin halotan) gibi inhale anestezikler. Eğer anestezi altında ameliyat olacaksınız, REDUCEROL kullandığınız konusunda doktorunuzu bilgilendiriniz.
- Ksantin türevi astım ilaçları (örn. teofilin, aminofilin),

- İltihabi hastalıkları tedavi etmek için kullanılan steroidler,
- Ödem (su tutulması), kalp yetmezliği ve yüksek kan basıncını tedavi etmek için

kullanılan diüretik adı verilen idrar söktürücü ilaçlar,

- Burun tıkanlığını tedavi etmek için kullanılan ilaçlar (örn. efedrin)
- Depresyon ve duygu-durum bozukluklarını tedavi etmek için kullanılan monoamin oksidaz inhibitörleri (MAO inhibitörleri, örn. fenelzin ve isokarboksazid) ya da trisiklik antidepressanlar (örn. amitriptilin ve imipramin),
- QTc aralığını uzattığı bilinen ilaçlar;
 - Alerjik bir yanıtın ana belirtilerini tedavi etmek ya da önlemek için yaygın olarak kullanılan alerjik hastalıklara karşı etkili ilaçlar olan antihistaminikler (örn. terfenadin, astemizol, mizolastin),
 - Anormal kalp ritmini tedavi etmek için kullanılan ilaçlar olan kinidin, dizopiramid ve prokainamid,
 - Enfeksiyonların tedavisinde kullanılan bir ilaç olan eritromisin,
- Astım ilaçları (örn. teofilin, aminofilin) ya da diğer iltihabi hastalıkları tedavi etmek için kullanılan steroidler,
- Ödem (su tutulması), kalp yetmezliği ve yüksek kan basıncını tedavi etmek için kullanılan diüretik adı verilen idrar söktürücü ilaçlar,
- Yüksek kan basıncı, kalp yetmezliği, göğüs ağrısı, anksiyete (kaygı, endişe), anormal kalp ritmini tedavi etmek için kullanılan bir ilaç tipi olan beta-blokerler [Glokom (göz içi basıncının artması) tedavisinde kullanılan bazı göz damlaları beta-bloker içerebilir],
- Şizofreni (bir tür psikiyatrik hastalık), mani (taşkınlık nöbeti), psikotik durumlar ve anksiyete (kaygı, endişe) gibi zihinsel bozuklukları kontrol eden bir ilaç grubu olan fenotiyazin türevleri (örn. klorpromazin ve trifluperazin),
- Parkinson tedavisinde kullanılan ilaçlar (örn. levodopa),
- Rahim kasılmasına neden olan oksitosin içeren ilaçlar,
- Az çalışan tiroid bezinin tedavisinde kullanılan ilaçlar (örneğin tiroksin)
- Kalp yetmezliği ve anormal kalp ritmini tedavi etmek için kullanılan bir ilaç olan dijitaller,

Antikolinergik ilaçların REDUCEROL ile beraber tedaviye eklenmesi hava yolunuz daha açık kalmasına yardımcı olur. (örneğin ipratropiyum bromür)

Doktorunuzun dozu değiştirmesi ya da hatta ilaçlardan birini kesmesi bile gerekebilir. Doktorunuz size akciğer durumunuza bağlı olarak düzenli olarak kullanmanız için başka ilaçlar vermiş olabilir. Eğer öyleyse, bu ilaçları düzenli olarak almanız önemlidir. Kendinizi daha iyi hissetseniz bile ilacı almayı bırakmayın ya da dozunu azaltmayın.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. REDUCEROL nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

REDUCEROL'ün önerilen dozu, günde iki defa (sabah ve akşam) nebulizasyon (solunum) yoluyla uygulanan 20 mcg'lık tek bir doz flakondur. Önerilen en yüksek doz günde 40 mcg'dır. Günde 2 flakondan fazla kullanmayınız.

REDUCEROL'ü aynı inhaler içerisinde diğer ilaçlarla karıştırmayınız.

- **Uygulama yolu ve metodu:**

REDUCEROL'ü bir jet nebulizer ile aerosol şeklinde doktorunuzun talimatlarına uygun olarak kullanınız.

- **Özel kullanım durumları:**

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Formoterolün karaciğer veya böbrek yetmezliği olan hastalardaki kullanımına ilişkin klinik çalışma yapılmamıştır.

- **Değişik yaş grupları:**

Çocuklarda kullanımı:

REDUCEROL 18 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır. REDUCEROL'ün çocuklarla kullanımının güvenliliği ve etkililiği bilinmemektedir.

Yaşlılarda kullanımı:

Eğer 65 yaş veya üzerindeyseniz REDUCEROL'ü diğer yetişkinlerle aynı dozda kullanabilirsiniz.

Eğer REDUCEROL'ün etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla REDUCEROL kullandıysanız

Yanlışlıkla doktorunuzun size söylediğinden daha fazla REDUCEROL aldıysanız, derhal doktorunuzla konuşunuz ya da en yakın acil servisine başvurunuz. Tıbbi tedavi görmeniz gerekebilir. REDUCEROL'ün aşırı dozda kullanımında göğüs ağrısı (anjina), yüksek veya düşük kan basıncı, kalp atım hızında bozukluklar (taşikardi, aritmi, palpasyon), sinirlilik, baş ağrısı, titreme, nöbet, kas krampları, ağız kuruluğu, bulantı, baş dönmesi, yorgunluk halsizlik, uykusuzluk, kan şekeri yükselme, kanda potasyum seviyesinde düşme ve kanda asit birikimi (metabolik asidoz) görülebilir.

REDUCEROL'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

REDUCEROL'ü kullanmayı unutursanız

İlacınızı almayı unutursanız, unuttuğunuzu fark eder etmez bu dozu alınız ve sonraki dozu her zamanki saatte alınız.

Eğer, ilacınızı almayı unuttuğunuzu fark ettiğinizde, sonraki dozun saati yaklaşmış ise,

unuttuđunuz dozu atlayınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

REDUCEROL ile tedavi sonlandırıldıđında oluřabilecek etkiler

Doktorunuzun önerisi dıřında tedaviyi sonlandırmanız, hastalıđınızın řiddetlenmesine ve tedavinin aksamasına neden olabilir.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, REDUCEROL'ün içeriđinde bulunan maddelere duyarlı olan kiřilerde yan etkiler olabilir. REDUCEROL ile yapılan bazı klinik çalıřmalarda, ciddi astım krizleri (nefes darlıđında, öksürükte, hırıltıda řiddetli artış ya da hastaneye yatıř ile sonuçlanabilecek göđüs sıkıřması) gözlenmiřtir.

Yan etkiler ařađıdaki kategorilerde gösterildiđi řekilde sıralanmıřtır:

Çok yaygın	:10 hastanın en az 1'inde görülebilir.
Yaygın	:10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan	:100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Seyrek	:1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Çok seyrek	:10.000 hastanın birinden az görülebilir.
Bilinmiyor	:Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Ařađıdakilerden biri olursa REDUCEROL'ü kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne bařvurunuz.

Yaygın olmayan:

- Hırıltı ya da öksürük ve nefes alma güçlüğü ile birlikte bronkospazm (bronřların daralması) yařarsanız,

Eđer bu yan etkilerinden biri sizde mevcut ise, DERHAL doktorunuzu arayınız.

Ařađıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne bařvurunuz.

Yaygın olmayan:

- Alerjik reaksiyonlar yařarsanız, örneđin baygınlık hissederseniz (düşük kan basıncı), deri döküntüsü, kařıntı ya da yüzünüzde řiřlik meydana gelirse,
- Kas güçsüzlüğü, kas kasılmaları (kas spazmları) veya anormal bir kalp ritmini içeren belirtiler yařarsanız (bu kan potasyum seviyenizin düşük olduđu anlamına gelebilir),
- Düzensiz kalp atıřı yařarsanız (hızlı kalp atıřını da içeren),

Çok seyrek:

- Baskı tarzında göđüs ağrınız varsa (anjina pectoris adı verilen kalbi besleyen damarların daralması/tıkanması ile ortaya çıkan göđüs ağrısı),
-

Ařađıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz.

Yaygın:

- Baş ağrısı
- Titreme
- Çarpıntı
- Öksürük

Yaygın olmayan:

- Huzursuzluk (ajitasyon)
- Kaygı, endişe (anksiyete)
- Sinirlilik
- Uyuma güçlüğü
- Baş dönmesi
- Hızlı kalp atışı
- Boğaz tahrişi
- Kas krampları
- Kas ağrısı
- Astımın kötüleşmesi
- Bulantı
- Tat almada bozukluk
- Kanda düşük potasyum seviyesi
- Kan şekerinin yükselmesi
- Kanda insülin, serbest yağ asidi, gliserol ve keton seviyelerinin yükselmesi
- Aşırı terleme

Seyrek:

- Düzensiz kalp atışları (kalp krancıklarının çok erken kasılmasıyla meydana gelir)
- Göğüste sıkışma hissi
- Kan basıncında artma veya azalma
- İnhaler kullandıktan hemen sonra hırıltı olması
- Kan basıncında aşırı düşme
- Böbrek iltihaplanması
- Birkaç gün devam edebilen kaşıntı, döküntü, bronşların daralması, kurdeşen, deri ve mukoz membranların şişmesi gibi alerjik reaksiyonlar

Çok seyrek:

- Astımın kötüleşmesi
- Nefes almada zorluk
- Ellerin ayakların şişmesi
- Aşırı susama, sık sık idrara çıkma ve uzun süren yorgunluk (yüksek kan şekerinin göstergesi olabilir).
- Düzensiz kalp atışı
- Trombosit sayısında azalma
- Aşırı heyecanlanma

- Anormal davranışlar
- Halüsinasyon

Titreme, bulantı, tat alma bozuklukları, boğaz tahrişi, aşırı terleme, baş ağrısı, sersemlik ve kas krampları ilacı kullanmaya başladıktan 1-2 hafta içerisinde yok olabilir.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan "İlaç Yan Etki Bildirimi" ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5. REDUCEROL'ün saklanması

REDUCEROL'ü çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

2-8°C'de buzdolabında saklayınız. Dondurmayınız.

Raf ömrü içinde, buzdolabının olmadığı durumlarda ürün 25°C altındaki oda sıcaklığında 3 aya kadar saklanabilir. 3 ay içinde kullanılmazsa atılmalıdır.

Ürünü saşe içinde, ışıktan koruyarak saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra REDUCEROL'ü kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz REDUCEROL'ü kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat Sahibi:

Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. No:4 34467
Maslak / Sarıyer / İSTANBUL

Üretim Yeri:

Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Orhan Gazi Mah. Tunç Cad. No.3
Esenyurt / İstanbul

Bu kullanma talimatı 26/12/2024 tarihinde onaylanmıştır.