

KULLANMA TALİMATI

SUNLENCA 464 mg enjeksiyonluk çözelti

Deri altına (subkütan) uygulanır.

Steril

Etkin madde: Her bir tek dozluk flakon 1,5 mL içinde 463,5 mg lenakapavire eşdeğer 473,1 mg lenakapavir sodyum içerir.

Yardımcı maddeler: Makrogol (E1521), enjeksiyonluk su.

▼ Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini sağlayacaktır. Meydana gelen herhangi bir yan etkiyi raporlayarak yardımcı olabilirsiniz. Yan etkilerin nasıl raporlanacağını öğrenmek için 4. Bölüm'ün sonuna bakabilirsiniz.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz; çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde, doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

Bu Kullanma Talimatında:

1. **SUNLENCA nedir ve ne için kullanılır?**
2. **SUNLENCA'yı almadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **SUNLENCA nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **SUNLENCA'nın saklanması**

başlıkları yer almaktadır.

1. SUNLENCA nedir ve ne için kullanılır?

SUNLENCA etkin madde olarak lenakapavir içerir. Bu ilaç kapsid inhibitörü olarak bilinen antiretroviral bir ilaçtır.

SUNLENCA uzun etkili bir ilaçtır ve edinsel immün yetmezlik sendromuna (AIDS) neden olan tip 1 insan immün yetmezlik virüsünün (HIV) tedavisinde **diğer antiretroviral ilaçlarla kombinasyon halinde kullanılır.**

Tedavi seçenekleri sınırlı olan yetişkinlerde (örneğin, diğer antiretroviral ilaçlar uygun veya yeterince etkili olmadığında) HIV enfeksiyonunun tedavisi için kullanılır.

Diğer antiretroviral ilaçlarla kombinasyon halinde SUNLENCA tedavisi, vücudunuzdaki HIV miktarını azaltır. Bu etki, bağışıklık sisteminizin (immün sistem; vücudun doğal savunması) fonksiyonunu iyileştirecek ve HIV enfeksiyonuna bağlı hastalıklara yakalanma riskinizi azaltacaktır.

SUNLENCA enjeksiyonluk çözelti (enjeksiyon), görünür partikül içermeyen berrak, sarı bir çözeltilidir. SUNLENCA, her biri 1,5 mL enjeksiyonluk çözelti içeren iki cam flakon olarak sunulur. Bu flakonlar, 2 adet flakon erişim cihazı (doktorunuzun veya hemşirenizin SUNLENCA'yı flakondan çekmesini sağlayacak bir cihaz), 2 adet tek kullanımlık enjektör ve 2 adet enjeksiyon iğnesi içeren bir dozlama kitinde bulunur.

2. SUNLENCA'yı almadan önce dikkat edilmesi gerekenler

SUNLENCA'yı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

- Lenakapavire veya bu ilacın içerdiği diğer maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz varsa
- Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız:
 - Tüberküloz gibi bazı bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde kullanılan **rifampisin**
 - Nöbet önlenmesi amacıyla kullanılan **karbamazepin, fenitoin**
 - Depresyon ve anksiyete için kullanılan bitkisel ilaçlardan **sarı kantaron** (St. John's wort, *Hypericum perforatum*)

Bunun sizin için geçerli olduğunu düşünüyorsanız, **SUNLENCA kullanmayınız ve derhal doktorunuza haber veriniz.**

SUNLENCA'yı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Aşağıdaki durumlarda SUNLENCA uygulanmadan önce doktorunuza danışınız

- **Daha önce ciddi bir karaciğer hastalığınız olduysa veya testler karaciğerinizle ilgili bir sorun olduğunu gösterdiyse, doktorunuza veya eczacınıza danışınız.** Doktorunuz size SUNLENCA ile tedavi uygulayıp uygulamama konusunu dikkatle değerlendirecektir.

SUNLENCA kullandığınız sürece

SUNLENCA kullanmaya başladıktan sonra dikkat etmeniz gerekenler:

- **İltihap veya enfeksiyon bulguları.**

→ **Bu belirtilerden herhangi birini fark ederseniz, derhal doktorunuza haber veriniz.** Ayrıntılı bilgi için Bölüm 4 - *Olası yan etkiler nelerdir?*'e bakınız.

- **SUNLENCA enjeksiyonu yapılan bölgede meydana gelen reaksiyonlar.**

→ Enjeksiyon bölgesinde sertleşmiş bir kitle veya yumru oluşabilir. Bazı durumlarda bu yumrular bir yıldan uzun süre kalabilir ve bazı durumlarda hiç geçmeyebilir. Bu durum bir sonraki enjeksiyon zamanına kadar düzelmemiş olursa, bunu doktorunuza söyleyin. Ayrıntılı bilgi için, Bölüm 4, *Olası yan etkiler nelerdir?*'e bakınız.

Doktor randevularınıza düzenli olarak gitmeniz önemlidir.

SUNLENCA enjeksiyonunun yapılması, HIV enfeksiyonunun kontrol altında tutulması ve hastalığınızın kötüleşmesinin önlenmesi için, **planlanan randevulara gelmeniz önemlidir.** Tedaviyi bırakmayı düşünüyorsanız doktorunuzla görüşünüz. SUNLENCA enjeksiyonunun yapılması gecikirse veya SUNLENCA kullanmayı bırakırsanız, HIV enfeksiyonunun tedavi edilmesi ve viral direnç gelişme riskinin azaltılması için başka ilaçlar almanız gerekecektir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

SUNLENCA'nın yiyecek ve içecek ile kullanılması

Uygulama yöntemi açısından yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamileyseniz, hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız ya da hamile kalmayı planlıyorsanız bu ilacı almadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Tedbir amaçlı olarak, doktorunuz aksini söylemediği sürece, hamilelik sırasında SUNLENCA kullanmaktan kaçınmalısınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emziriyorsanız bu ilacı almadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

HIV enfeksiyonu anne sütü yoluyla bebeğe geçebileceğinden, HIV ile yaşayan kadınların emzirmesi önerilmez. Emziriyorsanız veya emzirmeyi düşünüyorsanız, **bu konuyu mümkün olan en kısa süre içinde doktorunuzla görüşmelisiniz.**

Araç ve makine kullanımı

SUNLENCA'nın araç veya makine kullanma yeteneğiniz üzerinde herhangi bir etki göstermesi beklenmemektedir.

SUNLENCA'nın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

SUNLENCA sodyum içerir.

Bu ilaç, her bir enjeksiyonda 1 mmol'den (23 mg) az sodyum içerir; yani, esasen 'sodyum içermez'

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Şu anda kullanmakta olduğunuz, son zamanlarda kullandığınız veya kullanmayı düşündüğünüz herhangi bir ilaç varsa, doktorunuza ya da eczacınıza söyleyiniz. SUNLENCA diğer ilaçlarla etkileşime girebilir. Bu durum, SUNLENCA'nın ya da diğer ilaçların beklenen etkiyi göstermesine engel olabilir veya yan etkilerin kötüleşmesine yol açabilir. Bazı durumlarda, doktorunuz size uygulanan dozu ayarlamaya veya kan değerlerinizi kontrol etmeye ihtiyaç duyabilir.

Hiçbir zaman SUNLENCA ile birlikte kullanılmaması gereken ilaçlar:

- Tüberküloz gibi bazı bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde kullanılan **rifampisin**
- Nöbetlerin önlenmesi amacıyla kullanılan **karbamazepin, fenitoin**
- Depresyon ve anksiyete için kullanılan bitkisel ilaçlardan **sarı kantaron (St. John's wort, *Hypericum perforatum*)**

Bu ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız, **SUNLENCA enjeksiyonu yaptırmayınız ve derhal doktorunuza haber veriniz.**

Özellikle aşağıdakilerden birini kullanıyorsanız, doktorunuzla görüşünüz:

- Aşağıdakileri içeren antibiyotikler:
 - rifabutin
- Sara hastalığının (epilepsi) tedavisinde ve nöbetlerin önlenmesi amacıyla kullanılan, aşağıdakileri içeren antikonvülzanlar:
 - okskarbazepin veya fenobarbital
- HIV tedavisinde kullanılan, aşağıdakileri içeren ilaçlar:
 - atazanavir/kobisistat, efavirenz, nevirapin, tipranavir/ritonavir veya etravirin
- Migren tipi baş ağrısının tedavisinde kullanılan, aşağıdakileri içeren ilaçlar:

- dihidroergotamin veya ergotamin
- İktidarsızlık ve pulmoner hipertansiyon tedavisinde kullanılan, aşağıdakileri içeren ilaçlar:
 - sildenafil veya tadalafil
- İktidarsızlık tedavisinde kullanılan, aşağıdakileri içeren ilaçlar:
 - vardenafil
- Alerjilerin, iltihaplı bağırsak hastalıklarının ve vücutta iltihap bulunan diğer hastalıkların tedavisi için ağızdan alınan veya enjeksiyon olarak uygulanan, aşağıdakileri içeren kortikosteroidler (“steroidler” olarak da bilinir):
 - deksametazon veya hidrokortizon/kortizon
- Kolesterolü düşürmek için kullanılan, aşağıdakileri içeren ilaçlar:
 - lovastatin veya simvastatin
- Kalple ilgili sorunların tedavisinde kullanılan, aşağıdakileri içeren antiaritmik ilaçlar:
 - digoksin
- Uyumanıza yardımcı olması için kullanılan, aşağıdakileri içeren ilaçlar:
 - midazolam veya triazolam
- Kan pıhtılarını önlemek ve tedavi etmek için kullanılan, aşağıdakileri içeren antikoagülanlar (kan sulandırıcı ilaçlar):
 - rivaroksaban, dabigatran veya edoksaban

Bu ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız veya SUNLENCA tedaviniz sırasında bu ilaçlardan birini kullanmaya başlarsanız, **doktorunuza haber veriniz**. Doktorunuza danışmadan hiçbir tedaviyi bırakmayınız.

SUNLENCA uzun etkili bir ilaçtır. Doktorunuzla görüştükten sonra tedavinizi bırakmaya veya başka bir tedaviye geçmeye karar vererseniz, son enjeksiyonunuz yapıldıktan sonra vücudunuzda aylarca düşük düzeylerde lenakapavir (SUNLENCA’nın etkin maddesi) bulunabileceğini dikkate almalısınız. Vücudunuzda kalan bu düşük düzeylerin, HIV enfeksiyonunun tedavisi için daha sonra alacağınız diğer antiretroviral ilaçları etkilemesi beklenmemektedir. Bununla birlikte bazı ilaçlar, son SUNLENCA enjeksiyonunuz yapıldıktan sonraki 9 ay içinde kullanıldığı takdirde, vücudunuzdaki düşük lenakapavir düzeylerinden etkilenebilir. SUNLENCA ile tedaviyi bırakmanızdan sonra bu tür ilaçların sizin için güvenli olup olmadığını doktorunuza danışmalısınız.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. SUNLENCA nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

SUNLENCA, HIV enfeksiyonunun tedavisinde **diğer antiretroviral ilaçlarla kombinasyon halinde kullanılır**. Doktorunuz, HIV enfeksiyonunun tedavisi için başka hangi ilaçları kullanmanız gerektiğini ve bunları ne zaman almanız gerektiğini size açıklayacaktır.

Uygulama yolu ve metodu:

SUNLENCA tedavisi ağızdan alınan tabletlerle başlar ve aşağıda açıklandığı şekilde doktorunuzun veya hemşirenizin yaptığı enjeksiyonlarla devam eder.

Tabletleri almadan önce doktorunuzla görüşünüz. Tabletleri almaya ne zaman başlayacağınız ve ilk enjeksiyonlar için randevunuzun ne zaman planlanacağı size bildirilecektir.

Tedavinin 1. günü:

- Ağızdan iki tablet alınır. Bunlar yemekle birlikte veya ayrı olarak alınabilir.

Tedavinin 2. günü:

- Ağızdan iki tablet alınır. Bunlar yemekle birlikte veya ayrı olarak alınabilir.

Tedavinin 8. günü:

- Ağızdan bir tablet alınır. Yemekle birlikte veya ayrı olarak alınabilir.

Tedavinin 15. günü:

- Doktorunuz veya hemşireniz tarafından abdomen (karın) bölgenize art arda iki enjeksiyon yapılır.

6 Ayda bir:

- Doktorunuz veya hemşireniz tarafından karın bölgenize (göbek) art arda iki enjeksiyon yapılır.

Değişik yaş grupları:**Çocuklarda kullanımı:**

Bu ilaç 18 yaşından küçük çocuklara verilmemelidir. 18 yaş altı hastalarda SUNLENCA kullanımı henüz araştırılmadığından, bu ilacın bu yaş grubunda ne kadar etkili ve güvenli olduğu bilinmemektedir.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlı hastalarda SUNLENCA için doz ayarlaması gerekli değildir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği:

Hafif, orta derece veya şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalarda SUNLENCA için doz ayarlaması gerekli değildir. SUNLENCA son dönem böbrek yetmezliği olan hastalarda araştırılmadığından, SUNLENCA bu hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

Karaciğer yetmezliği:

Hafif veya orta derece karaciğer yetmezliği (Child-Pugh Sınıf A veya B) olan hastalarda SUNLENCA için doz ayarlaması gerekli değildir. SUNLENCA şiddetli karaciğer yetmezliği (Child-Pugh Sınıf C) olan hastalarda araştırılmadığından, SUNLENCA bu hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

Eğer SUNLENCA'nın etkisinin çok güçlü veya çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla SUNLENCA kullandıysanız

SUNLENCA'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Bu ilacı size doktorunuz veya hemşireniz uygulayacağından, gerekenden fazla ilaç uygulanması olasılığı düşüktür. Bu konuda bir endişeniz varsa, bunu doktorunuza veya hemşirenize söyleyiniz.

SUNLENCA'yı kullanmayı unutursanız

- SUNLENCA enjeksiyonlarının yapılması için **6 ayda bir gerçekleşmesi planlanan randevularınıza gitmeniz önemlidir.** Bu randevular, HIV enfeksiyonunun kontrol altında tutulmasına ve hastalığınızın kötüleşmesini önlemeye yardımcı olacaktır.
- Enjeksiyon randevunuza gidemeyeceğinizi düşündüğünüz durumlarda, tedavi seçeneklerinizi görüşmek için mümkün olan en kısa sürede doktorunuzu arayınız.

Tabletleri almayı unutursanız veya tabletleri aldıktan sonra kusarsanız, ne yapmanız gerektiğini öğrenmek için SUNLENCA 300 mg Film Kaplı Tablet kullanma talimatına bakınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

SUNLENCA ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

Doktorunuza danışmadan SUNLENCA kullanmayı bırakmayınız. Doktorunuz önerdiği sürece SUNLENCA enjeksiyonlarını yaptırmaya devam ediniz. SUNLENCA'nın bırakılması, gelecekteki HIV tedavilerinin nasıl etki göstereceğini ciddi şekilde etkileyebilir.

SUNLENCA enjeksiyonlarını yaptırmayı bırakmak istiyorsanız doktorunuzla görüşünüz.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi SUNLENCA'nın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

Çok yaygın: 10 hastanın en az birinde görülebilir.

Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek: 1000 hastanın birinden az fakat 10000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Çok seyrek: 10000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Bilinmiyor

- **İltihap veya enfeksiyon ile ilgili herhangi bir bulgu.** İlerlemiş HIV enfeksiyonu (AIDS) olan ve fırsatçı enfeksiyon öyküsü (bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde ortaya çıkan enfeksiyonlar) bulunan bazı hastalarda, HIV tedavisine başladıktan kısa bir süre sonra geçmişteki enfeksiyonlardan kaynaklanan iltihaplanma bulgu ve belirtileri ortaya çıkabilir. Bu belirtilerin, vücudun bağışıklık tepkisindeki (immün yanıt) bir iyileşmeden kaynaklandığı ve vücudun, bariz belirtiler olmaksızın mevcut olabilecek enfeksiyonlarla savaşmasını sağladığı düşünülmektedir.
- HIV enfeksiyonu için ilaç kullanmaya başlamanızdan sonra, bağışıklık sisteminin vücuttaki sağlıklı dokulara saldırması anlamına gelen **otoimmün bozukluklar** da meydana gelebilir. Otoimmün bozukluklar, tedavinin başlamasından aylar sonra ortaya çıkabilir. Her türlü enfeksiyon belirtisi veya aşağıdakiler gibi diğer belirtiler açısından dikkatli olmanız gerekmektedir:
 - Kas güçsüzlüğü
 - Ellerde ve ayaklarda başlayıp, ardından gövdeye doğru ilerleyen güçsüzlük
 - Çarpıntı, titreme veya hiperaktivite

Bu belirtileri ya da herhangi bir iltihaplanma veya enfeksiyon belirtisi fark ederseniz, **derhal doktorunuza haber veriniz.**

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Diğer yan etkiler

Çok yaygın

- **SUNLENCA enjeksiyonu yapılan yerde meydana gelen reaksiyonlar.**

Belirtiler arasında şunlar yer alabilir:

- Ağrı ve rahatsızlık
- Enjeksiyon bölgesindeki diğer reaksiyonlara kıyasla geçmesi daha uzun sürebilen veya hiç geçmeyen sertleşmiş bir kitle veya yumru
- Kızarıklık, kaşıntı ve şişme gibi iltihap reaksiyonları
- Deride açık yara

Yaygın

- Mide bulantısı (kusma)

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi'ne (TÜFAM) bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5. SUNLENCA'nın saklanması

SUNLENCA'yi çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Bu ilacı, flakon etiketi ve kutu üzerinde “Son Kull. Tar.” olarak belirtilen son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız. Son kullanma tarihi, ilgili ayın son gününü belirtmektedir.

30°C altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Işıktan korumak için, orijinal ambalajında saklayınız.

Mikrobiyolojik açıdan bakıldığında, çözelti enjektörlere çekildikten sonra enjeksiyonlar hemen uygulanmalıdır. Kimyasal ve fiziksel kullanım stabilitesinin ambalaj dışında 25°C’de 4 saat olduğu gösterilmiştir. Hemen kullanılmadığı takdirde, kullanım süresine ilişkin saklama süreleri ve koşulları kullanıcının sorumluluğundadır.

Son kullanma tarihi gemiř veya kullanılmayan ilaları öpe atmayınız! evre, řehircilik ve İklim Deęiřiklięi Bakanlıęınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat sahibi:

Gilead Sciences İla Tic. Ltd. řti.
İerenköy Mah. Umut Sk. Quick Tower Sitesi No: 10-12 İ Kapı No: 21
34752 Atařehir, İstanbul
Tel: 0216 559 03 00

Üretim yeri:

Patheon Italia, S.p.A.
Viale Gian Battista Stucchi 110 Monza, 20900, İtalya

Bu kullanma talimatı tarihinde onaylanmıřtır.

AŞAĞIDAKİ BİLGİLER BU İLACI UYGULAYACAK SAĞLIK PERSONELİ İÇİNDİR

Uygulama Talimatları - SUNLENCA 464 mg Enjeksiyonluk Çözelti

Ambalaj içeriği



2 x flakon	
2 x flakon erişim cihazı	
2 x enjektör	
2 x 22G, 13 mm enjeksiyon iğnesi	






Tüm bileşenler tek kullanımlıktır.

Tam bir doz için **iki adet 1,5 mL’lik enjeksiyon** yapılması gerekir. **Flakon erişim cihazı** kullanılmalıdır.

Emin olunması gereken noktalar:

- Flakon ve hazırlanmış olan enjektör **partikül içermeyen sarı bir çözelti** içermelidir
- İçindekiler **zarar görmemiş** olmalıdır
- Ürünün **son kullanma tarihi geçmemiş** olmalıdır

1. Flakonu Hazırlayın	
	Kapağı çıkarın.
	Flakonun tıpasını alkollü bezle temizleyin.
2. Flakon Erişim Cihazını Hazırlayın	
	Aşağı doğru itin.

	Çevirerek açın.
3. Enjektörü Takın ve Doldurun	
3 	- Enjektörü takın ve flakona 1,5 mL hava enjekte edin. - Baş aşağı çevirin ve tüm içeriği çekin.
4 	
5. 22G Enjeksiyon İğnesini Enjektöre Takın, Hava Kabarcıklarını Boşaltın ve 1.5 mL'ye Hazırlayın	
5 	
6. Hastanın Abdomeninde Enjeksiyon Bölgesini Temizleyin	
6 ● = Enjeksiyon bölgesi seçenekleri (göbek deliğine en az 5 cm mesafede) 	Enjeksiyon bölgesi seçenekleri (göbek deliğine en az 5 cm mesafede)

7. 1.5 mL SUNLENCA'yı Subkütan Yoldan Enjekte Edin		
8. İkinci Enjeksiyonu Yapın		