

KULLANMA TALİMATI

İhtiyol TCT %10 Merhem Haricen kullanılır.

Etkin madde: Her bir tüp 2 g ihtiyol içerir.

Yardımcı Madde (ler): Lanolin susuz (koyun), vazelin

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu ilaç sizin reçetesiz olarak temin edip bir doktor yardımı almadan eczacınızın tavsiyesi ile hafif bir hastalığı tedavi etmeniz içindir. Buna karşın, yine de İHTİYOL TCT'den en iyi sonuçları alabilmeniz için dikkatli kullanmanız gerekmektedir.

- Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
- Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
- Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
- Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
- Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında :

1. **İhtiyol TCT %10 Merhem nedir ve ne için kullanılır?**
2. **İhtiyol TCT %10 Merhem kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **İhtiyol TCT %10 Merhem nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **İhtiyol TCT %10 Merhem'in saklanması**

Başlıkları yer almaktadır.

1. İHTİYOL TCT %10 Merhem nedir ve ne için kullanılır?

İHTİYOL TCT 20 mg'lık alüminyum tüpte karton ambalajda sunulur. Kahverengi renkli, homojen krem kıvamındadır.

İHTİYOL TCT , deriye sürülerek kullanılmak üzere hazırlanan, antiseptik ve dezenfektanlar adı verilen ilaçlar sınıfına giren bir merhemdir. Etkin maddesi ihtiyoldür.

İHTİYOL TCT, lokal (bölgesel olarak uygulanan) antiseptik olarak veya iritan özelliğinden dolayı iltihabi hastalıkların (egzema, apse, çiban gibi) işletilerek akıtılmasında ve diğer antiseptiklerle beraber kronik cilt rahatsızlıklarında tedaviye yardımcı olarak kullanılabilir

2. İHTİYOL TCT'yi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

İHTİYOL TCT'yi aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

- **İHTİYOL TCT'nin** içeriğindeki herhangi bir maddeye karşı aşırı duyarlılığınız var ise, kullanmayınız.

İHTİYOL TCT'yi aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

- İHTİYOL TCT'yi göz ve mukozalara (bazı organların iç yüzlerini kaplayan ve salgı üreten doku tabakası) temas ettirmeyiniz.
- İHTİYOL TCT kullanımı esnasında enfekte bölge sıkılarak ya da bastırarak iltihabı çıkarmaya çalışılmamalıdır.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

İHTİYOL TCT'yi yiyecek ve içecek ile kullanılması

Bilinen bir etkileşimi yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamilelik esnasında İHTİYOL TCT kullanımı doktor kontrolünde olmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

Emzirme döneminde doktorunuza danışmadan İHTİYOL TCT kullanmayınız.

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Araç ve makine kullanımı

İHTİYOL TCT araç veya makine kullanma yeteneği üzerinde bilinen bir etkisi ~~yoktur~~. bildirilmemiştir.

İHTİYOL TCT'nin içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

İHTİYOL TCT lanolin susuz (koyun) içermektedir. Lanolin lokal deri reaksiyonlarına (örneğin, kontak dermatite) neden olabilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

İHTİYOL TCT'nin herhangi bir ilaçla etkileşimine rastlanmamıştır.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. İHTİYOL TCT nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Günde bir kez veya gün aşırı hastalıklı deri bölgesine sürünüz.

Uygulama yolu ve metodu

Haricen uygulanır.

Uygulama sırasında bir steril gazlı bez yardımı ile ilgili bölgeye tatbik edilir ve hava sirkülasyonunu önlemeyecek şekilde steril gazlı bez ile kapatılır. İltihaplı bölge sıkılarak ya da bastırarak iltihap çıkarılmaya çalışılmamalıdır. Uygulamadan sonra eller iyice yıkanmalıdır.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanım

Çocuklarda kullanımı ile ilgili yeterli veri mevcut değildir ancak; çocuk cildinin daha hassas olmasından dolayı bu hastalarda daha dikkatli kullanılmalıdır.

Yaşlılarda kullanım

Yaşlı hastalarda kullanımı ile ilgili yeterli veri mevcut değildir.

Özel kullanım durumları

Böbrek yetmezliği

Bu hastalarda kullanımı ile ilgili yeterli veri mevcut değildir.

Karaciğer yetmezliği:

Bu hastalarda kullanımı ile ilgili yeterli veri mevcut değildir.

Eğer İHTİYOL TCT'nin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla İHTİYOL TCT kullandıysanız:

İHTİYOL TCT'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

İHTİYOL TCT kullanmayı unutursanız:

Eğer İHTİYOL TCT'nin kullanmayı unutursanız, hatırladığınızda kullanınız, daha sonra tedavinize olağan şekilde devam ediniz. Yine de dozun atlandığını düşünüyorsanız doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz.

İHTİYOL TCT ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler:

Tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek olumsuz bir etki bulunmamaktadır. Yarada iyileşme olana kadar kullanıma devam ediniz. İHTİYOL TCT almayı kesmeniz gereken durumlarda sizin için en iyi yöntemi doktorunuz belirleyecektir. İHTİYOL TCT kullanımı ile ilgili herhangi bir sorunuz olursa doktorunuza danışınız.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi İHTİYOL TCT'nin içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

Çok yaygın : 10 hastanın en az 1 inde görülebilir.

Yaygın : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek : 1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Çok seyrek : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor : Eldeki verilerden hareketle sıklık derecesi tahmin edilemiyor.

Yaygın:

- Deride renk değişikliği

Yaygın olmayan:

- Kaşıntı, kızarıklık, alerjik reaksiyonlar

Seyrek:

- Deride iritasyon
- İzole olgularda kesecik oluşumu

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması:

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan "İlaç Yan Etki Bildirimi" ikonunu tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5. İHTİYOL TCT'nin saklanması

İHTİYOL TCT'yi çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Bu ilacı, 25 °C'nin altındaki oda sıcaklığında, ışıktan uzakta ve kapağı kapalı olarak saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra İHTİYOL TCT'yi kullanmayınız. Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bir bozukluk fark ederseniz İHTİYOL TCT'yi kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi: TCT Pharma İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Kadıköy / İSTANBUL

Üretim yeri: Merkez Lab. İlaç San. ve Tic. A.Ş
Çekmeköy / İSTANBUL

Bu kullanma talimatı tarihinde onaylanmıştır.