

KULLANMA TALİMATI

TYLOL HOT PEDİATRİK 250 mg + 2 mg + 30 mg / 10 g tek kullanımlık oral çözelti hazırlamak için toz
Ağız yolu ile kullanılır.

- **Etkin maddeler:** Her bir poşet 250 mg parasetamol, 30 mg psödoefedrin hidroklorür ve 2 mg klorfeniramin maleat içerir.
- **Yardımcı maddeler:** Tartarik asit, sitrik asit (anhidr), sodyum bikarbonat, sodyum karbonat (anhidr), PVP K30, pudra şekeri, rafine şeker, sodyum benzoat (E211), kinolin sarısı (CI No.47005), sunset sarısı (E110), toz portakal aroması.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

Bu Kullanma Talimatında:

1. **TYLOL HOT PEDİATRİK nedir ve ne için kullanılır?**
2. **TYLOL HOT PEDİATRİK'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **TYLOL HOT PEDİATRİK nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **TYLOL HOT PEDİATRİK'in saklanması**

Başlıkları yer almaktadır.

1. TYLOL HOT PEDİATRİK nedir ve ne için kullanılır?

TYLOL HOT PEDİATRİK, sarımsı-turuncu renkli, portakal kokulu çözünebilen toz içeren tek kullanımlık poşetlerdedir. 6, 12 ve 24 poşet olmak üzere 3 farklı ambalaj boyunda orijinal kutusunda kullanıma sunulmaktadır.

TYLOL HOT PEDİATRİK, bir ağrı kesici ve ateş düşürücü (parasetamol), alerjik hastalıklara karşı etkili bir antihistaminik (klorfeniramin maleat) ve mukozanın şişkinliğini azaltarak tıkanıklıkları gideren bir dekonjestan (psödoefedrin hidroklorür) olmak üzere üç etkin madde içeren kombine bir ilaçtır.

TYLOL HOT PEDİATRİK; üst solunum yollarının akut enfeksiyonlarına bağlı ağrı, ateş, burun tıkanıklığı, hapşırma ve burun akıntısı gibi belirtilerinin giderilmesi için kullanılır.

2. TYLOL HOT PEDİATRİK'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

TYLOL HOT PEDİATRİK'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

- TYLOL HOT PEDİATRİK'in içeriğindeki parasetamol, psödoefedrin veya klorfeniramin adlı etkin maddelere veya yardımcı maddelere karşı alerjik (aşırı duyarlı) iseniz.
- Parasetamol içeren başka herhangi bir ürün kullanıyorsanız.
- Psödoefedrin içeren başka herhangi bir ürün kullanıyorsanız.
- Klorfeniramin maleat içeren başka herhangi bir ürün kullanıyorsanız.
- 12 yaşından küçük çocuklarda
- Kalp veya damar hastalıklarınız varsa, koroner arter (kalbi besleyen damar) hastalığınız varsa
- Kan basıncınız çok yüksekse (şiddetli hipertansiyon) veya ilaçla kontrol altına alınamayan hipertansiyonunuz,
- Feokromositoma olan hastalarda (böbreküstü bezlerinde oluşan bir tümör olup, adrenalın miktarında artışa sebep olabilmektedir.)
- Şeker (diyabet) hastası iseniz,
- Göz tansiyonunun artması (glokom) durumunda,
- Tiroidiniz fazla çalışıyorsa,
- Şiddetli akut (âni gelişen) veya kronik (uzun süredir olan) böbrek hastalığınız ve böbrek yetmezliğiniz varsa,
- Monoaminoksidad inhibitörleri adı verilen ilaçlardan kullanıyorsanız veya bu ilaçlarla gördüğünüz tedavinin kesilmesini takiben henüz 2 hafta geçmediyse,
- İdrara çıkma sonrası, mesanede bir miktar idrarın kaldığı, prostat adenomu denilen rahatsızlığınız varsa,
- Hamileyseniz veya emziriyorsanız.

TYLOL HOT PEDİATRİK'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

- Parasetamolü ilk kez kullanıyorsanız veya daha önce kullanım hikayeniz varsa, kullanımın ilk dozunda veya tekrarlayan dozlarında deride kızarıklık, döküntü veya bir deri reaksiyonu oluşabilmektedir. Bu durumda doktor ile irtibata geçilerek ilacın kullanımının bırakılması ve alternatif bir tedaviye geçilmesi gerekmektedir. Parasetamol ile deri reaksiyonu gözlenen kişi bir daha bu ilacı veya parasetamol içeren başka bir ilacı kullanmamalıdır. Bu durum, ciddi ve ölümlü sonuçlanabilen Stevens-Johnson sendromu (ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap), toksik epidermal nekroliz (deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık) ve akut generalize ekzantematöz püstüloz (yüksek ateşin eşlik ettiği akut yaygın döküntülü içi cerahat dolu küçük kabarcıklar) dahil cilt reaksiyonlarına neden olabilmektedir.
- Karaciğer veya böbrek hastalığınız (alkolik karaciğer hastalığı dahil) varsa
- G-6-PD eksikliği (düşük kırmızı kan hücresi sayımına yol açan kalıtsal bir durum) durumunuz varsa.
- Bu ilacı kullanırken püstüllerle birlikte ateşli yaygın eritem gelişirse, bu ilacı almayı bırakın ve derhal doktorunuza başvurun veya tıbbi yardım isteyin. 'Olası yan etkiler' bölümüne bakın.
- İlacın içeriğinde bulunan psödoefedrine bağlı olarak, kolon iltihabına (iskemik kolit) bağlı olarak ani karın ağrısı veya rektal kanama meydana gelebilir. Bu gastro-intestinal semptomlar gelişirse, bu ilacı almayı bırakın ve derhal doktorunuza başvurun veya tıbbi yardım alın, bkz. Bölüm 4 'Olası yan etkiler nelerdir'.

- Psödoefedrin ile optik sinirinize giden kan akışında azalma meydana gelebilir. Ani görme kaybı gelişirse, TYLOL HOT PEDİATRİK almayı bırakın ve derhal doktorunuza başvurun veya tıbbi yardım isteyin, bkz Bölüm 4 'Olası yan etkiler nelerdir'.
- Psödoefedrin içeren ilaçların kullanımını takiben beynin arka bölümünde iyileşebilen beyin dokusu harabiyeti (posterior geri dönüşümlü ensefalopati sendromu (PRES)) ve beyin damarlarında iyileşebilen daralma (geri dönüşümlü serebral vazokonstriksiyon sendromu (RCVS)) vakaları rapor edilmiştir. PRES ve RCVS, beyne kan akışının azaldığı nadir durumlardır. PRES veya RCVS belirtisi olabilecek semptomlar gelişmesi durumunda hemen TYLOL HOT PEDİATRİK kullanmayı bırakın ve acil tıbbi yardım alınız (semptomlar için bkz. Bölüm “4. Olası yan etkiler nelerdir”)
- Eğer epilepsi hastası iseniz
- Karaciğer veya böbrek fonksiyon bozukluğunuz varsa
- Kalp ile ilgili rahatsızlıklarınız varsa
- Yüksek tansiyonunuz varsa
- Astım, bronşit veya bronşların harabiyeti sonucu kalıcı genişlemesi (bronşiektazi) veya kronik akciğer problemlerinizi varsa (nefes almada zorluk ve geçmeyen-inatçı öksürük)
- Alkolle eş zamanlı parasetamol alınması karaciğer toksisitesine yol açabileceğinden birlikte alınmamalıdır. Alkol alan kişilerde karaciğer zehirlenmesi (hepatotoksosite) riski nedeniyle günlük alınan parasetamol dozunun 2000 mg’ı aşmaması gerekir. Alkolik karaciğer hastalarında dikkatli kullanılmalıdır.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

TYLOL HOT PEDİATRİK’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Besinler TYLOL HOT PEDİATRİK’in emilim hızını azaltabilir.

Alkolle veya alkol içeren yiyecek ve içeceklerle (örn. bazı ilaçlar) birlikte kullanıldığında karaciğer üzerine zararlı etki gösterme riski artabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Hamileyseniz ya da hamile kalmayı planlıyorsanız doktorunuza mutlaka söyleyiniz. Doktorunuz aksini söylemedikçe TYLOL HOT PEDİATRİK’i hamilelikte kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Doktorunuz aksini söylemedikçe, TYLOL HOT PEDİATRİK’i emzirme döneminde kullanmayınız.

Araç ve makine kullanımı

TYLOL HOT PEDİATRİK uyuşukluğa, bazı hastalarda ise baş dönmesi veya uyuklamaya neden olabilir. Bu nedenle araç ve makine kullanırken dikkatli olunuz.

TYLOL HOT PEDİATRİK'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

TYLOL HOT PEDİATRİK sukroz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

TYLOL HOT PEDİATRİK, Sunset sarısı içermektedir. Alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.

Bu tıbbi ürün her bir poşette 225 mg sodyum bikarbonat, 22,5 mg sodyum karbonat (anhidr) ve 5 mg sodyum benzoat ihtiva eder. Özellikle düşük tuz diyeti takip etmeniz önerilmişse uzun dönem için günlük 5 veya daha fazla doza ihtiyacınız varsa doktorunuz veya eczacınızla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Bazı ilaçlar ile birlikte kullanıldığında TYLOL HOT PEDİATRİK'in etkisi değişebilir. Aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız lütfen doktorunuza söyleyiniz:

- Kan pıhtılaşmasını engelleyen ilaçlar kullanıyorsanız (Varfarin ve kumarin türevi antikoagülanlar) bu ilacı kullanmayın
- Antibiyotik olarak kullanılan kloramfenikol veya flukloksasilin)
- Mide boşalmasını hızlandıran ilaçlar (Örn: Metoklopramid, domperidon gibi)
- Mide boşalmasında gecikme yaratan ilaçlar (Örn: Propantelin vb.)
- Kolestiramin içerikli ilaçlar (yüksek kolesterol tedavisinde kullanılır)
- Kardiyak glikozidlerle (kalp yetmezliğinde kullanılan digoksin) birlikte kullanım kalp ritmi bozukluğu riskini artırır.
- Antidepresan ilaçlar (Ruhsal çöküntü tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar)
- Ergot alkaloidleri (ergotamin ve metiserjit; migren tedavisinde kullanılır) ile birlikte kullanılması yan etki riskini artırır.
- Öksürük ve soğuk algınlığı ilaçlarında bulunanlar da dahil olmak üzere uygunuzu getiren diğer antihistaminikler
- Uyku için kullanılan ilaçlar,
- Sakinleştirici ilaçlar (Sedatifler, trankilizanlar)
- Antidepresanlar
- Epilepsi tedavisinde kullanılan fenitoin
- Sarı kantaron (St. John's Worth / *Hypericum perforatum*) içerikli ilaçlar
- Diğer ağrı kesicilerle birlikte kullanım
- Alkol

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. TYLOL HOT PEDİATRİK nasıl kullanılır?


Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

12 yaşın üzerindeki çocuklarda:

Her 6 veya 8 saatte (günde 3-4 kez) 1 poşet kullanılır. Günde 4 dozdan fazla kullanılmamalıdır.

Uygulama yolu ve metodu:

Ağız yolu ile kullanılır. Her bir poşetin içindeki ilaç 80 mL (yaklaşık 1 çay bardağı) sıcak su içerisinde karıştırılarak çözölmeli ve sıcak iken içilmelidir.

**Değişik yaş grupları****Çocuklarda kullanımı:**

12 yaş altında kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda Kullanımı:

Sağlıklı, hareketli yaşlılarda normal yetişkin dozu uygundur fakat herhangi bir hastalığın eşlik ettiği durumlarda doz ve dozlam sıklığı uygun bir şekilde doktorunuz tarafından azaltılmalıdır.

Özel kullanım durumları**Böbrek/Karaciğer yetmezliği**

Karaciğer ya da böbrek yetmezliğiniz varsa doktorunuza bildiriniz.

İleri derecede karaciğer veya böbrek yetmezliği olan hastalarda kullanılmamalıdır.

Eğer TYLOL HOT PEDIATRİK'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla TYLOL HOT PEDIATRİK kullandıysanız:

Kendinizi iyi hissetseniz bile bu ilaçtan çok fazla alırsanız derhal bir doktorla konuşun

Bunun nedeni, çok fazla parasetamolün gecikmiş, ciddi karaciğer hasarına neden olabilmesidir

Doktora göstermek için kalan ilaçlarınızı yanınızda getirin

TYLOL HOT PEDIATRİK'ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

TYLOL HOT PEDIATRİK'i kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Bu ürünün kullanımına ilişkin ilave sorularınız varsa doktorunuz ya da eczacınıza sorunuz.

TYLOL HOT PEDIATRİK ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Bulunmamaktadır.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi TYLOL HOT PEDIATRİK'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, TYLOL HOT PEDİATRİK'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

- a. Posterior geri dönüşümlü ensefalopati sendromu (PRES) ve geri dönüşümlü serebral vazokonstriksiyon sendromu (RCVS) olarak bilinen, beyinde kan damarlarını etkileyen ciddi durumlar
- b. Posterior geri dönüşümlü ensefalopati sendromu (PRES) ve geri dönüşümlü ve geri dönüşümlü serebral vazokonstriksiyon sendromu (RCVS) belirtileri olabilecek aşağıda belirtilen semptomlar gelişmesi durumunda hemen TYLOL HOT'ı kullanmayı bırakın ve acil tıbbi yardım alınız:
 - i. Ani başlayan şiddetli baş ağrısı
 - ii. Hasta hissetmek
 - iii. Kusma
 - iv. Bilinç bulanıklığı
- v. Nöbetler, görmede değişiklikler
- c. El, ayak, yüz ve dudakların şişmesi ya da özellikle boğazda nefes darlığına yol açacak şekilde şişmesi (anafilaktik şok)
- d. Astım ve akciğerde nefes darlığına yol açacak astım benzeri belirtiler (bronkospazm)
- e. Deri döküntüsü, kaşıntı, ürtiker (kurdeşen),
- f. Alerjik ödem ve anjiyoödem (alerji sonucu yüz ve boğazda şişme),
- g. Akut generalize eksantematöz püstülozis (yüksek ateşin eşlik ettiği akut yaygın döküntülü içi cerahat dolu küçük kabarcıklar),
- h. Eritema multiforme (genelde kendiliğinden geçen, el, yüz ve ayakta dantele benzer kızarıklık oluşturan, aşırı duyarlılık durumu),
- i. Stevens-Johnson sendromu (ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap),
- j. Fatal sonuçlar dahil toksik epidermal nekroliz (ölümcül sonuçlar dahil deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık),
- k. Kalpte ritim bozukluğu (Aritmi),
- l. Kalbi besleyen damarlarda tıkanma (iskemik kalp hastalığı),
- m. Aşırı duyarlılık
- n. Varsanı, gerçekte olmayan şeyleri görmek veya duymak (Halüsinasyonlar),
- o. Kan basıncı yükselmesi (Hipertansiyon)

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin TYLOL HOT PEDİATRİK'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Yan etkiler görülme sıklıklarına göre aşağıdaki şekilde sıralanmıştır.

Çok yaygın: 10 hastanın en az 1'inde görülebilir.

Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek: 1.000 hastanın birinden az fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor: Eldeki veriler ile tahmin edilemiyor.

Çok yaygın:

- Sakinlik, uyuşukluk veya uyku hali (sedasyon)

Yaygın:

- Uyku bozuklukları
- Dikkat bozukluğu
- Koordinasyon bozukluğu
- Baş ağrısı
- Baş dönmesi
- Bulanık görme
- Bulantı,
- Ağız kuruluğu
- Yorgunluk

Seyrek:

- Stevens-Johnson sendromu (cilt ve mukoza zarının ilaç veya enfeksiyona karşı ciddi şekilde reaksiyon gösterdiği bir rahatsızlıktır)
- Toksik epidermal nekroliz (Lyell sendromu) (ilaç ve çeşitli enfeksiyonlara bağlı gelişebilen deri hastalığı)
- Deri döküntüsü, kaşıntı, egzama, alerjik ödem, yüzde, dilde ve boğazda şişlik (anjiyoödem), yaygın akıntılı döküntüler (akut generalize eksantematöz püstülozis), el, yüz ve ayakta dantele benzer kızarıklık oluşturan, aşırı duyarlılık (eritema multiforme)
- Huzursuzluk
- Varsanı, hayal görme (halüsinasyon) (özellikle çocuklarda) dahil merkezi sinir sistemi (MSS) uyarım belirtileri, konsantre olamama, baş dönmesi
- Kalp atımının hızlanması (taşikardi)
- Kalp ritm bozuklukları (aritmi),
- Kalp çarpıntısı

Çok seyrek

- Kan pulcuğu sayısında azalma (trombositopeni), purpura (deride mor lekeler), kanda methemoglobin bulunması (methemoglobinemi), anormal sayıda düşük beyaz kan hücresi (nötropeni),
- Ani ve sık gelişebilen kan hücresi sayısının azalması (agranülositoz)
- Anafilaksi, deri döküntüleri, anjiyoödem, Stevens-Johnson sendromu ve Toksik Epidermal Nekroliz dahil olmak üzere kutanöz aşırı duyarlılık reaksiyonları
- Aspirin ve diğer non-steroid antiinflamatuvar ilaçlara (NSAİİ) duyarlı hastalarda bronkospazm
- Ciddi deri reaksiyonları bildirilmiştir

Bilinmiyor:

- Posterior geri dönüşümlü ensefalopati sendromu (PRES) ve geri dönüşümlü serebral vazokonstriksiyon sendromu (RCVS) olarak bilinen, beyinde kan damarlarını etkileyen ciddi durumlar

Posterior geri dönüşümlü ensefalopati sendromu (PRES) ve geri dönüşümlü serebral vazokonstriksiyon sendromu (RCVS) belirtileri olabilecek aşağıda belirtilen semptomlar gelişmesi durumunda hemen TYLOL HOT PEDİATRİK kullanmayı bırakın ve acil tıbbi yardım alınız:

- Ani başlayan şiddetli baş ağrısı
- Hasta hissetmek
- Kusma

- Bilinç bulanıklığı
- Nöbetler, görmede değişiklikler
- İskemik optik nöropati
- İskemik kolit, ağız kuruluğu, bulantı, kusma
- Akut jeneralize ekzantematöz püstüloz (AGEP) dahil olmak üzere şiddetli deri reaksiyonları, ürtiker, eksfoliyatif dermatit
- Üriner retansiyon (idrar yapamama)
- Hemolitik anemi, kan hücreleri ile ilgili hastalık (kan diskrazileri)
- Alerjik reaksiyon, döküntü ile birlikte veya döküntüsüz olarak görülebilen ciltte yaygın ödem gelişmesi ile seyreden bir alerjik reaksiyon (anjiyoödem), anafilaktik reaksiyonlar
- İştah kaybı (anoreksi)
- Zihin bulanıklığı (konfüzyon), heyecan, sinirlilik, kabuslar, depresyon
- Kulak çınlaması (tinnitus)
- Çarpıntı, hızlı kalp atışı (taşikardi), kalpte ritm bozukluğu (aritmî)
- Kan basıncı düşüklüğü (hipotansiyon)
- Bronşiyal salgılarda kalınlaşma
- Kusma, karın ağrısı, ishal, hazımsızlık
- Sarılık dahil hepatit
- Eksfoliyatif dermatit (deride kızarıklık ve pullanma) dahil alerjik reaksiyonlar, ışığa duyarlılık, deri reaksiyonları, ürtiker
- Kas seğirmesi, kas güçsüzlüğü
- Göğüste sıkışma

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5. TYLOL HOT PEDIATRİK’in saklanması

TYLOL HOT PEDIATRİK’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25 °C altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra TYLOL HOT PEDIATRİK’i kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz TYLOL HOT PEDIATRİK’i kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş ve kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre, Şehircilik

ve İklim Değişikliği Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat sahibi:

NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
Ümraniye 34768 İSTANBUL

Üretim yeri:

NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
Sancaklar 81100 DÜZCE

Bu kullanma talimatı tarihinde onaylanmıştır.