

KULLANMA TALİMATI

NOTUSS FORT 22.5 mg/5 ml şurup

Ağız yoluyla alınır.

- **Etkin madde:** Her 5 ml şurup 22,5 mg butamirat sitrat içerir.
- **Yardımcı maddeler:** Sitrik asit monohidrat, sodyum sitrat dihidrat, sorbitol %70 non-kristalin, propilen glikol, gliserin, sukraloz, sodyum benzoat, masking flavour, portakal aroması, deiyonize su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin/çocuğunuz için önemli bilgiler içermektedir.

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin/çocuğunuz için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size/çocuğunuza önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

Bu Kullanma Talimatında:

1. **NOTUSS FORT nedir ve ne için kullanılır?**
2. **NOTUSS FORT'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **NOTUSS FORT nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **NOTUSS FORT'un saklanması**

Başlıkları yer almaktadır.

1. NOTUSS FORT nedir ve ne için kullanılır?

- NOTUSS FORT etkin madde olarak butamirat sitrat içeren, şurup formunda bir ilaçtır.
- NOTUSS FORT, “öksürük baskılayıcı ilaçlar” olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir.
- NOTUSS FORT, çocuk emniyetli HDPE kapaklı, amber renkli 60 ml ve 100 ml’lik cam şişelerde ölçekle birlikte kullanıma sunulmaktadır.
- NOTUSS FORT çeşitli nedenlerden kaynaklanan öksürüğün şikayetlere yönelik (semptomatik) tedavisinde kullanılır.

2. NOTUSS FORT’u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

NOTUSS FORT'u ařağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eęer sizin/çocuęunuzun butamirat veya NOTUSS FORT'un bileřiminde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine karřı (yardımcı maddeler listesine bakınız) alerjiniz/alerjisi varsa

Eęer çocuęunuz 3 yařın altında ise NOTUSS FORT'u kullanmayınız.

NOTUSS FORT'u ařağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eęer siz/çocuęunuz aynı zamanda bařka balgam söktürücü ilaçlar alıyorsanız, dikkatli olmalısınız. NOTUSS FORT'un bu tür ilaçlarla aynı anda kullanılmaması önerilir.

6 yařın altında önerilmez.

Bu uyarılar geçmiřteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin/çocuęunuz için geçerliyse lütfen doktorunuza danıřınız.

Öksürük kötüleřirse ya da 7 günden daha uzun süre devam ederse ve/veya ateř ya da inatçı bař ağrısı olursa doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

NOTUSS FORT'un yiyecek ve iecek ile kullanılması:

NOTUSS FORT'un yiyecek ve ieceklerle etkileřimi yoktur.

NOTUSS FORT'u aç ya da tok karına kullanabilirsiniz.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

Hamile iseniz, ilk üç ay NOTUSS FORT kullanmamanız önerilmektedir. Daha sonraki dönemde, ancak doktorunuz kesin gereklilik olduęuna karar verirse NOTUSS FORT kullanabilirsiniz.

Tedaviniz sırasında hamile olduęunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

Bebeęinizi emziriyorsanız, NOTUSS FORT almadan önce doktorunuza danıřınız.

Ara ve makine kullanımı

NOTUSS FORT uykulu hissetmenize neden olabilir. Bu nedenle ara ve makine kullanırken veya dikkat gerektiren dięer iřleri yaparken dikkatli olunuz.

NOTUSS FORT'un ierięinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgilerNOTUSS FORT her dozunda 1 mmol (23 mg)'den daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında "sodyum iermez.

NOTUSS FORT her 5 ml'de 2000 mg sorbitol (%70) ierir. Hafif derecede laksatif etkiye neden olabilir.

NOTUSS FORT her 5 mL'de, 12,66 mg propilen glikol ierir. Bebeęiniz 4 haftadan küük ise özellikle eęer bebeęe propilen glikol veya alkol ieren dięer ilaçlar veriliyorsa bu ilacı vermeden önce doktorunuzla veya eczacınızla temasa geiniz.

NOTUSS FORT , her 1 mL başına 1 mg benzoat tuzu içerir. Benzoat tuzu yeni doğmuş bebeklerde (4 haftalık olana kadar) sarılık riskini arttırabilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer balgam söktürücü özelliği olan başka ilaçlar kullanıyorsanız doktorunuzu mutlaka bilgilendiriniz.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. NOTUSS FORT nasıl kullanılır? Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktor tarafından başka bir şekilde önerilmediği tavsiye edilmediği takdirde kendiniz/çocuğunuz için belirtilen dozlarda kullanınız.

6 yaşın altındaki çocuklarda kullanımı önerilmez.

6-12 yaş arasındaki çocuklarda(6 ve 12 yaş dahil): Günde 2 defa 1 kaşık (5 ml)

12 yaş üzeri ergenlerde (adolesanlarda): Günde 3 defa 1 kaşık (5mL)

Yetişkinlerde: Günde 4 defa 1 kaşık (5 mL)

Doktorunuz farklı bir tavsiyede bulunmadıkça, NOTUSS FORT'u 7 günden daha uzun süre kullanmayınız.

Uygulama yolu ve metodu:

NOTUSS FORT ağız yoluyla kullanılır.

İlacınızın dozunu ayarlamak için dereceli kaşığı kullanınız. Dereceli kaşığı i her kullanımda yıkayıp kurulaınız.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

NOTUSS FORT 3 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.

NOTUSS FORT'un 6 yaş altındaki çocuklarda kullanımı önerilmez.

Yaşlılarda kullanımı:

NOTUSS FORT'un yaşlılarda kullanımı araştırılmamıştır.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

NOTUSS FORT, böbrek veya karaciğer yetmezliği olan hastalarda araştırılmamıştır.

Eğer NOTUSS FORT'un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla NOTUSS FORT kullandıysanız:

NOTUSS FORT'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor ve eczacı ile konuşunuz.

NOTUSS FORT'u kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Aşırı dozda NOTUSS FORT alınması halinde şu belirtiler görülebilir: Uyku hali, bulantı, kusma, ishal, sersemlik ve tansiyon düşmesi. Bu etkiler doz azaltılınca veya tedavi kesilince ortadan kalkabilir. Eğer ilaç kesildiğinde bu etkiler devam ediyorsa doktorunuz veya eczacınıza

danışınız.

NOTUSS FORT ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler
Bulunmamaktadır.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, NOTUSS FORT'un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler görülme sıklıklarına göre aşağıdaki şekilde sıralanmıştır.

- Çok yaygın: 10 hastanın en az birinde görülebilir.
- Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
- Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.
- Seyrek: 1000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
- Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
- Bilinmiyor: Eldeki veriler ile tahmin edilemiyor.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza söyleyiniz:

Seyrek:

- Uyku hali
- Bulantı, ishal
- Ürtiker (kurdeşen)

Bunlar NOTUSS FORT'un hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan "İlaç Yan Etki Bildirimi" ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5. NOTUSS FORT'un saklanması

NOTUSS FORT'u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra NOTUSS FORT'u kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz *NOTUSS FORT'u* kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat sahibi:

Tripharma İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. No:4 34467
Maslak / Sarıyer / İstanbul

Üretim yeri:

Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Orhan Gazi Mah. Tunç Cad. No: 3
Esenyurt / İstanbul

Bu kullanma talimatı .../.../... tarihinde onaylanmıştır.