

KULLANMA TALİMATI

TYLOTUS DAY 500 mg+10 mg+200 mg/20 mL oral çözelti
Ağız yoluyla alınır.

- **Etkin maddeler:** Her 20 ml (1 ölçek), 500 mg parasetamol, 10 mg fenilefrin hidroklorür ve 200 mg guaifenesin içerir.
- **Yardımcı maddeler:** Asesülfam potasyum, sodyum siklamat, trisodyum sitrat anhidrat, sitrik asit monohidrat, sodyum metabisülfat (E223), gliserin, nane aroması, kiraz aroması, propilen glikol, sorbitol (E420), saf su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

Bu Kullanma Talimatında:

1. **TYLOTUS DAY nedir ve ne için kullanılır?**
2. **TYLOTUS DAY'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **TYLOTUS DAY nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **TYLOTUS DAY'in saklanması**

Başlıkları yer almaktadır.

1. TYLOTUS DAY nedir ve ne için kullanılır?

TYLOTUS DAY, kiraz-nane kokulu renksiz berrak çözeltidir.

TYLOTUS DAY, bir ağrı kesici ve ateş düşürücü (parasetamol), mukozanın şişkinliğini azaltarak tıkanıklıkları gideren bir dekonjestan (fenilefrin hidroklorür) ve bir öksürük giderici (guaifenesin) olmak üzere üç etkin madde içeren kombine bir ilaçtır.

TYLOTUS DAY'in 240 mL'lik ticari formu; Kutuda, çocuk kilitli beyaz PP plastik kapaklı 250 ml'lik şeffaf PET plastik şişede, kapağa geçirilmiş 20 mL işaretli PP plastik ölçek kabı ile birlikte ambalajlanır.

TYLOTUS DAY, grip ve soğuk algınlığına bağlı ağrı, ateş, boğaz ağrısı ve boğaz/bronş tahrişine bağlı öksürük gibi belirtileri azaltır.

2. TYLOTUS DAY'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

TYLOTUS DAY'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:

Eğer;

- Etkin maddeler parasetamol, guaifenesin, fenilefrin hidroklorür veya diğer adrenerjik ilaçlara veya TYLOTUS DAY'in içerdiği maddelerden herhangi birine karşı (bkz. yardımcı maddeler listesi) alerjiniz varsa,
- Böbrek veya karaciğer problemlerinizi varsa (alkolik karaciğer hastalığı dahil), aşırı aktif tiroid, diyabet, yüksek tansiyon veya kalp hastalığınız varsa,
- Feokromositoma (böbreküstü bezlerinde oluşan bir tümör olup, adrenalın miktarında artışa sebep olur) hastasıysanız,
- Şiddetli yüksek tansiyon veya hızlı kalp atışının eşlik ettiği bir hastalığınız varsa,
- Koroner arter hastalığınız (kalbi besleyen damarlarda daralma sonucu kalbin kanlanması azalma) varsa,
- Göz tansiyonunuz (glokom) varsa,
- Beta blokörler (örn. atenolol), trisiklik antidepresanlar (örn. imipramin ya da amitriptilin) kullanıyorsanız ya da Monamin Oksidaz İnhibitörleri olarak bilinen depresyon ilacı (örn. moklobemid) kullanıyorsanız ya da son iki hafta içerisinde kullandıysanız.
- İdrara çıkma sonrası, mesanede bir miktar idrarın kaldığı, prostat adenomu (üreme sistemi organının büyümesi) denilen rahatsızlığınız varsa,
- Ürün parasetamol içerir.
- Çok fazla parasetamol almak karaciğerinize ciddi zarar verebilir.
- Bu ilacı alırken parasetamol içeren başka bir ürün kullanılmamalıdır.
- Başka herhangi bir grip, soğuk algınlığı, dekonjestan ürün veya öksürük kesici ile birlikte kullanılmamalıdır.

TYLOTUS DAY'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:

Eğer;

- Kansızlığı (anemisi) olanlarda, akciğer hastalarında, karaciğer ve böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda doktor kontrolü altında dikkatli kullanılmalıdır.
- Birden (akut) yüksek doz verildiğinde ciddi karaciğer toksisitesine neden olur.
- Erişkinlerde uzun süreli (kronik) günlük dozlarda karaciğer hasarına neden olabilir.
- Alkolik karaciğer hastalarında dikkatli kullanılmalıdır.
- Alkol kullanıyorsanız, alkol ile birlikte kullanmayınız.
- Sürekli alkol kullanımınızın yanında karaciğer rahatsızlığınız varsa,
- Alkol alan kişilerde karaciğer zehirlenmesi (hepatotoksisite) riski nedeniyle günlük alınan parasetamol dozunun 2000 mg'ı aşmaması gerekir.
- Geçmişte kalbin atım hızının bozulmasına (aritmi) bağlı olarak Torsades de Pointes veya QT uzaması görüldü ise,
- Kalp-damar sistemi hastalıklarınız varsa (Raynaud fenomeni gibi),
- Serebral ateroskleroz (beyin damarlarında tıkanıklık-daralma) hastasıysanız,
- Belirsiz nedenle tansiyonunuz düşüyorsa (idiyopatik ortostatik hipotansiyon varsa),
- Tiroid fonksiyon bozukluğunuz varsa,
- Prostat büyümeniz varsa (idrar yapmada güçlük),
- Bronşiyal astımınız, kronik öksürüğünüz varsa,
- Karaciğer enzimlerinde yükselme (örneğin alanin aminotransferaz (ALT) düzeyi) ve gelip geçici sarılıkla karakterize kalıtsal bir hastalık olan Gilbert sendromunuz varsa,
- Ameliyat olacaksanız ve anestezi alacaksanız,

- TYLOTUS DAY'i önerilenden daha uzun ya da daha kısa süreli kullanmayınız. TYLOTUS DAY önerilen dozların ve sürenin üzerinde kullanıldığında karaciğer hasarına neden olabilen parasetamol maddesini içermektedir.
- Parasetamol ani yüksek dozlarda ciddi karaciğer zehirlenmesine neden olabilir.
- 16 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.
- Akciğer rahatsızlığınız varsa TYLOTUS DAY'i doktor kontrolü altında kullanmalısınız.
- Parasetamol içeren bir ürünü ilk kez kullanıyorsanız ya da daha önce kullandıysanız, ilk dozda ya da tekrarlayan dozlarda deride kızarıklık, döküntü veya bir deri reaksiyonu oluşabilir. Bu durumda doktorla irtibata geçiniz. İlacı bırakarak alternatif bir tedaviye geçmeniz gerekir. Böyle bir deri reaksiyonu oluşumunda bu ilacı ya da parasetamol içeren başka bir ilacı kullanmamalısınız. Bu durum, ciddi ve ölümlü sonuçlanabilen cilt reaksiyonlarına neden olabilir.
- Kodein içeren herhangi bir ilaç alıyorsanız (ağrı kesici),
- Aşağıda ismi geçen ilaçları kullanıyorsanız,
 - Antikolinerjik ilaçlar örneğin;
 - Antidepresanlar (Ruhsal bozuklukları tedavi eden ilaçlar)
 - Atropin (Bazı göz ve bağırsak hastalıklarının tedavisinde kullanılır)
 - Antihistaminler (Alerji tedavisinde kullanılan ilaçlar)
 - Minör sakinleştiriciler (Kasları rahatlatan ve kaygıyı azaltan ilaçlar)
 - Barbitüratlar (Bir çeşit uyku ilacı)
- Diğer grip, soğuk algınlığı ve dekonjestan (burun mukozasının şişkinliğini azaltarak tıkanıklığını gideren) ürünlerle birlikte kullanmayınız.
- Ürün 5 günden uzun süreli kullanılmamalıdır.
- İçeriğindeki fenilefrin hidroklorür nedeni ile, profesyonel sporcular için doping testlerinde yanlış pozitif sonuç verebilir.
- Ciddi bir enfeksiyonunuz varsa, bu metabolik asidoz riskini artırabilir. Metabolik asidoz belirtileri şunları içerir:
 - derin, hızlı, zor nefes alma
 - hasta hissetmek (bulantı), hasta olmak (kusma)
 - iştah kaybı

Bu semptomların bir ya da birkaçı ortaya çıkarsa hemen bir doktora başvurun.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

TYLOTUS DAY'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

TYLOTUS DAY, alkolle birlikte kullanılırsa karaciğer hasarına neden olabileceğinden bu ürünü kullanılırken alkollü içecekler kullanmamalısınız.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamile iseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız, TYLOTUS DAY kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bebeğinizi emziriyorsanız, TYLOTUS DAY kullanmayınız.

Araç ve makine kullanımı

TYLOTUS DAY uyuşukluğa neden olabilir. Bu nedenle araç ve makine kullanırken dikkatli olunuz.

TYLOTUS DAY'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu ilaç doz başına 5 g sorbitol (E420) içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz. Günlük maksimum dozda kullanıldığında aldığınız sorbitol miktarı 10 gramı geçebileceği için hafif derecede laksatif etkisi olabilir.

Bu ilaç her doz başına (20 mL), 5.833 mg propilen glikol içerir.

TYLOTUS DAY'in içeriğinde bulunan sodyum metabisülfid (E223), nadir olarak şiddetli aşırı duyarlılık reaksiyonları ve bronkospazma neden olabilir.

Bu ilaç her film kaplı tablet başına 1 mmol sodyum (23 mg)'dan daha az sodyum içerir yani aslında "sodyum içermez".

Bu tıbbi ürün her "doz"unda 1 mmol (39 mg)'dan daha az potasyum ihtiva eder; yani aslında "potasyum içermez".

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer;

- Monoamin oksidaz inhibitörleri (maklobemid dahil), difenhidramin veya parasetamol içeren başka bir ilaç kullanıyorsanız,
- Son 14 gün içerisinde bir monoamin oksidaz inhibitörü (depresyon için) kullandıysanız, TYLOTUS DAY kullanmayınız.

Bazı ilaçlarla birlikte kullanıldığında TYLOTUS DAY'in etkisi değişebilir. Aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız lütfen doktorunuza söyleyiniz:

- Sakinleştirici (sedatifler, trankilizanlar) ilaçlar, depresyon (ruhsal çöküntü) için kullanılan ilaçlar (örn. Trisiklik antidepressanlar)
- CYP2D6 adlı karaciğer enzimi ile metabolize olan ilaçlar (metoprolol ve venlafaksin gibi)
- Mide boşalmasında gecikme yaratan ilaçlar (örn. propantelin)
- Mide boşalmasını hızlandıran ilaçlar (örn. Metoklopramid gibi)
- Kolesterol düşürücü ilaçlar (örn. kolestiramin)
- Karaciğer enzimlerini uyaran ilaçlar (örn. Bazı uyku ilaçları, sara hastalığında kullanılan ilaçlar)
- Antibiyotik olarak kullanılan kloramfenikol
- Kan pıhtılaşmasını engelleyen ilaçlar (varfarin ve kumarin türevi antikoagülanlar)
- AIDS hastalığında kullanılan bir ilaç olan zidovudin
- Bulantı-kusma tedavisinde kullanılan domperidon
- Bulantı ve kusmanın önlenmesi için kullanılan ilaçlar (tropisetron ve granisetron)
- Ruhsal çöküntü tedavisinde kullanılan ilaçlar (imipramin, amitriptilin, bitkisel bir ilaç sarı kantaron-St. John Wort gibi antidepressanlar)
- Tüberküloz tedavisinde kullanılan rifampisin ve izoniazid

- Kalp ve astım hastalığı için kullanılan (sempatomimetikler) ilaçlar
- Kalp ritm bozukluğu ve tansiyon için kullanılan ilaçlar (beta-blokerler, debrisoquin, guanetidin, rezerpin)
- Migren tedavisinde kullanılan ergo alkaloidleri (ergotamin ve metiserjit)
- Kalp rahatsızlıklarında kullanılan digoksin ve kardiyak glikozitler
- Doğumu kolaylaştırmak için kullanılan oksitosin
- Bazı göz ve bağırsak hastalıklarının tedavisinde kullanılan atropin
- Alerji tedavisinde kullanılan ilaçlar

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. TYLOTUS DAY nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde aşağıdaki dozlarda kullanınız:

16 yaş ve üzerindeki çocuklar ve yetişkinlerde:

Her doz arasında 4 saat veya daha uzun aralık bırakılarak günde 4 kez 1 ölçek (20 mL) tekrarlanabilir.

4 saatten daha kısa aralıklarla alınmamalıdır.

Günde 4 dozdan fazla (4 ölçek) kullanılmamalıdır.

Önerilenden daha yüksek dozda kullanılmamalıdır.

Doktorunuza danışmadan 5 günden daha uzun süre kullanmayınız.

Etki için gerekli olan en düşük dozda, en kısa tedavi süresince kullanılmalıdır.

Maksimum günlük doz: 24 saat içinde dört doz (toplam 2.000 mg parasetamol, 800 mg guaifenesin, 40 mg fenilefrin HCl).

TYLOTUS DAY tıbbi tavsiye dışında 16 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.

TYLOTUS DAY, alkol alan kişilerde karaciğer hasarı riski nedeniyle günde 3 dozdan fazla kullanılmamalıdır.

Alkol alan kişilerde karaciğer zehirlenmesi (hepatotoksisite) riski nedeniyle günlük alınan parasetamol dozunun 2000 mg'ı aşmaması gerekir.

Uygulama yolu ve metodu:

Sadece ağızdan kullanım içindir.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

TYLOTUS DAY, 16 yaş altı çocuklarda kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda kullanımı:

TYLOTUS DAY, yaşlılarda doz ayarlaması yapılmadan kullanılabilir.

Özel kullanım durumları:

TYLOTUS DAY, şiddetli karaciğer veya böbrek yetmezliği olan hastalarda kullanılmamalıdır.

Eğer TYLOTUS DAY'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla TYLOTUS DAY kullandıysanız:

Parasetamolün doz aşımı durumlarında solgunluk, iştahsızlık, bulantı ve kusma, görülen başlıca belirtileridir, ancak bazı durumlarda saatlerce belirti vermeyebilir. Bu nedenle aşırı doz ya da yanlışlıkla ilaç alınması durumunda hemen doktorunuza bildiriniz ya da bir hastaneye başvurunuz. Kısa sürede (akut) yüksek doz alındığında karaciğer ve böbrek hasarına yol açabilir. Parasetamol aşırı dozajı hemen tedavi edilmelidir.

Fenilefrin hidroklorürün doz aşımında karşılaşılan etkiler olası yan etkiler bölümünde listelenen etkilerle benzerdir. Ciddi vakalarda zihin karışıklığı, halüsinasyonlar (hayal görme), nöbetler ve kalp ritim bozuklukları görülebilir. Ek olarak, hipertansiyon (kan basıncının yükselmesi) ve olası refleks bradikardi (kalp atım hızının düşmesi) görülebilir.

Guaifenesin doz aşımında çok büyük dozlarda bulantı ve kusmaya neden olduğu bildirilmiştir.

TYLOTUS DAY'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

TYLOTUS DAY'i kullanmayı unutursanız:

Eğer TYLOTUS DAY'in bir dozunu almayı unutursanız, hatırladığınız anda dozu alınız ve 4 saat sonra gerekiyorsa (doktorunuzun önerisi doğrultusunda) dozu tekrarlayınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, TYLOTUS DAY'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa TYLOTUS DAY'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

- Ciltte kızarıklık, kaşıntı gibi alerjik cilt reaksiyonları, ciltte soyulma, ağız içinde yaralar
- Çok miktarda alındığında kansızlık, uzun süreli kullanımında kan hücrelerinin sayısında azalma (trombositopeni, trombositopenik purpura, lökopeni, nötropeni, pansitopeni),
- Beyaz kan hücrelerinin sayısında azalma (agranülositoz)
- Açıklanamayan, cilt altında morarma ya da kanamalar
- Tekrarlayan ateş ve enfeksiyonlar
- Mide bulantısı, ani kilo kaybı, iştahsızlık ve gözlerde ve ciltte sararma.
- Görme ile ilgili rahatsızlıklar. Bu nadirdir ancak glokomu olanlarda daha olasıdır.
- Alışılmadık derecede hızlı nabız hızı veya alışılmadık derecede hızlı veya düzensiz kalp atışı hissi.
- İdrar yapmada zorluk. Bu, genişlemiş prostat bezi olan erkeklerde daha olasıdır.
- Lyell sendromu (Fatal sonuçlar dâhil toksik epidermal nekroliz, ilaç ve çeşitli enfeksiyonlara bağlı olarak gelişebilen bir deri hastalığı)
- Stevens-Johnson sendromu (ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap)
- Akut jeneralize eksantematoz püstülozis (yüksek ateşin eşlik ettiği akut yaygın döküntülü, içi cerahat dolu küçük kabarcıklar)

- Astım ve nefes darlığı, ibuprofen veya aspirin gibi diğer ağrı kesicileri alırken bunları daha önce yaşadıysanız, bunların gelişmesi daha olasıdır.
- Çok miktarda alındığında karaciğerde bozukluk
- Artan kan basıncı, baş ağrısı, baş dönmesi, uyku güçlüğü, sinirlilik, kaygı, ishal veya kendinizi hasta hissediyorsanız.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin TYLOTUS DAY'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Yan etkiler aşağıdaki sıklık derecelerine göre sınıflandırılmaktadır.

Çok yaygın: 10 hastanın en az birinde görülebilir.

Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek: 1.000 hastanın birinden az görülebilir.

Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor: Eldeki veriler ile tahmin edilemiyor.

Seyrek:

- Kan pulcuğu sayısında azalma (trombositopeni),
- Alerjik reaksiyonlar, anafilaktik şok (el, ayak, yüz ve dudakların şişmesi, ya da özellikle boğazda nefes darlığına yol açacak şişme)
- Akciğerde nefes darlığına yol açacak astım benzeri belirtiler (bronkospazm)
- Çok miktarda alındığında karaciğerde bozukluk
- Akut pankreatit (pankreas iltihabı)
- Deri döküntüsü, kaşıntı ürtiker, alerjik ödem, yüzde dilde ve boğazda şişlik (anjioödem), yaygın akıntılı döküntüler (akut generalize eksantematöz püstülozis), el yüz ve ayakta dantele benzer kızarıklık oluşturan aşırı duyarlılık eritema multiform), Stevens Johnson sendromu (ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap) ve ilaç ve çeşitli enfeksiyonlara bağlı olarak gelişebilen deri hastalığı (toksik epidermal nekroliz).

Çok seyrek:

- Kandaki beyaz hücre sayısının azalması (Agranülositoz)

Bilinmiyor:

- Sinirlilik, iritabilite (uyaranlara karşı aşırı duyarlı olma durumu), huzursuzluk, heyecanlanma, kafa karışıklığı
- Uykusuzluk
- Baş dönmesi
- Baş ağrısı
- Kan basıncının yükselmesi
- Bulantı, kusma, ishal
- Göz bebeğinin büyümesi (midriyazis), akut kapalı açılı glokom (kapalı açılı glokomu olanlarda görülmesi daha olasıdır.)
- Hızlı nabız (taşikardi)
- Çarpıntı

- Alerjik reaksiyonlar (ör: ciltte döküntü, ürtiker, alerjik dermatit)
- İdrar yapmada güçlük
- Alerjik reaksiyonlar, anjiyoödem (göz kapakları, eller, ayaklar, bilekler, ağız, boğaz, dudak ve dilde şişme), aniden başlayan ve ölüme neden olabilen ciddi alerjik reaksiyon (anaflaktik reaksiyon)
- Nefes almada güçlük
- Karında rahatsızlık hissi
- Döküntü
- Dizüri, üriner retansiyon, bu daha çok mesane çıkış obstrüksiyonuyla meydana gelir
- Prostatik hipertrofi
- Dispne
- Karında rahatsızlık hissi
- Ürtiker

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5. TYLOTUS DAY’ın saklanması

TYLOTUS DAY’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında ve ambalajında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra TYLOTUS DAY’i kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz TYLOTUS DAY’i kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat sahibi:

NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

Ümraniye 34768 İSTANBUL

Üretim yeri:

NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

Merkez 81100 DÜZCE

Bu kullanma talimatı .../.../.... tarihinde onaylanmıştır.