

KULLANMA TALİMATI

VOXZOGO 0,4 mg enjeksiyonluk çözelti hazırlamak için toz ve çözücü

Deri altına uygulanır

Steril

- **Etkin madde:** Etkin madde vosoritiddir (*Escherichia coli* hücrelerinde rekombinant DNA teknolojisi ile üretilmiştir). 0,5 mL çözücü bulunan bir çözeltide sulandırılan her 0,4 mg toz içeren flakon, 0,8 mg/mL'lik bir konsantrasyona karşılık gelir.
- **Yardımcı maddeler:** Sitrik asit monohidrat, sodyum sitrat dihidrat, trehaloz dihidrat, D-mannitol, L-metionin, polisorbat 80. Çözücü, enjeksiyonluk sudur.

▼ Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini sağlayacaktır. Meydana gelen herhangi bir yan etkiyi raporlayarak yardımcı olabilirsiniz. Yan etkilerin nasıl raporlanacağını öğrenmek için 4. Bölümün sonuna bakabilirsiniz.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

Bu Kullanma Talimatında:

1. ***VOXZOGO nedir ve ne için kullanılır?***
2. ***VOXZOGO'yu kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler***
3. ***VOXZOGO nasıl kullanılır?***
4. ***Olası yan etkiler nelerdir?***
5. ***VOXZOGO'nun saklanması***

Başlıkları yer almaktadır.

1. VOXZOGO nedir ve ne için kullanılır?

VOXZOGO, vosoritid etkin maddesini içerir. Bir cam flakon içerisinde enjeksiyonluk çözelti için beyaz ila sarı arası renkte bir toz ve tozu çözmek için berrak ve renksiz bir çözücü (enjeksiyonluk su) bulunur. Çözelti, çözücüde tozu çözdükten sonra berrak, renksiz ila sarı renk bir sıvıdır.

Vosoritid, vücutta C tipi natriüretik peptid (CNP) adı verilen bir proteine benzerdir. Proteini üreten geni içerecek şekilde değiştirilmiş bakterileri içeren rekombinant teknoloji ile elde edilir.

Bu ilaç, kemikleri hala büyüyen hastalarda akondroplaziyi tedavi etmek için kullanılır. Akondroplazi, kafatası, omurga, kollar ve bacaklar da dahil olmak üzere vücuttaki hemen hemen tüm kemiklerin büyümesini etkileyen, karakteristik bir görünüme sahip çok kısa boyla sonuçlanan genetik bir durumdur.

Ürün yalnızca genetik testlerle doğrulandığı üzere fibroblast büyüme faktörü reseptörü 3 (FGFR3) genindeki değişimlerin (mutasyon) neden olduğu akondroplazi tedavisinde kullanılır.

VOXZOGO'daki aktif madde, yeni kemik büyümesini teşvik etmek için doğrudan kemiklerinizin büyüme noktaları üzerinde çalışır.

2. VOXZOGO'yu kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

VOXZOGO'yu aşağıdaki durumda KULLANMAYINIZ:

Eğer;

- Sizde veya çocuğunuzda vosoritide veya bu ilacın içeriğindeki diğer maddelerden herhangi birine karşı alerji varsa.

VOXZOGO'yu aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:

VOXZOGO'yu kullanmadan önce doktorunuzla konuşunuz:

Eğer;

- Sizde veya çocuğunuzda önemli kalp hastalığı veya tansiyon sorunları varsa.
- Siz veya çocuğunuz tansiyon düşürücü ilaçlar alıyorsanız veya yakın zamanda almışsanız.

Bunlardan herhangi biri sizin veya çocuğunuz için geçerliyse veya emin değilseniz VOXZOGO'yu kullanmadan önce doktorunuzla konuşunuz.

Kan basıncı etkileri

VOXZOGO kan basıncını (tansiyon) düşürebilir. Sonuç olarak başınız dönebilir, mideniz bulanabilir veya yorgun hissedebilirsiniz. Kan basıncı genellikle VOXZOGO enjeksiyonun 90. dakikası içinde normale döner. Bu etkiler ortaya çıkarsa ve şiddetli ise doktorunuza söyleyiniz.

Biyoteknolojik ürünlerin izlenebilirliğinin sağlanabilmesi için uygulanan ürünün ticari ismi ve seri numarasının hasta dosyasına kaydedilmesi gerekmektedir.

Bu uyarıların sizin veya çocuğunuz için geçerli veya geçmişteki herhangi bir dönemde geçerli olup olmadığını lütfen doktorunuza bildiriniz.

VOXZOGO'nun yiyecek ve içeceklerle kullanılması

Enjeksiyon sırasında bol miktarda sıvı içmek kan basıncı etkilerinin olasılığını azaltabilir. Hastaların enjeksiyondan yaklaşık 30 dakika önce hafif bir atıştırmalık yemesi ve yeterli miktarda sıvı (örn. su, süt veya meyve suyu) içmesi önerilmektedir.

Hamilelik

Bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaçla tedavi görüyorsanız ve hamileyseniz, hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız veya hamile kalmayı planlıyorsanız, bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

Bu ilacın hamilelik sırasında kullanılması önerilmemektedir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaçla tedavi görüyorsanız ve emziriyorsanız, bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

Emzirme döneminde bu ilacın kullanılması önerilmemektedir.

Araç ve makine kullanımı

Bu ilaç, enjeksiyondan kısa bir süre sonra baş dönmesi, sersemlik, yorgunluk hissetmenize veya kendinizi hasta hissetmenize neden olabilir. Böyle bir durumda enjeksiyondan sonra yaklaşık bir saat veya kendinizi daha iyi hissedene kadar araba kullanmamalı, bisiklete binmemeli, fiziksel aktivitelerde bulunmamalı veya makine kullanmamalısınız.

VOXZOGO'nun içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)'dan daha az sodyum içermektedir; yani esasında 'sodyum içermez'.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Siz veya çocuğunuz başka ilaçlar alıyorsanız, yakın zamanda aldıysanız veya alma ihtimaliniz varsa doktorunuza bildiriniz.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. VOXZOGO nasıl kullanılır?

• Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Bir hasta bakıcı VOXZOGO enjeksiyonunu yapmalıdır. Bir sağlık uzmanından gerekli eğitimi almadan çocuğunuza VOXZOGO enjekte etmeyiniz.

Bu ilacı her zaman doktorunuzun size söylediği şekilde kullanınız. Emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Sizin veya çocuğunuzun vücut ağırlığına bağlı olarak doktorunuz doğru dozu seçecektir. Doktor size enjeksiyon çözeltisinin ne kadarını enjekte edeceğinizi söyleyecektir. Emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

Tablo 1 sizin veya çocuğunuzun vücut ağırlığına göre günlük olarak enjekte edilmesi gereken dozu göstermektedir.

Tablo 1: Birim (U) hacim cinsinden vücut ağırlığına göre tek doz hacimleri

Vücut ağırlığı (kg)	Doz (mg)	Vosoritid 0,4 mg çözücü (enjeksiyonluk su): 0,5 mL konsantrasyon: 0,8 mg/mL	Vosoritid 0,56 mg çözücü (enjeksiyonluk su): 0,7 mL konsantrasyon: 0,8 mg/mL	Vosoritid 1,2 mg çözücü (enjeksiyonluk su): 0,6 mL konsantrasyon: 2 mg/mL
		Günlük enjeksiyon hacmi		
		Birim	Birim	Birim
3	0,096 mg	12 U		
4	0,12 mg	15 U		
5	0,16 mg	20 U		
6-7	0,20 mg	25 U		
8-11	0,24 mg	30 U		
12-16	0,28 mg		35 U	
17-21	0,32 mg		40 U	
22-32	0,40 mg		50 U	
33-43	0,50 mg			25 U
44-59	0,60 mg			30 U
60-89	0,70 mg			35 U
≥ 90	0,80 mg			40 U

Siz veya çocuğunuz, enjeksiyondan yaklaşık 30 dakika önce hafif bir atıştırma yemeli ve yeterince su, süt veya meyve suyu içmelisiniz. Bu, baş dönmesi, yorgunluk veya mide bulantısı (hasta hissetme) gibi yan etkileri azaltabilir.

• **Uygulama yolu ve metodu:**

VOXZOGO'yu yavaşça deri altına enjekte ediniz (subkütan enjeksiyon).

Enjeksiyon her gün yaklaşık aynı saatte yapılmalıdır.

Enjeksiyonu her gün farklı bir yere yapmanız ve aynı bölgeyi 2 gün üst üste kullanmamanız önerilmektedir. Bu ilacı benlere, yara izlerine, doğum lekelerine veya cildin hassas, morarmış, kırmızı veya sert olduğu bölgelere enjekte etmeyiniz.

- **Değişik yaş grupları:**

Yaşlılarda kullanımı:

Bu ilacın yaşlılarda kullanımına ilişkin bilgi bulunmamaktadır.

- **Özel kullanım durumları:**

Böbrek/Karaciğer yetmezliği

VOXZOGO böbrek veya karaciğer yetmezliği olan hastalarda değerlendirilmemiştir.

VOXZOGO'nun etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla VOXZOGO kullandıysanız

VOXZOGO'yu kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla VOXZOGO enjekte ettiyseniz hemen doktorunuzla iletişime geçiniz.

VOXZOGO'yu kullanmayı unutursanız

Çocuğunuza bir doz yapılması unutulursa, planlanan 12 saatlik uygulama süresi içinde enjeksiyon yapılmalıdır. Planlanan doz süresinin üzerinden 12 saatten fazla zaman geçmişse unutulmuş dozu enjekte etmeyiniz. Ertesi güne kadar bekleyiniz ve her zamanki saatte normal dozla devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

VOXZOGO ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Çocuğunuzun tedavisini sonlandırmaya karar vermeden önce daima çocuğunuzun doktoruyla konuşunuz. Eğer sizin veya çocuğunuzun bu ilacın kullanımına ilişkin ilave sorularınız varsa, doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi bu ilacın da yan etkileri olmasına rağmen bu yan etkiler herkeste görülmeyebilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

Çok yaygın:	10 hastanın en az 1'inde görülebilir.
Yaygın:	10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan:	100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Seyrek:	1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Çok seyrek:	10.000 hastanın birinden az görülebilir.
Bilinmiyor:	Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Çok yaygın:

- Kusma
- Düşük kan basıncı (geçici etkiler arasında baş dönmesi, yorgunluk hissi veya enjeksiyondan kısa süre sonra hasta hissetme yer alır)

- Enjeksiyon bölgesi reaksiyonları: kızarıklık, kaşıntı, iltihaplanma, şişme, morarma, döküntü, kurdeşen, ağrı. Enjeksiyon bölgesi reaksiyonları genellikle azdır ve birkaç saat içinde kendiliğinden düzelir.
- Kanda yüksek düzeyde alkalın fosfataz (kan testlerinde görülür)

Yaygın:

- Baygınlık veya sersemlik hissi ve bayılma
- Baş dönmesi
- Mide bulantısı
- Yorgunluk

Yaygın olmayan:

- Erkeklerde veya kadınlarda vücudun herhangi bir yerinde anormal kıl büyümesi (hipertrikoz)

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatı'nda yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan "İlaç Yan Etki Bildirimi" ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5. VOXZOGO'nun saklanması

VOXZOGO çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Karton üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra bu ilacı **kullanmayınız**. Son kullanma tarihi o ayın son gününü ifade eder.

Buzdolabında (2°C–8°C) saklayınız. **Dondurmayınız**. Işıktan korumak için orijinal ambalajında saklayınız.

VOXZOGO oda sıcaklığında (30°C'nin altında) 90 güne kadar saklanabilir, ancak son kullanma tarihi geçmemelidir. VOXZOGO'yu oda sıcaklığında sakladıktan sonra buzdolabına geri **koymayınız**. Oda sıcaklığında saklamak üzere VOXZOGO'yu buzdolabından çıkardığınız **tarihi** kartonun üzerine **kaydediniz**.

VOXZOGO'yu çözelti olarak hazırlandığı anda kullanınız. Sulandırılmış çözeltinin kimyasal ve fiziksel stabilitesi 25°C'de 3 saat süreyle kanıtlanmıştır. Sulandırılmış çözelti hemen kullanılmazsa, sulandırıldıktan sonraki 3 saat içinde uygulanmalıdır. Enjeksiyonluk çözelti bulanıksa veya herhangi bir parçacık içeriyorsa bu ilacı kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat Sahibi: BioMarin İlaç ve Ticaret Ltd. Şti., Kavacık / Beykoz / İstanbul

Üretim yeri: Vetter Pharma- Fertigung GmbH and Co. KG, Ravensburg / Almanya

Bu kullanma talimatı 31/03/2026 tarihinde onaylanmıştır.

Birim (U) cinsinden derecelendirilen enjektörün kullanım talimatları


Lütfen VOXZOGO'yu kullanmadan önce ve her yeniden doldurduğunuzda bu Kullanma Talimatını okuyunuz. Yeni bilgiler olabilir.

Bu ambalajda bulunan çözücü iğneleri ve uygulama enjektörleri yeni bileşenlerdir ve önerilen dozunuzu ölçmek için "Birim" (U) cinsinden işaretlenmiştir. Doktorunuz kilo aralığınıza göre size uygulanacak önerilen dozu söyleyecektir.


VOXZOGO'yu enjekte etmek için sağlanan öğeler (bkz. Şekil A)

Şekil A


VOXZOGO flakonu



Çözücü iğnesi



Çözücü enjektörü (VOXZOGO'nun sulandırılması için enjeksiyonluk su içerir)



Enjeksiyon enjektörü



Dozunuz Şekil A'daki enjeksiyon enjektörü kullanılarak verilebilir. Bu enjektörün ölçümlerinin mL'ye eşdeğeri şu şekildedir: 0,1 mL = 10 Birim.

Önerilen dozdan veya çözücü iğnesi ve enjeksiyon enjektörünün nasıl kullanılacağından emin değilseniz lütfen doktorunuzla veya sağlık uzmanınızla konuşunuz.

İhtiyaç duyulan ancak ambalajda *bulunmayan* öğeler (bkz. Şekil B)



Eğer bu öğeler elinizde yoksa eczacınıza danışınız.

Şekil B

Alkollü mendiller

Kesici/delici atık alet kutusu

Gazlı bez veya bandaj




ENJEKSİYONA HAZIRLIK


Başlamadan önce çalışma yüzeyinizin temiz olduğundan ve ellerinizi yıkadığınızdan emin olunuz.





Adım 1: Temiz, düz bir yüzey üzerinde flakonun kapağını açınız ve üstünü alkollü bir mendille siliniz.

Alkollü mendil ile sildikten sonra flakon tıpasına parmaklarınızla dokunmayınız.



Adım 2: Kapağı çözücü enjektöründen çıkarmak için yavaşça bükünüz.




Adım 3: Çözücü iğnesini, artık çeviremeyecek duruma gelene kadar çözücü enjektörünün üzerinde çeviriniz.	
Adım 4: İğne kapağını çekip çıkarınız ve iğneyi flakon tıpasının ortasından flakon içine sokunuz. Sıvının tamamını enjekte etmek için piston çubuğunu yavaşça aşağı doğru itiniz.	
Adım 5: İğneyi flakondan çıkarınız. İğneyi ve enjektörü kesici/delici atık alet kutusuna atınız. 18. adıma ve “VOXZOGO nasıl atılır (imha edilir)?” konusuna bakınız. Enjeksiyonu yapmak için çözücü enjektörünü kullanmayınız. ⚠ DİKKAT: İğne ucuna dokunmamaya dikkat ediniz.	
Adım 6: Toz tamamen çözünene ve çözelti berraklaşana kadar flakonu yavaşça döndürünüz. Çalkalamayınız. İlacın berrak ila sarı renkte olduğundan, bulanık olmadığından ve parçacık içermediğinden emin olunuz.	

Adım 7: İğne kapağını enjeksiyon enjektöründen çıkarınız ve iğneyi, flakon tıpasının ortasından düz bir şekilde flakonun içine sokunuz.


İğneyi bükmemeye dikkat ediniz.

⚠ DİKKAT: Kapağı iğnenin üzerine geri takmayınız.



Adım 8: Flakonu ve enjektörü dikkatlice tutunuz ve iğne hâlâ takılıyken flakonu baş aşağı çeviriniz. Flakon üstte olmalıdır.


İğneyi bükmemeye dikkat ediniz.




Adım 9: İğne ucunu ilacın içinde tutunuz ve reçete edilen dozu enjektöre çekmek için piston çubuğunu yavaşça geri çekiniz.



Ne kadar hazırlayacağınızı öğrenmek için reçete kağıdını kontrol ediniz.

⚠ DİKKAT: Ambalajda bulunan enjektörü kontrol ediniz ve reçete edilen dozu hazırlayınız.





Adım 10: Enjektöre hafifçe vurarak enjektördeki büyük hava kabarcıklarını çıkarınız. Daha sonra kabarcıkları yavaşça flakona geri itiniz.





Adım 11: Enjektörde doğru reçete edilen dozu elde edene ve büyük kabarcıklar kalmayana kadar 9. ve 10. adımları tekrarlayınız. Enjektördeki dozun reçete edilen dozla eşleştiğinden emin olunuz. Şekilde gösterildiği gibi pistonun tabanından itibaren ölçünüz. ⚠ DİKKAT: Büyük kabarcıkları çıkarınız. Bir veya 2 küçük kabarcık kabul edilebilir.	
Adım 12: Enjektörde reçete edilen dozun bulunduğundan emin olunuz, ardından flakonu çıkarınız ve dozu uygulamaya hazırlanınız. ⚠ DİKKAT: Flakonu çıkarmadan önce miktarın reçete edilen dozla eşleştiğini doğrulayınız.	


ENJEKSİYON BÖLGESİ SEÇİMİ VE HAZIRLANMASI

Adım 13: VOXZOGO yalnızca deri altındaki yağ tabakasına (subkütan) enjekte edilmelidir. • Giysilerin üzerinden enjeksiyon yapmayınız. • Aynı bölgeye art arda iki kez enjeksiyon yapmayınız. • Ağrılı, morarmış, kırmızı, sert veya yaralı cilde enjeksiyon yapmayınız.	Enjeksiyon için aşağıdaki bölgeler önerilir: • Üst kolların arkası veya • Uyluklar veya • Karın (göbek deliğinin 5 cm'lik çevresi hariç) • Kalçalar
---	---

	
Adım 14: Enjeksiyon bölgesini alkollü bir mendil ile siliniz ve cildin havayla kurumasını bekleyiniz. Enjeksiyondan önce bölgeye tekrar dokunmayınız.	

VOXZOGO ENJEKSİYONUNUN UYGULANMASI

Adım 15: Bölgeyi alkollü bir mendil ile sildikten sonra, seçilen enjeksiyon bölgesinin etrafındaki deriyi parmağınızla şekildeki gibi sıkıştırınız.	
Adım 16: İğneyi hızla 45 derecelik bir açıyla cilde tamamen batırınız.	

Adım 17: Tuttuğunuz cildi bırakınız ve piston çubuğunu yavaşça sonuna kadar itiniz. Tam dozu enjekte ediniz.	
Adım 18: Kullanılmış flakonu, enjektörleri ve iğneleri kesici/delici atık alet kutusuna atınız. Daha fazla bilgi için “VOXZOGO Nasıl Atılır (İmha Edilir)” konusuna bakınız.	

VOXZOGO'yu enjekte ettikten sonra

- Enjeksiyon bölgesini kontrol ediniz. Enjeksiyon bölgesinde az miktarda kan varsa, gazlı bezi birkaç saniye boyunca hafifçe bastırınız veya bir bandaj uygulayınız.
- Enjeksiyon bölgesini **ovalamayınız**.
- Baş dönmesi, yorgunluk veya hasta hissetme gibi düşük tansiyon belirtilerine dikkat ediniz. Bu belirtilere sahipseniz doktorunuzu veya sağlık uzmanınızı arayınız, ardından sırt üstü yattınız ve bacaklarınızın altına yastıklar koyarak onları yükseltiniz.

VOXZOGO nasıl atılır (imha edilir)

Kullanılmış veya son kullanma tarihi geçmiş flakonlarınızı, iğnelerinizi ve enjektörlerinizi kullanımdan hemen sonra kesici/delici atık alet kutusuna koyunuz.

Keskin atıklara yönelik bir kesici/delici atık alet kutunuz yoksa, aşağıdaki özelliklere sahip bir ev kabı kullanabilirsiniz:

- Ağır hizmet tipi plastikten yapılmış,
- Sıkı oturan, kesilmeye/delinmeye karşı dayanıklı bir kapakla, kesici/delici parçaların dışarı çıkmasına izin vermeden kapatılabilen,
- Kullanım sırasında dik ve stabil olan,
- Sızdırmayan ve
- Kutunun içindeki tehlikeli atık konusunda uyarmak için uygun şekilde etiketlenmiş olmalıdır.

Keskin alet imha kabınız neredeyse dolmak üzereyken, kesici alet imha kabınızı doğru şekilde imha etmenin yolunu bulmak için yerel mevzuata uymanız gerekecektir.

İlaçları, flakonları, gevşek iğneleri ve enjektörleri evsel atıklarla birlikte atmayınız. Artık kullanmadığınız ilaçları nasıl atacağınızı eczacınıza sorunuz. Bu önlemler çevrenin korunmasına yardımcı olacaktır.