

## KULLANMA TALİMATI

### CANTİNOL 600 mg vajinal yumuşak kapsül

Vajinal yoldan uygulanır.

**Etkin madde:** Her bir yumuşak kapsül 600 mg Fentikonazol nitrat içerir.

**Yardımcı madde(ler):** Dolgu maddesi: Sıvı parafin, vazelin, soya lesitini.

Kapsül kabuğu: Yenilebilir Jelatin (sığır jelatini), gliserin, titanyum dioksit, Metilhidroksibenzoat (E218), saf su.

**Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.**

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlacınız hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

#### **Bu Kullanma Talimatında:**

1. **CANTİNOL nedir ve ne için kullanılır?**
2. **CANTİNOL'ü kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **CANTİNOL nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **CANTİNOL'ün saklanması**

**Başlıkları yer almaktadır.**

#### **1. CANTİNOL nedir ve ne için kullanılır?**

CANTİNOL antifungal bir ajan olan fentikonazol nitrat aktif maddesini içerir.

CANTİNOL belirli cins mantarların büyümesini engeller. Özellikle vajinal pamukçuğa neden olan *Candida albicans*'a karşı etkilidir.

CANTİNOL 600 mg vajinal yumuşak kapsül yalnızca vajinaya uygulanmak içindir.

#### **2. CANTİNOL'ü kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**

**CANTİNOL'ü aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ**

Eğer;

- Fentikonazol nitrat ya da imidazoller (örn. klotrimazol) olarak bilinen diğer benzer ilaçlara ya da diğer yardımcı maddelere karşı aşırı duyarlılığınız var ise,

CANTİNOL kullanmayınız.

**CANTİNOL'ü aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ**

Eğer;

- Doğum kontrolü için kondom ya da diyafram gibi bir bariyer yöntemi kullanıyorsanız,
- CANTİNOL uyguladığınızda, hafif bir yanma hissedebilirsiniz ancak bu genellikle kısa sürede yok olur,
- CANTİNOL'ü uzun süre kullanırsanız, ona karşı alerjik olabilirsiniz, bu durumda CANTİNOL'ü kullanmayı kesmelisiniz.
- Gebe iseniz doktorunuza danışmadan CANTİNOL'ü kullanmayınız.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

### **CANTİNOL'ün yiyecek ve içecek ile kullanılması**

CANTİNOL'ün uygulama yöntemi açısından yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.

### **Hamilelik**

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

Hamilelik döneminizde doktorunuz tarafından tavsiye edilmediği sürece bu ilaç kullanılmamalıdır.

*Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

### **Emzirme**

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

Emzirme döneminde doktorunuz tarafından tavsiye edilmediği sürece bu ilacı kullanmamanız önerilir. Emziriyorsanız doktorunuzu bilgilendiriniz.

### **Araç ve makine kullanımı**

CANTİNOL'ün araç ve makine kullanımı üzerinde bildirilen bir etkisi yoktur.

### **CANTİNOL'ün içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler**

Bu ürünlerdeki yardımcı maddelerden Metilhidroksibenzoat (E218) alerjik reaksiyonlara neden olabilir (muhtemelen daha sonra).

CANTİNOL soya lesitini ihtiva eder. Eğer fıstık ya da soyaya alerjiniz varsa bu tıbbi ürünü kullanmayınız.

### **Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı**

Vajinal yumuşak kapsülün diğer ilaçlarla etkileşimi muhtemel değildir.

*Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.*

## **3. CANTİNOL nasıl kullanılır?**

### **Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:**

CANTİNOL'ü ne kadar ve ne sıklıkta kullanacağınıza doktorunuz karar verecektir.

Gece yatarken yalnızca 1 CANTİNOL 600 mg vajinal yumuşak kapsül 1 kere vajina derinliğine uygulanmalıdır.

**Uygulama yolu ve metodu:**

CANTİNOL 600 mg vajinal yumuşak kapsülün vajinaya uygulanması:

1. Sırt üstü yatın, dizlerinizi kaldırın ve bacaklarınızı açın.
2. Vajinal yumuşak kapsülü, rahat olabildiğiniz kadar vajinanın derinine itin.
3. Bu işlemten sonra her zaman ellerinizi sabun ve sıcak suyla yıkayınız. CANTİNOL yağlı değildir, leke yapmaz ve suyla kolayca temizlenir.

Eğer iyileşme gözlenmez ya da durum daha kötüleşirse, doktorunuza danışınız.

Eğer ürünün kullanımıyla ilgili başka sorunuz varsa doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

**Değişik yaş grupları:**

**Çocuklarda kullanımı:**

CANTİNOL'ün çocuklarda kullanımı önerilmez.

**Yaşlılarda kullanımı:**

Özel kullanımı yoktur.

**Özel kullanım durumları:**

**Böbrek / Karaciğer yetmezliği:**

Özel kullanımı yoktur.

*Eğer CANTİNOL'ün etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.*

**CANTİNOL'ü yanlışlıkla yutarsanız:**

Eğer siz ya da bir başkası yanlışlıkla bir CANTİNOL 600 mg vajinal yumuşak kapsül yutarsa hemen bir doktora başvurunuz.

*CANTİNOL'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.*

**CANTİNOL'ü kullanmayı unutursanız:**

Eğer ilacınızı kullanmayı unuttuysanız, hatırlar hatırlamaz uygulayınız ve sonra dozları normal zamanında kullanmaya devam ediniz.

*Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.*

**CANTİNOL ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:**

Doktorunuza danışmadan tedavinizi yarım bıraktığınız takdirde hastalığınızın belirtileri tekrar ortaya çıkabilir. Doktorunuz tarafından söylenmedikçe ilaç almayı durdurmayınız.

**4. Olası yan etkiler nelerdir?**

Tüm ilaçlar gibi CANTİNOL'ün içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır.

Çok yaygın: 10 hastanın en az 1'inde görülebilir.

Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek: 1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Uygulama bölgesinde hafif ve geçici kızarıklık ya da genellikle hızlıca kaybolan yanma hissi görülebilir.

Uzun süre CANTİNOL kullanırsanız, buna karşı alerji geliştirebilirsiniz.

#### Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri [www.titck.gov.tr](http://www.titck.gov.tr) sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

*Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.*

#### **5. CANTİNOL’ün Saklanması**

*CANTİNOL’ü çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.*

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Buzdolabı ya da buzlukuna koymayınız.

**Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.**

*Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra CANTİNOL’ü kullanmayınız.*

İlaçlar atık su ya da evdeki atıklar yoluyla imha edilmemelidir. Artık ihtiyaç duymadığınız ilaçları nasıl imha edeceğiniz konusunda eczacınıza danışınız. Bu önlemler çevreyi korumaya yardımcı olacaktır.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz CANTİNOL’ü kullanmayınız.

#### ***Ruhsat sahibi:***

MG FARMA Sağlık Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti.

Kuzeykent Mah. 31157 Sok. Erdoğan Apt 8/A Yenişehir/Mersin

***Üretim yeri:***

Vefa İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Beylikdüzü/İstanbul

*Bu kullanma talimatı 13./03/2026 tarihinde onaylanmıştır.*