

KULLANMA TALİMATI

EXCİDERM LİPO %4 deriye uygulanacak emülsiyon Cilt üzerine uygulanır.

Etkin madde: Her 1 ml emülsiyon 40 mg üre içerir.

Yardımcı maddeler: Mristal laktat, dimetikon, sodyum laktat, laktik asit, klorheksidin hidroklorit, parafin likit, orta zincirli trigliserit, arlancel 582, arlancel 989, elfacos E200, parfüm, bütıl hidroksitoluen ve deiyonize su

Bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu ilaç sizin reçetesiz olarak temin edip bir doktor yardımını almadan eczacınızın tavsiyesi ile hafif bir hastalığı tedavi etmeniz içindir. Buna karşın, yine EXCİDERM LİPO'dan en iyi sonuçları alabilmeniz için dikkatli kullanmanız gerekmektedir.

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

Bu kullanma talimatında:

1. **EXCİDERM LİPO nedir ve ne için kullanılır?**
2. **EXCİDERM LİPO'yu kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **EXCİDERM LİPO nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **EXCİDERM LİPO'nun saklanması**

Başlıkları yer almaktadır.



1. EXCİDERM LİPO nedir ve ne için kullanılır?

- EXCİDERM LİPO, plastik kapak ve tıpa ile kapatılmış 200 ml'lik HDPE şişe primer ambalaj içerisinde ve karton kutuda kullanma talimatı ile beraber kullanıma sunulmaktadır.
- EXCİDERM LİPO, hafif parfüm kokulu beyaz renkli emülsiyon şeklindedir.
- EXCİDERM LİPO; deri üzerine sürülerek kullanılan bir üründür. Yumuşatıcılar ve Koruyucular olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir. Etkin madde olarak 100 gramında 4 g üre içerir. Suyu geçirmez ancak yüksek yağ içeriğine rağmen kolayca eğilebilir.
- EXCİDERM LİPO, nemlendirici etkisi ve içeriğindeki yağlar ile cildin durumunun iyileşmesini ve normale dönmesini sağlar. Böylece kuru cilt yüzeyi yumuşatılır, cildin elastikliği ve direnci artırılmış olur.
- EXCİDERM LİPO, iktiyozis (balık pulu görünümündeki kuru cilt hastalığı), kserodermalkserozis (kuru cilt), atopik egzama, asteatotik egzama gibi kronikleşmiş kuru cilt durumlarının eşlik ettiği deri hastalıklarının tedavisinde kullanılır.
- EXCİDERM LİPO, geniş yüzeylere uygulanabilir.
- EXCİDERM LİPO, normalden hafif kuruya değişen ciltlere uygulanabilir.
- EXCİDERM LİPO, diğer tıbbi ürünlerle birlikte kullanıma uygundur (Örneğin sabah EXCİDERM LİPO-gece kortikosteroidli bir ürün)
- Cilt hastalığı iyileştikten sonra da kullanılabilir.

2. EXCİDERM LİPO'yu kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

EXCİDERM LİPO'yu aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

- Üre veya EXCİDERM LİPO içeriğindeki yardımcı maddelerden herhangi birisine karşı aşırı duyarlılığınız (alerjik durum) varsa.
- Yara veya açık yara var ise kullanmayınız.
- Cilt iritasyonu açısından sistematik olarak araştırılmadığı için, bebeklerde kullanılmamalıdır.
- Gözle temasından sakınınız.

EXCİDERM LİPO'yu aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:

Eğer,

- Bölgesel tahriş veya kızarıklık,
- Deride çatlama,
- İltihap var ise dikkatli kullanınız, geçici sizi oluşabilir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

EXCİDERM LİPO'nun yiyecek ve içecek ile kullanılması

EXCİDERM LİPO'nun uygulama yöntemi açısından yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.



Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

EXCİDERM LİPO'nun gebe kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik / emriyonal / fetal gelişim, doğum ya da doğum sonrası gelişim üzerindeki etkiler bakımından yetersizdir. İnsanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir.

EXCİDERM LİPO, gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Üre'nin insan sütüyle atılıp atılmadığı bilinmemektedir. Üre'nin süt ile atılımı hayvanlar üzerinde araştırılmamıştır. EXCİDERM LİPO tedavisinin durdurulup durdurulmayacağına ilişkin karar verilirken, fayda/zarar oranı dikkate alınmalıdır.

Bebegi emzirmeden önce, meme ucunda herhangi bir artık kalmayacak şekilde etrafı dikkatlice ve tamamen temizlenmelidir.

Araç ve makine kullanımı:

Cilt üzerine topikal olarak uygulanan EXCİDERM LİPO'nun araç ve makine kullanımı üzerine herhangi bir etkisi yoktur.

EXCİDERM LİPO'nun içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün her 1 ml'sinde 0,1 mg bütil hidroksitoluen içerir. Bütil hidroksitoluen lokal deri reaksiyonlarına (örneğin, kontak dermatite) ya da gözlerde ve mukoz membranlarda iritasyona neden olabilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

EXCİDERM LİPO'nun herhangi bir ilaç ile etkileşimde bulunduğu dair bir kanıt yoktur.

EXCIPIAL LIPO, deri üzerine uygulanan diğer ilaçların deriden geçişini artırabilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. EXCİDERM LİPO nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/ uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktorunuzca başka türlü önerilmediği takdirde günde 2-3 kez hastalıklı bölge üzerine sürülerek kullanılır.

Uygulama yolu ve metodu:

Deri üzerine sürülerek uygulanır.



Değişik yaş grupları:**Çocuklarda kullanım:**

EXCİDERM LİPO 1 yaşın üzerindeki küçük çocuklarda kullanılabilir.
Süt çocuklarında kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda kullanım:

EXCİDERM LİPO'nun yaşlılarda kullanımı incelenmemiştir,

Özel kullanım durumları:

Özel kullanımı yoktur.

Eğer EXCİDERM LİPO'nun etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden fazla EXCİDERM LİPO kullandıysanız:

EXCİDERM LİPO gereken miktardan daha fazla kullanılırsa, deride tahrişe yol açabilir, fakat bunun dışında başka etkiler beklenmemektedir. EXCİDERM LİPO'nun fazla miktarda yutulması durumunda, bulantı ve kusma gibi gastrointestinal iritasyonlar meydana gelebilir.

Bu durumda, belirtilere yönelik ve destekleyici tedavi verilmelidir. Ağızdan su ya da süt içirilmesi faydalı olabilir.

EXCİDERM LİPO'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

EXCİDERM LİPO'yu kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

EXCİDERM LİPO ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Bulunmamaktadır.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi EXCİDERM LİPO'nun içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

- Kaşıntı
- Kızarıklık
- Pullanma
- Tahriş

Bunlar EXCİDERM LİPO'nun hafif yan etkileridir ve çok seyrek görülür. Tedaviyi hemen kesip doktorunuza danışınız.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu, hemşirenizi veya eczacınızı bilgilendiriniz.



Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz; eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5. EXCİDERM LİPO’nun saklanması

EXCİDERM LİPO’yu çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra EXCİDERM LİPO’yu kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat Sahibi : SGA Sağlık Hiz. Dan. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Şişli / İstanbul

Üretim Yeri : Pharma Plant İlaç San ve Tic A.Ş.
Kadıköy / İstanbul

Bu kullanma talimatı 20.11.2025 tarihinde onaylanmıştır.

