

KULLANMA TALİMATI

Magnimax 365 mg efervesan granül içeren saşe

Ağız yolu ile alınır.

- **Etkin madde:** Her bir saşe 365 mg magnezyum iyonuna eşdeğer; 670 mg magnezyum karbonat ve 342 mg magnezyum oksit içerir.
- **Yardımcı maddeler:** Sitrik asit susuz, sodyum karbonat susuz, sodyum bikarbonat, potasyum bikarbonat, sodyum siklamat, sodyum sakarin, PVP K-30, portakal aroması.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

Bu Kullanma Talimatında:

- 1. MAGNİMAX nedir ve ne için kullanılır?**
- 2. MAGNİMAX'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
- 3. MAGNİMAX nasıl kullanılır?**
- 4. Olası yan etkiler nelerdir?**
- 5. MAGNİMAX 'ın saklanması**

Başlıkları yer almaktadır.

1. MAGNİMAX nedir ve ne için kullanılır?

MAGNİMAX saşe etkin madde olarak magnezyum karbonat ve magnezyum oksit içerir. Magnezyum, mineral destek ürünleri olarak isimlendirilen ilaç grubuna dahildir.

MAGNİMAX içerisinde 30 saşe PET/Al/PE Film ambalajda ambalajlanmıştır. MAGNİMAX,

- Magnezyum eksikliğinde ortaya çıkan semptomların giderilmesi,
 - Kalp ve damar sisteminde: Kalp atımının hızlanması, kalp atım düzensizliği, kalp krizi, anjina pectoris (kalbi besleyen damarların daralması/tıkanması ile ortaya çıkan göğüs ağrısı), hafif şiddette yüksek tansiyon,
 - Sinir ve kaslar: Kaslarda ani ve aşırı kasılmalar (tetani), kaslarda kramp oluşumu, mide-barsak krampları, kas ve sinirlerin artmış uyarılabilirliği, baldır krampları, yeni doğmuş ve küçük çocuklardaki kramplı durumlar ve stres,
 - Kadın hastalıkları, doğum ve gebelik ile ilgili: Zamanından önce (pre-term) kasılmalar, rahim ağzı yetmezliği, erken zar yırtılması, gebelikte kasılmalar (eklampsi [gebelikte havale nöbetleri, kan basıncı artışı, idrarda protein bulunması ve vücudun su tutmasıyla seyreden hastalık]/pre-eklampsi [gebelikte kan basıncı artışı, idrarda protein bulunması ve vücudun su tutmasıyla seyreden hastalık]), betamimetik kullanımını gerektiren tokolizis (döl yatağı kasılmalarının durdurulması), ağrılı adet görme,
 - Ortopedi: Kireçlenme ve kemikleşmeler,
 - Böbrek taşı oluşumunun önlenmesi (kalsiyum oksalat ürolityazı tekrarının önlenmesi),
 - Şeker hastalığı tedavisi ve migren (bir çeşit baş ağrısı)
- durumlarının tedavisinde kullanılır.

2. MAGNİMAX 'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

MAGNİMAX 'ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

- Eğer MAGNİMAX'ın içeriğindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz varsa,
- Eğer ciddi böbrek bozukluğunuz veya yetmezliğiniz varsa,

MAGNİMAX 'ı, aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer:

- Ciddi böbrek yetmezliğiniz varsa ilacı kullanmadan önce doktorunuza bildiriniz.
- Kalp yetmezliğinde kullanılan Digital grubu ilaçlardan kullanıyorsanız,
- Heyecan bozukluğuna bağlı olarak gelişen duygu değişikliği ve depresyon hallerinin

kontrol   i in Lityum tedavisi g r yorsanız,

- Magnezyum seviyeleriniz 1,5 mEq/L'nin altında ise,
- Orta ya ın  st ndeki hastalarda, hastalık veya ila  kullanımına ba lı olarak ishale sebep olabilir. İshal olu umu halinde doktorunuzu bilgilendiriniz.

Bu uyarılar ge mi teki herhangi bir d nemde dahi olsa sizin i in ge erliyse l tfen doktorunuza danı ınız.

MAGNİMAX 'ın yiyecek ve i ecek ile kullanılması

MAGNİMAX, yemeklerle birlikte alınmalıdır. A  karnına kullanmak ishale neden olabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan  nce doktorunuza veya eczacınıza danı ınız.

MAGNİMAX'ı hamilelik d neminde doktorunuza danı madan kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile oldu unuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danı ınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan  nce doktorunuza veya eczacınıza danı ınız.

MAGNİMAX'ı, emzirme d neminde doktorunuza danı madan kullanmayınız.

Ara  ve makine kullanımı

MAGNİMAX 'ın ara  ve makine kullanmaya kar ı olumsuz bir etkisi yoktur.

MAGNİMAX 'ın i eri inde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında  nemli bilgiler

Bir sa e 31,6 mg (1,38 mmol) sodyum iyonu i erir. Bu durum, kontroll  sodyum diyetinde olan hastalar i in g z  n nde bulundurulmalıdır.

Di er ila larla birlikte kullanımı

Di er ila lar MAGNİMAX ile tedaviyi etkileyebilir. A a ıdaki ila lardan herhangi birini kullanıyorsanız mutlaka doktorunuza bildiriniz:

- Kas gev etici ila lar (Non-depolarize edici n romusk ler blok rler),

- Aminokinolonlar, nitrofurantoin, penisilamin, tetrasiklinler, florokinolonlar (antibiyotik),
- Digoksin (kalp yetmezliđi tedavisi),
- Lityum (Duygu deđişikliđi ve depresyon hallerinin kontrolü),
- Sodyum polistiren sülfonat (potasyumun vücuttan atılmasını sağlar),
- Selüloz sodyum fosfat (böbrek taşlarını önlemek için kullanılır),
- Magnezyum içeren diđer ilaçlar (Magnezyum enemaları dahil),
- Barbiturat (uykusuzluk tedavisi için kullanılan ilaçlar), opioidler (vücutta morfin gibi etki gösteren maddeler), hipnotikler (uyku verici ler),
- Nifedipin (yüksek tansiyon veya kalp problemlerinde kullanılan ilaçlar)
- Levotiroksin içeren ilaçların magnezyum ile birlikte alındığında emilimi bozulduğundan, iki ilacın en az 2 saat ara verilerek alınması gerekmektedir.

Eđer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı řu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz

3. MAGNİMAX nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktor tarafından başka řekilde tavsiye edilmediđi takdirde;

Yetişkinler ve ergenler (12-17 yař) için önerilen günlük doz 1-2 saşedir.

Hamilelikte ve laktasyon döneminde önerilen günlük doz 1-2 saşedir.

Uygulama yolu ve metodu:

MAGNİMAX, ağızdan kullanım içindir.

1 saşe'yi 75 ml (yarım su bardađı) suda eriterek yemekle birlikte alınız.

Deđişik yař grupları:

Çocuklarda kullanımı:

6-11 yař arası çocuklarda önerilen günlük doz yarım-1 saşedir. 6 yařından küçük çocuklarda doktor kontrolü altında kullanılmalıdır.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlı popülasyonlarda kullanımı üzerine veri bulunmamaktadır.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği:

Ciddi böbrek yetmezliği olan hastalarda MAGNİMAX kullanılmamalıdır.

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer yetmezliği olan hastalar üzerine veri bulunmamaktadır.

Eğer MAGNİMAX 'ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla MAGNİMAX kullandıysanız:

MAGNİMAX'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

MAGNİMAX 'ı kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

MAGNİMAX ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

MAGNİMAX 'ı doktorunuza danışmadan bırakmayınız.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, MAGNİMAX'ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, MAGNİMAX'ı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

- Ciddi alerjik reaksiyon (örn. ağız ve boğazın şişmesi, kaşıntı, döküntü, kızarıklık)
- Solunum depresyonu
- Koma

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Diğer yan etkiler

Çok yaygın:

- Diyare

Yaygın:

- Mental depresyon
- Konfüzyon (bilinç bulanıklığı)
- Koma
- Hipotansiyon
- Kalbin elektriksel etkinliğine ait kayıt (EKG) değişiklikleri
- Solunum depresyonu
- Düşük tansiyon
- Bulantı
- Kusma

Bilinmiyor:

- Alerjik reaksiyon
- Kızarıklık
- Kaşıntı
- Kramp
- Yorgunluk hissi
- Zayıflık

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan "İlaç Yan Etki Bildirimi" ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı

sağlamış olacaksınız.

5. MAGNİMAX'ın saklanması

MAGNİMAX'ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C altındaki oda sıcaklığında ve kuru yerde saklayınız.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra MAGNİMAX 'ı kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz MAGNİMAX'ı kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre,Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat sahibi:

Drogsan İlaçları San. ve Tic. A.Ş.
Oğuzlar Mah. 1370. Sok. No: 7/3
06520 Balgat-ANKARA

Üretim yeri:

Drogsan İlaçları San. ve Tic. A.Ş.
Esenboğa Merkez Mah. Çubuk Cad.
No:31 06760 Çubuk-ANKARA

Bu kullanma talimatı --/--/-- tarihinde onaylanmıştır.