

KULLANMA TALİMATI

KLACİD® 500 mg film kaplı tablet
Ağızdan alınır.

- **Etkin madde:** Her film tablette 500 mg klaritromisin.
- **Yardımcı maddeler:** Kroskarmeloz sodyum, mikrokristalin selüloz, silikon dioksit, povidon, stearik asit, magnezyum stearat, talk, hipromelloz, hidroksipropilselüloz, propilen glikol, sorbitan monooleat, sorbik asit, vanilya, titanyum dioksit, kinolin sarısı (alüminyum lak E104)

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük doz** kullanmayınız.*

Bu Kullanma Talimatında:

1. **KLACİD® film kaplı tablet nedir ve ne için kullanılır?**
2. **KLACİD® film kaplı tablet'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **KLACİD® film kaplı tablet nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **KLACİD® film kaplı tablet'in saklanması**

Başlıkları yer almaktadır.

1. KLACİD® film kaplı tablet nedir ve ne için kullanılır?

KLACİD® film kaplı tabletler, oval şeklinde, açık sarı renkli tabletlerdir. Bir kutuda 14 tablet bulunan ambalaj şeklinde satışa sunulmuştur.

Her bir KLACİD® film kaplı tablet, 500 mg klaritromisin içerir.

KLACİD® film kaplı tablet (klaritromisin) makrolid adı verilen bir gruba ait bir antibiyotiktir. Antibiyotikler enfeksiyonlara neden olan bakterilerin çoğalmasını durdurur.

KLACİD® film kaplı tablet yetişkinlerde ve 12 yaşından büyük çocuklarda çeşitli mikroorganizmaların neden olduğu şu enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde kullanılmak içindir:

- Farenjit (yutak iltihabı), tonsillit (bademcik iltihabı), sinüzit (sinus iltihabı) gibi üst solunum yolu enfeksiyonları,
- Akut ve kronik bronşit, pnömoni (zatürre) gibi alt solunum yolu enfeksiyonları,

- Duyarlı mikroorganizmaların neden olduđu komplike olmayan, çeşitli deri ve yumuşak doku enfeksiyonları.

KLACİD® film kaplı tablet ayrıca aşağıdaki tablolarda da kullanılmaktadır:

- Bazı AIDS (edinilmiş immün yetmezlik sendromu) hastalarındaki, bir mikobakteri türüne (mikobakterium avium kompleksi) bağlı enfeksiyondan korunma amacıyla,
- On iki parmak barsağı ülseri nüksünün azaltılması için, H. Pylori adındaki bakterinin yok edilmesi (eradikasyonu) amacıyla.

2. KLACİD® film kaplı tablet'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

KLACİD® film kaplı tablet'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:

Eğer;

- Klaritromisine, eritromisin veya azitromisin gibi makrolid grubu antibiyotiklere, ayrıca KLACİD® içindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı bilinen alerjiniz varsa,
- Migren (şiddetli baş ağrısı) için ergotamin ya da dihidroergotamin tablet ya da ergotamin inhalasyon ürünü kullanıyorsanız,
- Terfenadin ya da astemizol (saman nezlesi ya da alerji için kullanılır) ya da sisaprid veya domperidon (mide hastalığı için kullanılır) ya da pimozid (bazı psikiyatrik hastalıkların tedavisinde kullanılır) kullanıyorsanız, bu ilaçlarla birlikte kullanılması bazen ciddi kalp ritmi bozukluklarına neden olabilir. Başka bir ilaç kullanmak için doktorunuza danışınız.
- Kalp ritminde ciddi bozukluklara neden olduđu bilinen ilaçlar kullanıyorsanız,
- Kolesterol (kanda bulunan bir yağ tipi) yüksekliği düzeyini düşürmek için kullanılan statin (HMG-CoA redüktaz inhibitörleri) adı verilen ilaçlardan (örn. lovastatin ya da simvastatin) kullanıyorsanız,
- Ağız yoluyla midazolam (sakinleştirici) ilaç kullanıyorsanız,
- Lomitapid içeren bir ilaç kullanıyorsanız,
- Kanınızda potasyum veya magnezyum düzeyi anormal derecede düşükse (hipokalemi veya hipomagnezemi),
- Böbrek hastalığı ile birlikte şiddetli karaciğer hastalığınız varsa,
- Siz veya ailenizde QT uzaması sendromu adı verilen kalp elektrokardiyogramında (EKG, kalbin elektrik kaydı) anormallik ya da kalp ritmi bozukluğu (Torsades de Pointes dahil ventriküler kardiyak aritmi) öyküsü varsa,
- Tikagrelor, ivabradin ya da ranolazin (kalp krizi, anjina ve göğüs ağrısı tedavisinde kullanılır) kullanıyorsanız
- Kolşisin (gut tedavisinde kullanılır) kullanıyorsanız.
- Torsade de Pointes riski sebebiyle ivabradin içeren ilaç kullanıyorsanız.

KLACİD® film kaplı tablet'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:

Eğer;

- Kalp hastalığınız varsa (örneğin kalp yetmezliği, kalp atım sayısının normalden düşük olması ya da kanda magnezyum düzeyinin düşük olması),
- Karaciğer ya da böbrek hastalığınız varsa,
- Mantar enfeksiyonunuz (örneğin pamukçuk) varsa veya yatkınlığınız varsa,
- Hamile iseniz ya da emziriyorsanız.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Uyarılar ve önlemler

Kalp hastalığınız varsa, özellikle bu ilacı kullanmadan önce doktorunuzu ve eczacınızı bilgilendiriniz.

Önemli uyarı!

KLACİD® film kaplı tabletler dahil olmak üzere antibakteriyel ilaçlar, ya da diğer adıyla antibiyotikler, sadece bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde kullanılmalıdır. Bu ilaçlar, örneğin soğuk algınlığı gibi, virüslerin neden olduğu enfeksiyonları tedavi etmezler. KLACİD® film kaplı tabletler bir bakteriyel enfeksiyonun tedavisi için reçete edildiğinde, hastaların tedavi başlangıcında kendilerini iyi hissetmeleri çok normaldir, ancak buna aldanarak ilaç erken dönemde kesilmemeli, mutlaka doktor tarafından belirtilen süre tamamlanmalıdır. Dozların atlanması ve tedavi süresinin tamamlanmaması, mevcut tedavinin etkinliğini azaltır ve bakterinin direnç kazanma olasılığını artırarak, gelecekte KLACİD® film kaplı tabletler veya başka antibakteriyel ilaçlarla tedavi edilebilirliğini ortadan kaldırır.

KLACİD® film kaplı tablet'in yiyecek ve içecek ile kullanılması:

KLACİD® film kaplı tablet aç ya da tok karına alınabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Klaritromisinin hamilelik sırasında kullanımının güvenliliği saptanmamıştır. Bu nedenle, hamileyseniz, hamile olduğunuzu düşünüyorsanız ya da hamilelik planlıyorsanız KLACİD® kullanmadan önce doktor eczacınıza danışınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu farkederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Klaritromisinin emzirilen bebeklerdeki güvenilirliği saptanmamıştır. KLACİD® anne sütüne küçük miktarlarda geçer.

Araç ve makine kullanımı

KLACİD® baş dönmesi ve sersemlik yapabilir. Bunlar sizde ortaya çıkarsa araç veya makine kullanmayınız ya da dikkat gerektiren işler yapmayınız.

KLACİD® film kaplı tablet'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün her “doz”unda 1 mmol (23mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani aslında “sodyum içermez”.

Bu ürün bir azo boyar madde olan kinolin sarısı (Aluminyum Lake E104) içerdiğinden alerjik reaksiyonlara neden olabilir.

Bu ürün propilen glikol içermektedir. Günlük maksimum tek doz kullanımına dayalı propilen glikoz maruziyeti örneği olarak; 1000 mg gibi yüksek dozda klaritromisin alan 70 kg bir hastanın maruz kaldığı propilen glikol miktarı 0,418 mg/kg/gün’dür.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı:

Aşağıdaki ilaçlardan birini alıyorsanız, dozu değiştirmeniz ve/veya başka önlemler almanız gerekebilir, doktorunuza ya da eczacınıza söyleyiniz.

- digoksin, kinidin ya da disopiramid (kalp hastalıkları tedavisinde kullanılır)
- ibrutinib (kanser tedavisinde kullanılır)
- varfarin veya dabigatran, rivaroksaban, apiksaban, edoksaban gibi başka herhangi bir antikoagülan (kan sulandırıcı olarak kullanılır)
- karbamazepin, valproat, fenobarbital ya da fenitoin (epilepsi-sara hastalığı tedavisinde kullanılır)
- atorvastatin, rosuvastatin (HMG-CoA redüktaz inhibitörleri, statinler olarak bilinir ve kandaki kolesterol (bir yağ tipi) düzeyini düşürmek için kullanılır). Statinler rabdomiyolize (kas dokusunun yıkımına neden olup böbrek hasarına yol açabilen bir durum) ve miyopati (kas ağrısı ya da kas güçsüzlüğü) belirtilerine neden olabileceğinden izlem gerekir.
- nateglinid, pioglitazon, repaglinid, rosiglitazon ya da insülin (kan şekeri düzeyini düşürmek için kullanılır)
- gliklazid ya da glimepirid (tip II diyabet (şeker hastalığı) tedavisinde kullanılan sülfonilüreler)
- teofilin (astım gibi solunum güçlüğü olan hastalarda kullanılır)
- triazolam, alprazolam ya da intravenöz (damar içi) ya da oromukozal (ağızdan ya da deriden) midazolam (sakinleştiriciler)
- silostazol (dolaşım bozukluğunda kullanılır)
- metadon (opioid bağımlılığının tedavisinde kullanılır)
- vinblastin (kanser tedavisinde kullanılır)
- siklosporin, sirolimus ve takrolimus (bağışıklık sistemini baskılamak için kullanılır)
- etravirin, efavirenz, nevirapin, ritonavir, zidovudin, atazanavir, saquinavir (HIV tedavisinde kullanılan antiviral(virüslere karşı ilaçlar)
- rifabutin, rifampisin, rifapentin, flukonazol, itrakonazol (bazı bakteriyel iltihaplanmaların tedavisinde kullanılır)
- tolterodin (aşırı aktif idrar kesesi tedavisinde kullanılır)
- verapamil, amlodipin, diltiazem (yüksek tansiyon tedavisinde kullanılır)
- sildenafil, vardenafil ve tadalafil (yetişkin erkeklerde impotans ya da pulmoner arteriyel hipertansiyon-akciğer kan damarlarında kan basıncı yüksekliği- tedavisinde kullanılır)
- St. John's Wort (sarı kantaron) (depresyon tedavisinde kullanılan bitkisel bir ürün)
- ketiapin ya da diğer antipsikotik ilaçlar (ruh ve sinir hastalıklarının tedavisinde kullanılır)
- diğer makrolid ilaçlar
- linkomisin ve klindamisin (linkozamidler – bir antibiyotik türü)
- hidroklorokin veya klorokin (romatoid artrit dahil durumların tedavisinde veya sıtmayı tedavi etmek veya önlemek için kullanılır). KLACİD'i bu ilaçlarla aynı zamanda almak, kalbinizi etkileyen yan etkilere yakalanma olasılığınızı artırabilir.
- Ağız yoluyla alınan, enjeksiyon yoluyla veya inhale olarak verilen kortikosteroidler (vücudun bağışıklık sistemini baskılamaya yardımcı olmak için kullanılır – bu baskılama geniş kapsamlı durumları tedavi ederken faydalıdır).

Doğum kontrol ilacı kullanıyorsanız ishal, kusma veya ani kanama yaşadığınız takdirde lütfen doktorunuza danışınız, kondom gibi ilave korunma önlemleri almanız gerekebilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. KLACİD® film kaplı tablet nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Her zaman KLACİD® film kaplı tableti doktorunuzun söylediği gibi kullanınız. Eğer KLACİD® film kaplı tableti nasıl almanız gerektiği konusunda emin değilseniz doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Göğüs enfeksiyonları, boğaz ya da sinüs enfeksiyonları ve deri/yumuşak doku enfeksiyonları:

KLACİD® film kaplı tabletin yetişkinler ve 12 yaşından büyük çocuklar için önerilen olağan dozu, 6 – 14 gün süreyle günde iki kez (bir tablet sabah ve bir tablet akşam) 250 mg'dır. Şiddetli enfeksiyonlarda doktorunuz dozu günde iki kez 500 mg olacak şekilde yükseltebilir.

Duedonal ülser ile ilişkili *H.pylori* enfeksiyonu tedavisinde:

Helicobacter pylori tedavisinde KLACİD® film kaplı tabletin bir ya da iki ilaçla birlikte kullanımından oluşan birkaç etkili tedavi kombinasyonu vardır.

Bu kombinasyonlar aşağıda verilmiştir ve genellikle 6 – 14 gün kullanılır:

- a) Günde 2 defa 500 mg KLACİD® film kaplı tablet, günde 2 defa 1000 mg amoksisilin ve günde 2 defa 30 mg lansoprazol ile birlikte
- b) Günde 2 defa 500 mg KLACİD® film kaplı tablet, günde 2 defa 400 mg metronidazol ve günde 2 defa 30 mg lansoprazol ile birlikte uygulanır.
- c) Günde 2 defa 500 mg KLACİD® film kaplı tablet, günde 2 defa 1000 mg amoksisilin ya da günde 2 defa 400 mg metronidazol ve günde 2 defa 40 mg omeprazol ile birlikte uygulanır.
- d) Günde 2 defa 500 mg KLACİD® film kaplı tablet, günde 2 defa 1000 mg amoksisilin ve günde 1 defa 20 mg omeprazol ile birlikte uygulanır.

Kullandığınız tedavi kombinasyonu yukarıdakilerden biraz farklı olabilir. Doktorunuz sizin için en uygun tedavi kombinasyonuna karar verecektir. Hangi tabletleri ve ne kadar süre alacağınızdan emin değilseniz lütfen doktorunuza danışınız.

Uygulama yolu ve metodu:

- KLACİD® film kaplı tabletler sabah ve akşam kullanılır. Her gün aynı saatte yutulmasına özen gösterilmelidir, böylelikle kanınızdaki ilaç miktarı her zaman için sabit ve düzenli olacaktır.
- KLACİD® film kaplı tabletleri ağız yoluyla alınız, en az yarım bardak su ile yutunuz. Tabletleri çiğnemeyiniz, kırmayınız veya ezmeyiniz.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanım:

KLACİD® film kaplı tabletleri 12 yaşından küçük çocuklarda kullanmayınız. Doktorunuz çocuğunuz için uygun başka bir ilaç verecektir.

Yaşlılarda Kullanım:

Yetişkinlerdeki gibidir.

Özel kullanım durumları:**Böbrek yetmezliği:**

Kreatinin klirensi 30 ml/dk'nın altında olan böbrek yetmezliği hastalarında, klaritromisin dozu yarı yarıya azaltılır; yani günde bir kez 250 mg veya daha şiddetli enfeksiyonlarda günde iki kez 250 mg şeklinde uygulanır. Bu hastalarda tedavi 14 günden fazla uzatılmamalıdır.

Karaciğer yetmezliği:

Böbrek bozukluğu ile birlikte şiddetli karaciğer yetmezliği olan hastalarda klaritromisin kullanılmamalıdır.

Eğer KLACİD® film kaplı tablet'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izlemınız var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden fazla KLACİD® film kaplı tablet kullandıysanız:

KLACİD® film kaplı tablet'ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Bir gün içinde yanlışlıkla doktorunuzun size söylediğinden daha fazla KLACİD® film kaplı tablet aldıysanız veya bir çocuk yanlışlıkla bazı tabletleri yutarsa, derhal doktorunuza veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz. KLACİD® film kaplı tabletlerin aşırı dozunun kusmaya ve mide ağrılarına yol açması beklenir.

KLACİD® film kaplı tablet'i kullanmayı unutursanız:

Bir dozu unutursanız, bunu hatırlar hatırlamaz ilacı içiniz. Ancak bir sonraki dozun zamanı gelmişse, unuttuğunuz dozu atlayınız ve her zaman olduğu gibi, günde tek doz kullanmaya devam ediniz.

Unuttuğunuz tek dozu telafi etmek için çift doz almayınız.

KLACİD® film kaplı tablet ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, tedaviyi bırakmayınız.

Tedaviyi bırakırsanız ilacın etkisini kaybedersiniz.

Kendinizi iyi hissetseniz bile tedaviyi bırakmayınız.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, KLACİD® film kaplı tablet'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa KLACİD®'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

- kan ya da yapışkan salgı içerebilen şiddetli ya da uzun süreli ishal. İshal klaritromisin tedavisi ardından iki aydan uzun süre sonra ortaya çıkabilir; bu durumda da doktorunuza danışmalısınız.
- döküntü, nefes darlığı, baygınlık ya da yüz ve boğazda şişlik. Bu alerjik bir reaksiyon gelişme belirtileri olabilir.

- deride sararma (sarılık), deride tahriş, açık renkli dışkı, koyu renkli idrar, karında gerginlik ya da iştahsızlık. Bunlar karaciğerinizin düzgün çalışmamasının belirtileri olabilir.
- deri, ağız, dudaklar, gözler ve genital bölgede su toplama ve soyulma gibi şiddetli deri reaksiyonları (Stevens-Johnson sendromu/toksik epidermal nekroliz adı verilen nadir alerjik reaksiyon belirtileri).
- yüksek ateşin eşlik ettiği tüm vücutta yaygın kırmızı, döküntülü, içi iltihap dolu kabarcıklar (akut generalize ekzantematöz püstüloz). Bu yan etkinin sıklığı bilinmemektedir (eldeki verilerden hareketle tahmin edilememektedir).
- ağız, dudaklar ve deride yaralarla seyreden ateş ve iç organlarda inflamasyona yol açan nadir alerjik deri reaksiyonları (DRESS)
- rabdomiyoliz (kas dokusunun yıkılmasına neden olarak böbrek hasarına yol açabilen bir durum) olarak bilinen kas ağrısı ya da kas güçsüzlüğü

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin KLACİD’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Diğer yan etkiler

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:

Çok yaygın: 10 hastanın en az 1’inde görülebilir.

Yaygın: 10 hastanın 1’inden az, fakat 100 hastanın 1’inden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın 1’inden az, fakat 1.000 hastanın 1’inden fazla görülebilir.

Seyrek: 1.000 hastanın 1’inden az görülebilir.

Çok seyrek: 10.000 hastanın 1’inden az görülebilir.

Sıklığı bilinmeyen: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemeyen

Yaygın

- uyuma güçlüğü
- tat alma duyusunda değişiklikler
- baş ağrısı
- kan damarlarının genişlemesi
- Kendini hasta hissetme, bulantı, kusma, mide ağrısı, hazımsızlık ve ishal gibi mide sorunları
- terleme artışı
- anormal karaciğer fonksiyon testleri
- döküntü
- aşırı terleme (hiperhidroz)

Yaygın olmayan

- yüksek ateş
- deride şişlik, kızarıklık ya da kaşıntı
- ağızda ya da vajinada pamukçuk (mantar enfeksiyonu)
- mide ve bağırsak iltihabı
- kan pulcuklarının sayısında azalma (kan pulcukları kanamanın durdurulmasına yardımcı olur)
- beyaz kan hücreleri sayısında azalma (lökopeni)

- n6trofil sayısında azalma (n6tropeni)
- sertlik
- titreme
- eozinofil sayısında artıř (baęıřıklıkta rol oynayan beyaz kan h6cresi)
- yabancı bir ajana karřı ařırı baęıřıklık yanıtı
- ařırı duyarlılık (hipersensitivite)
- iřtahsızlık ya da iřtah azalması
- endiře, sinirlilik
- sersemlik, yorgunluk, bař d6nmesi ya da titreme
- istemsiz kas hareketleri
- bař d6nmesi (vertigo)
- kulak ınlaması ya da iřitme kaybı
- g6ę6s aęrısı ya da arpıntı ya da d6zensiz kalp atımı gibi kalp ritmi bozuklukları
- astım (hava yollarında daralmaya baęlı geliřen ve nefes almayı g6leřtiren akcięer hastalıęı)
- burun kanaması
- akcięer atar damarında ani tıkanmaya yol aan kan pıhtısı (pulmoner emboli)
- yemek borusu (6zafagus) ve midenin i y6z6nde yangı
- makatta aęrı
- kalp ritim bozuklukları, arpıntı, ekstra atımlar, bayılma, kalp durması, d6zensiz kalp atıřları (elektrokardiyogramda uzamıř QT, palpitasyonlar, ekstrasistoller, kadriyak arrest, atrial fibrilasyon)
- gaz, kabızlık, gerginlik, geęirme
- aęız kuruluęu ve aęız, dil ve dudaklarda iltihap
- kabızlık
- yellenme
- safranın (karacięerde yapılıp safra kesesinde depolanan sıvı) safra kesesinden on iki parmak baęırsaęına atılamaması (kolestaz)
- karacięerde iltihaplanma
- ii su dolu deri, kařıntı ve aęrılı d6k6nt6 ile seyreden deri iltihabı
- kařıntı
- kurdeřen
- kas kasılmaları, kas aęrısı ya da kas dokusu kaybı. ocuęunuz Miyastenia gravis (kaslarda g6s6zl6k ve gevřeklik ile seyreden bir durum) hastasıysa klaritromisin semptomları k6t6leřtirebilir
- b6brek ve karacięer fonksiyonlarını g6steren testlerde y6kselme, kan testlerinde y6kselme
- g6s6z, yorgun ve enerjisiz hissetme

Bilinmiyor

- kalın baęırsak yangısı
- derinin dıř tabakasında bakteri iltihaplanması
- bazı kan h6crelerinin sayısında azalma (iltihap ya da morarma/kanama riski artıřına yol aabilir)
- kanda pıhtılařmaya saęlayan maddelerde azalma
- alerjik reaksiyon
- v6cutta sıvı birikmesine baęlı 6dem

- zihin bulanıklığı, denge kaybı, halüsinasyon (olmayan nesneler görme), gerçeklik duygusu kaybı, panik, ruhsal çökkünlük, anormal rüyalar ya da kabus ve mani (aşırı heyecanlı olma hali)
- kişinin kendinden kopuk hissetmesi
- konvülsiyon (nöbetler)
- karaciğer yetmezliği
- sarılık
- farklı renkte idrar
- pıhtılaşma problemleri
- protrombin zamanında uzama, uluslararası normalleştirilmiş oranı artışı (INR-kanama riskini artıracak kanın pıhtılaşma süresinde uzama)
- parestezi (yaygın olarak ignelenme, karıncalanma olarak bilinir)
- tat ve koku duygusu kaybı ya da düzgün koku alamama
- sağırılık
- kalp ritmi bozuklukları (Torsade de pointes, ventriküler taşikardi)
- kan kaybı (hemoraji)
- pankreas-iltihabı
- dil ve dişlerde renk değişikliği
- karaciğer yetmezliği
- sarılık
- farklı renkte idrar
- sivilce (akne)
- deride istenmeyen yan etkiler
- kas rahatsızlıkları
- böbreklerde yapılan ürünlerin düzeyinde değişiklikler, böbrek yangısı ya da böbreklerin düzgün çalışmaması (yorgunluk, yüzde, karında, kalça ve dizde şişlik ya da idrar yapma)
- Uluslararası normalleştirilmiş oranı artışı

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda, hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonunu tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5. KLACİD® film kaplı tablet’in saklanması

KLACİD® film kaplı tablet’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C altındaki oda sıcaklığında ve kutusunda muhafaza ediniz. Işıktan koruyunuz.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra KLACİD® film kaplı tablet'i kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz KLACİD® film kaplı tablet'i kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat Sahibi: Abbott Laboratuvarları İth. İhr. ve Tic. Ltd. Şti.,
İnkılap Mah., Dr. Adnan Büyükdeniz Cad., No:2,
Kelif Plaza, 34768 Ümraniye –İstanbul

Üretim Yeri: Humanis Sağlık A.Ş.
Karaağaç Mah. Fatih Blv. No:32
ÇOSB-Kapaklı/Tekirdağ

Bu kullanma talimatı tarihinde onaylanmıştır.