

KULLANMA TALİMATI

KWASKAB %1 şampuan

Haricen kullanılır.

- **Etkin madde:** Her 1 mL’inde 10 mg Permetrin içerir.
- **Yardımcı maddeler:** İzopropil alkol, polioksietilen 23 lauril eter (Eumulgin LM 23), lauril dimetilamin oksit (Dehyton PL), setil alkol (Kolliwax CA), polioksietilen 4 lauril eter (Dehydol LS 4 Deo N), sıvı parafin, trietanolamin lauril sülfat (Texapon T42), sitrik asit anhidrat, lavanta yağı, saf su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

Bu Kullanma Talimatında:

1. **KWASKAB nedir ve ne için kullanılır?**
2. **KWASKAB kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **KWASKAB nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **KWASKAB’ın saklanması**

Başlıkları yer almaktadır.

1. KWASKAB nedir ve ne için kullanılır?

KWASKAB, her 1 mL’inde 10 mg permetrin içeren şampandır ve piretrinler olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir.

KWASKAB, berrak sarı renkli likit şeklindedir ve 120 mL formu ile polietilen disk-top kapak ile kapatılmış, 125 mL’lik HDPE şişelerde, polistren tarak ile birlikte, karton kutuda kullanıma sunulmaktadır.

KWASKAB, bit ve bit yumurtalarına karşı etki gösterir ve bu hayvanların sinir sistemlerini etkileyerek öldürür

2. KWASKAB’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

KWASKAB’ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

Permetrin, piretroidler, piretrinler, krizantem veya ilacın bileşiminde bulunan herhangi bir

maddeye karşı aşırı duyarlılığınız (alerji) varsa

KWASKAB'ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

- KWASKAB'ın gözlerinizle temas etmemesine dikkat ediniz. Eğer gözünüze temas ederse gözünüzü bol su ile yıkayınız.
- Eğer çocuğunuza uygulayacaksanız, ağız çevresine sürmemeye dikkat ediniz. Çocuğunuz ilacı yalayabilir.
- Sürekli uyguluyorsanız, ellerinizin tahriş olmaması için eldiven kullanınız.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız

KWASKAB'ın yiyecek ve içecek ile kullanılması

Geçerli değildir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

KWASKAB'ın gebelikte kullanımı ile ilgili bilgi kısıtlıdır. Hayvan testlerinde KWASKAB tedavisini takiben fetüs üzerinde zararlı etki gözlenmemiştir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

KWASKAB'ın insanlarda anne sütüne geçip geçilmediği bilinmemektedir. Ancak teorik olarak çok küçük oranda anne sütüne geçecektir. Bu kadar düşük miktarların yenidoğan/bebek için risk oluşturmaması beklenmez. Ancak emzirme sırasında kullanılması tavsiye edilmez.

Araç ve makine kullanımı

KWASKAB'ın araç ve makine kullanımı üzerine etki etmesi olası değildir.

KWASKAB'ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

KWASKAB içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşırı bir duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

Bu tıbbi ürün içeriğinde alkol bulunmaktadır. Alkol lokal deri reaksiyonlarına (örneğin, kontak dermatite) sebebiyet verebilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Kanıtlanmış bir ilaç etkileşimi bulunmamaktadır.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. KWASKAB nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Uygulama yolu ve metodu:

(Doktor tarafından başka bir şekilde önerilmediği takdirde)

Tek bir şişe KWASKAB Şampuan, omuz hizasında, normal kalınlıkta saç için yeterlidir. Çoğu vakada (%97-99), tek bir uygulama yeterlidir.

Bitlenme tedavisi:

1. Saç normal şampuan ile yıkanır, durulanır ve havlu ile kurutulur.
2. KWASKAB kullanmadan önce iyice çalkalanmalıdır, yeterli miktarda KWASKAB tüm saç, saç dipleri, kulak arkaları ve enseyi tamamen kaplayacak şekilde uygulanmalıdır.
3. KWASKAB Şampuan saçta 10 dakika bekletilir ve saç su ile iyice durulandıktan sonra, havlu ile kurutulur.
4. Kutu içinde sunulan tarak ile saçta yapışmış ölü bit ve bit yumurtaları temizlenir.
5. Permetrin yüzme havuzlarındaki klordan etkilenmez, dolayısı ile kullanımdan sonra normal yüzme etkinlikleri sürdürülebilir. Benzer biçimde, normal şampuanla yıkanma alışkanlığında bir değişiklik yapılmasına gerek yoktur.

Bitlenmeden korunmayla ilgili bilgiler:

1. Tüm aile kontrol edilmelidir.
2. Bir sorunu olan kişinin saçı KWASKAB tıbbi saç kremi ile yıkanmalı ve sonrasında sık dişli bir tarak ile taranmalıdır.
3. Ev ve araba elektrik süpürgesi ile temizlenmelidir.
4. Yıkanamayacak eşyalar bir poşete konup ağzı kapatılarak 2 hafta bekletilmelidir.
5. Bit eşyalar üzerinde uzun süre yaşayabildiği için, sıcak su ile yıkanabilen giysiler (çarşaf, yastık kılıfları vs.) kaynar su ile 20 dakika süre ile yıkanmalıdır.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

KWASKAB 6 aydan küçük çocuklarda kullanılmaz.

Yaşlılarda kullanımı:

Bu hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/ Karaciğer yetmezliği:

Bu hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur.

Eğer KWASKAB'ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla KWASKAB kullandıysanız:

Uzun süreli kullanım sonucu aşırı duyarlılığa bağlı belirtiler ortaya çıkabilir.

KWASKAB'ın çocuklar tarafından yutulmasının ardından izopropanol içeriği nedeniyle alkol zehirlenmesi olasıdır.

Bir şişe içeriğinin bir çocuk tarafından yanlışlıkla içilmesi halinde hemen hekime başvurulmalıdır. Alınmasından sonraki iki saat içinde mide yıkanmalı ve alkol zehirlenmesi tedavisi yapılmalıdır.

KWASKAB'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

KWASKAB'ı kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

KWASKAB ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

Doktorunuz size söylediği sürece kullanınız.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, KWASKAB'ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:

Çok yaygın: 10 hastanın en az birinde görülebilir.

Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinde fazla görülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek: 1.000 hastanın birinden az fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilememektedir.

KWASKAB'ın kullanılması sonucunda aşağıda belirtilen yan etkiler ortaya çıkabilir:

Bilinmiyor

- Ağrı
- Yanma veya batma hissi şeklinde tanımlanan deri rahatsızlığı, eritem, ödem, egzama, kızarıklık ve kaşıntı
- Hissizlik

Eğer bu kullanma talimatında söz edilmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi

(TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5. KWASKAB'ın saklanması

KWASKAB'ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
KWASKAB'ı 25°C'nin altındaki oda sıcaklığında ve ambalajında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra KWASKAB'ı kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz KWASKAB'ı kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat Sahibi:

Argis İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Batı Sitesi Mahallesi 2307. Cad
Gersan Sanayi Sitesi No: 80-82-86
Yenimahalle/Ankara/TÜRKİYE

Üretim Yeri:

Argis İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Batı Sitesi Mahallesi 2307. Cad
Gersan Sanayi Sitesi No: 80-82-86
Yenimahalle/Ankara/TÜRKİYE

Bu kullanma talimatı 08/07/2025 tarihinde onaylanmıştır.