

KULLANMA TALİMATI

BREZTRI AEROSPHERE 5 mcg/9 mcg/160 mcg basınçlı inhalasyon, süspansiyon
Solunum yoluyla uygulanır.

Etkin madde: Her bir püskürtme (verilen doz) 5 mikrogram formoterol fumarat dihidrat, 7.2 mikrogram glikopironyuma eşdeğer 9 mikrogram glikopironyum bromür ve 160 mikrogram budesonid içerir.

Yardımcı maddeler: HFA-134a, 1,2-distearoil-sn-gliserol-3-fosfokolin, kalsiyum klorür dihidrat

▼ Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini sağlayacaktır. Meydana gelen herhangi bir yan etkiyi raporlayarak yardımcı olabilirsiniz. Yan etkilerin nasıl raporlanacağını öğrenmek için 4. Bölümün sonuna bakabilirsiniz.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

Bu Kullanma Talimatında:

1. **BREZTRI AEROSPHERE nedir ve ne için kullanılır?**
2. **BREZTRI AEROSPHERE’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **BREZTRI AEROSPHERE nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **BREZTRI AEROSPHERE’in saklanması**

Başlıkları yer almaktadır.

1. BREZTRI AEROSPHERE nedir ve ne için kullanılır?

BREZTRI AEROSPHERE inhalasyon (solunum) yoluyla kullanılan ve ilacınızı içeren bir inhalerdir. BREZTRI AEROSPHERE gri toz kapaklı sarı plastik püskürtme kabına yerleştirilmiş, doz göstergesi bulunan basınçlı tüp içinde beyaz inhalasyon süspansiyonu içeren bir inhalerdir. BREZTRI AEROSPHERE içinde nem çekici bulunan alüminyum folyo poşette bir adet inhaler içeren ambalajlarda kullanıma sunulmuştur. Her bir inhaler kullanıma hazırlandıktan sonra 120 püskürtme içerir.

BREZTRI AEROSPHERE üç etkin madde içerir: formoterol fumarat dihidrat, glikopironyum ve budesonid.

- Formoterol fumarat dihidrat ve glikopironyum, “bronkodilatörler” adı verilen bir ilaç grubuna aittir. Hava yollarının etrafındaki kasların sıkışmasını önlemek üzere farklı şekillerde etki gösterirler ve havanın akciğerlere girip çıkmasını kolaylaştırırlar.

- Budesonid, “kortikosteroidler” adı verilen bir ilaç grubuna dahildir. Bunlar akciğerlerinizdeki iltihabı azaltarak etki gösterir.

BREZTRI AEROSPHERE, akciğerlerdeki hava yollarının uzun süreli bir hastalığı olan “kronik obstrüktif akciğer hastalığı” (veya “KOA”) olarak adlandırılan bir akciğer hastalığı olan yetişkinler için kullanılan bir inhalerdir.

BREZTRI AEROSPHERE nefes almayı kolaylaştırmak ve nefes darlığı, hırıltı ve öksürük gibi KOA belirtilerini iyileştirmek için kullanılır. BREZTRI AEROSPHERE, KOA alevlenmelerini de önleyebilir.

BREZTRI AEROSPHERE, siz nefes alırken etkin maddeleri akciğerlerinize iletir. Eğer bu ilacı günde iki kez düzenli olarak kullanırsanız, KOA’nın günlük yaşamınız üzerindeki etkilerini azaltmaya yardımcı olacaktır.

2. BREZTRI AEROSPHERE’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

BREZTRI AEROSPHERE’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

- formoterol fumarat dihidrata, glikopironyuma, budesonide veya bu ilacın bileşiminde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz varsa.

BREZTRI AEROSPHERE’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

BREZTRI AEROSPHERE, KOA için uzun süreli bir idame tedavisi olarak kullanılır. **Ani bir nefes darlığı veya hırıltı atağını tedavi etmek için kullanmayınız.**

Ani solunum güçlükleri

BREZTRI AEROSPHERE kullandıktan hemen sonra göğüste sıkışma, öksürük, hırıltılı solunum veya nefes darlığı hissederseniz, **kullanmayı bırakınız ve hemen doktorunuza bildiriniz** (daha fazla bilgi için Bölüm 4’ün üst kısmındaki “Ciddi yan etkiler” bölümüne bakınız).

BREZTRI AEROSPHERE kullanırken nefes darlığı, göğüste sıkışma, hırıltılı solunum veya öksürüğünüz kötüleşiyorsa, BREZTRI AEROSPHERE’i kullanmaya devam etmelisiniz, ancak ek tedaviye ihtiyacınız olabileceğinden mümkün olan en kısa sürede doktorunuzla iletişime geçiniz.

Aşağıdaki durumlardan biri sizin için geçerliyse, BREZTRI AEROSPHERE’i kullanmaya başlamadan önce doktorunuzla veya eczacınızla görüşünüz:

- Yüksek tansiyon veya kalp problemlerinizi varsa
- Şeker hastalığınız varsa
- Akciğer enfeksiyonunuz varsa
- Tiroit bezinizle ilgili sorunlarınız varsa
- Kanınızdaki potasyum seviyesi düşükse
- Prostat problemlerinizi veya idrar yapma probleminizi varsa
- “Dar açılı glokom” adı verilen bir göz probleminizi varsa
- Böbrek veya karaciğer problemlerinizi varsa.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

BREZTRI AEROSPHERE'in yiyecek ve içecek ile kullanılması:

BREZTRI AEROSPHERE solunum yoluyla uygulanır. Bu nedenle yiyecek ve içeceklerle etkileşmesi beklenmemektedir. Bununla birlikte ilacın solunması esnasında yiyecek ve içecek tüketilmesinden kaçınılmalıdır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamileyseniz, hamile olabileceğini düşünüyorsanız veya hamile kalmayı planlıyorsanız, BREZTRI AEROSPHERE'i kullanmadan önce doktorunuzla veya eczacınızla konuşunuz.

Hamileyseniz, doktorunuz aksini söylemedikçe BREZTRI AEROSPHERE'i kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emziriyorsanız BREZTRI AEROSPHERE'i kullanmadan önce doktorunuzla görüşünüz.

Araç ve makine kullanımı

BREZTRI AEROSPHERE'in araç veya makine kullanma yeteneğinizi etkilemesi olası değildir. Bununla birlikte sersemlik hali, araç veya makine kullanırken dikkate alınması gereken yaygın olmayan bir yan etkidir.

BREZTRI AEROSPHERE'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

BREZTRI AEROSPHERE'in içeriğinde özel uyarı gerektiren herhangi bir yardımcı madde bulunmamaktadır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Başka ilaçlar alıyorsanız, yakın zamanda aldıysanız veya alma ihtimaliniz varsa doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz. Buna reçetesiz alınan ilaçlar ve bitkisel ilaçlar da dahildir. Bunun nedeni, BREZTRI AEROSPHERE'in bazı ilaçların etki gösterme şeklini etkileyebilmesidir. Ayrıca bazı ilaçlar BREZTRI AEROSPHERE'in etki gösterme şeklini etkileyebilir veya yan etkiler yaşamamanızı daha olası hale getirebilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini alıyorsanız doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz:

- yüksek tansiyon veya kalp sorunları için veya glokom tedavisinde kullanılabilen (örneğin timolol gibi) beta blokerler (atenolol veya propranolol gibi) adı verilen ilaçlar
- mantar enfeksiyonlarını tedavi etmek için kullanılan ilaçlar – örneğin ketokonazol veya itrakonazol gibi
- HIV enfeksiyonunu tedavi etmek için kullanılan ilaçlar – örneğin ritonavir veya kobisistat gibi
- kanınızdaki potasyum miktarını azaltan ilaçlar, örneğin:
 - ağız yoluyla aldığınız kortikosteroidler (prednizolon gibi),
 - diüretikler - yüksek tansiyon tedavisinde kullanılabilen idrar üretimini artıran ilaçlar (furosemid veya hidroklorotiazid gibi),

- Solunum problemlerini tedavi etmek için kullanılan, “metilksantinler” olarak adlandırılan bazı ilaçlar (teofilin gibi),
- tiotropiyum, ipratropiyum, aklidinyum, umeklidinyum veya salmeterol, arformoterol, vilanterol, olodaterol veya indakaterol gibi BREZTRI AEROSPHERE ile aynı şekilde etki gösteren ilaçlar. Bu ilaçları zaten kullanıyorsanız BREZTRI AEROSPHERE’i kullanmayınız.
- amiodaron gibi kalp ritmi sorunlarını tedavi etmek için kullanılan ilaçlar
- kalbin bazı elektriksel aktivitesini (“QT aralığı” olarak adlandırılır) değiştirebilen ilaçlar – örnek olarak aşağıdakiler için kullanılan ilaçlar:
 - depresyon (monoamin oksidaz inhibitörleri veya trisiklik antidepresanlar gibi),
 - bakteriyel enfeksiyonlar (eritromisin, klaritromisin veya telitromisin gibi),
 - alerjik reaksiyonlar (anti-histaminler).

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. BREZTRI AEROSPHERE nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Bu ilacı her zaman tam olarak doktorunuzun size söylediği şekilde kullanınız. Eğer emin değilseniz, doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Önerilen doz günde iki kez iki pufur: sabah iki puf ve akşam iki puf.

BREZTRI AEROSPHERE’i her gün,- o sırada KOAH semptomunuz olmasa bile – kullanmanız önemlidir.

Unutmayınız: BREZTRI AEROSPHERE’i kullandıktan sonra daima ağzınızı suyla çalkalayınız. Bu, ağızda kalmış olabilecek ilacı uzaklaştırmak içindir. Bu suyu tükürünüz; yutmayınız.

Uygulama yolu ve metodu:

BREZTRI AEROSPHERE solunum yoluyla kullanım içindir.

Lütfen bu Kullanma Talimatı’nın sonundaki “Kullanım ile İlgili Talimatlar”ı okuyunuz. BREZTRI AEROSPHERE’i nasıl kullanacağınızdan emin değilseniz, doktorunuz veya eczacınız ile iletişime geçiniz.

BREZTRI AEROSPHERE’i bir hava haznesi ile kullanma

Aynı anda hem nefes almak hem de inhalere basmakta zorlanabilirsiniz. Bu olursa, doktorunuz veya eczacınızla konuşunuz. Solunum cihazınızla birlikte bir “hava haznesi” kullanmanız yardımcı olabilir.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

BREZTRI AEROSPHERE 18 yaşın altındaki çocuklarda ve ergenlerde kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlı hastalar için doz ayarlaması yapılması gerekli değildir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği:

BREZTRI AEROSPHERE, hafif ila orta şiddette böbrek yetmezliği olan hastalarda önerilen dozda kullanılabilir. Şiddetli böbrek yetmezliği veya diyaliz gerektiren son dönem böbrek hastalığı olan hastalarda da, ancak beklenen yararın potansiyel riskten fazla olması durumunda, önerilen dozda kullanılabilir.

Karaciğer yetmezliği:

BREZTRI AEROSPHERE, hafif ila orta şiddette karaciğer yetmezliği olan hastalarda önerilen dozda kullanılabilir. Şiddetli karaciğer yetmezliği olan hastalarda da, ancak beklenen yararın potansiyel riskten fazla olması durumunda, önerilen dozda kullanılabilir.

Eğer BREZTRI AEROSPHERE'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla BREZTRI AEROSPHERE kullandıysanız:

Kullanmanız gerekenden daha fazla BREZTRI AEROSPHERE kullandıysanız hemen bir doktor veya eczacı ile konuşunuz. Tıbbi yardıma ihtiyacınız olabilir. Kalbinizin normalden daha hızlı attığını, titrediğinizi, görme ile ilgili sorunlarınız olduğunu, ağzınızın kuruduğunu veya baş ağrınız veya mide bulantınız (kusacak gibi olma) olduğunu fark edebilirsiniz.

BREZTRI AEROSPHERE'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

BREZTRI AEROSPHERE'yi kullanmayı unutursanız:

Bir doz almayı unutursanız, hatırladığınız anda alınız. Bununla birlikte bir sonraki dozunuzun zamanı çok yaklaştıysa, unutulmuş dozu atlayınız. Aynı gün günde iki kez ikiden fazla ilaç almayınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz uygulamayınız.

BREZTRI AEROSPHERE ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

Bu ilaç uzun süreli kullanım içindir. Bu ilacı doktorunuzun size söylediği süre boyunca kullanınız. Sadece kullandığınız sürece etkili olacaktır.

Belirtileriniz kötüleşebileceğinden, kendinizi daha iyi hissetseniz bile, doktorunuz söylemediği sürece bırakmayınız. Tedaviyi durdurmak istiyorsanız, önce doktorunuzla konuşunuz.

Eğer bu ilacın kullanımıyla ilgili başka sorularınız varsa, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, BREZTRI AEROSPHERE in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

Çok yaygın : 10 hastanın en az 1'inde görülebilir.

Yaygın : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan	: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Seyrek	: 1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Çok seyrek	: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
Bilinmiyor	: Eldeki veriler ile belirlenemeyecek kadar az hastada görülebilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, BREZTRI AEROSPHERE'yi kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

- BREZTRI AEROSPHERE'i kullandıktan hemen sonra göğüste sıkışma, öksürük, hırıltılı solunum veya nefes darlığı gibi nefes alma güçlükleri yaşarsanız,
- özellikle ağzınızın çevresinde olmak üzere yüzünüzde şişme (dilinizin veya boğazınızın şişmesi yutmayı zorlaştırabilir),
- solunum güclüğü ile birlikte döküntü veya kurdeşen
- aniden bayılma hissi

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin BREZTRI AEROSPHERE'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Yaygın:

- ağızda pamukçuk (mantar enfeksiyonu). BREZTRI AEROSPHERE kullandıktan hemen sonra ağzınızı suyla çalkalamak bunu önlemeye yardımcı olabilir.
- endişeli hissetme
- uyku zorluğu
- kusacak gibi hissetmek (bulantı)
- baş ağrısı
- öksürük veya ses kısılması
- kas krampları
- kalp atışınızı hissetme (çarpıntı)
- yüksek kan şekeri seviyeleri (testlerde görülür)
- ağrılı ve sık idrara çıkma (idrara yolu enfeksiyonu belirtileri olabilir)
- zatürre (akciğer enfeksiyonu).

BREZTRI AEROSPHERE kullanırken sizde aşağıdakilerden herhangi biri olursa, doktorunuza söyleyiniz; bunlar akciğer enfeksiyonu belirtileri olabilir:

- ateş veya titreme,
- balgam üretiminde artış, balgam renginde değişiklik,
- artan öksürük veya artan solunum güçlükleri.

Yaygın olmayan:

- titreme, sarsılma veya sersemlik hissi
- ağız kuruluğu veya boğazda hafif tahriş
- ciltte morarma

- huzursuz, gergin veya heyecanlı hissetmek
- depresyon
- hızlı kalp atışı veya düzensiz kalp atışı
- göğüs ağrısı veya göğüste sıkışma (angina pectoris)

Çok seyrek:

- davranış değişiklikleri
- böbrek üstü bez üzerinde bir etki

Bilinmiyor:

- bulanık görme
- göz merceğinin bulanıklaşması (katarakt belirtileri)
- gözde artan basınç (glokom)
- özellikle ağzınızın çevresinde olmak üzere yüzünüzde şişme (dilinizin veya boğazınızın şişmesi yutmayı zorlaştırabilir)

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5. BREZTRI AEROSPHERE’in saklanması

BREZTRI AEROSPHERE’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

Tüpün, folyo poşetin ve kartonun üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra BREZTRI AEROSPHERE’yi kullanmayınız.

Son kullanma tarihi belirtilen ayın son gününü ifade etmektedir.

Poşet açıldıktan sonra inhaler 3 ay içinde kullanılmalıdır.

İnhaleleri kapalı poşetin içinde tutunuz; inhaleleri sadece ilk kullanımdan hemen önce kapalı poşetinden çıkarınız. Poşetin açıldığı gün, tarihi inhaler etiketinde bırakılan alana yazınız.

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Kuru bir yerde tutunuz.

En iyi sonuç için, inhaler kullanmadan önce oda sıcaklığında olmalıdır.

Görünüşte boş olsa bile basınçlı kabı kırmayınız, delmeyiniz veya yakmayınız. Isı veya çıplak alev yakınında kullanmayınız veya saklamayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat sahibi:

AstraZeneca İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti.
Şişli / İSTANBUL

Üretim yeri:

AstraZeneca Dunkerque Production
224 Avenue de la Dordogne, 59640, Dunkerque / FRANSA

Bu kullanma talimatı 21/01/2026 tarihinde onaylanmıştır.

Kullanım ile İlgili Talimatlar

BREZTRI AEROSPHERE 5 mcg/9 mcg/160 mcg basınçlı inhalasyon, süspansiyon

Lütfen bu talimatları dikkatlice okuyunuz.

BREZTRI AEROSPHERE (bu kullanma talimatında “inhaler” olarak adlandırılır) daha önce kullandığınız inhalerlerden farklı olabilir.


Önemli bilgi

- Yalnızca solunum yoluyla kullanıma yöneliktir.
- İnhalerinizi kullanıma hazır hale getirerek ilk kullanım için hazırlayınız.
- Sarı püskürtme kabınızı her hafta suyla yıkayınız.
- Sabahları 2 puf ilaç ve akşamları 2 puf ilaç alınız.

İnhalerinizin saklanması

- 30°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Kuru bir yerde tutunuz.
- Banyo gibi nemli ortamlarda saklamayınız.
- İnhalerinizi ve tüm ilaçları çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği bir yerde saklayınız.

İnhalerinizin parçaları



Puf göstergesinin okunması

i Puf göstergesi, bir puf ilaç püskürttüğünüz her seferde 1'er rakam geri gidecektir.

İbre


Kalan puf sayısını gösterir.

Sarı bölge

İbre sarı bölgedeyken yeni bir inhaler sipariş ediniz.

Kırmızı bölge

İbre kırmızı bölgede 0 üzerinde olduğunda inhalerinizi atınız.



i Tam doz almayacağınız için ibre 0'dayken nefes almaya çalışmayınız.

Yeni bir inhaler sipariş etme

- Puf göstergesi üzerindeki ibre sarı bölgedeyken yeni bir inhaler sipariş ediniz.

İnhalerinizin atılması

Aşağıdaki durumlarda inhalerinizi yerel yönergeleri izleyerek atınız:



- puf göstergesi 0'ı gösteriyordur veya
- inhalerinizi folyo poşetten çıkarıldıktan sonra 3 ay geçmiştir.

Püskürtme kabını yeniden kullanmayınız veya diğer inhalerlerin ilaç kutuları ile kullanmayınız.

Kutuyu delmeyiniz veya ateşe veya yakma fırınına atmayınız.

İLK KULLANIMDAN ÖNCE – İlk kullanımdan önce inhalerinizi 4 kez boş çalıştırınız.

- Kullandığınız zaman doğru miktarda ilaç alabilmeniz için inhalerinizi ilk kez kullanmadan önce hazırlayınız.


Hazırlama 1	
Ağızlık kapağını çıkarınız.	
	
Hazırlama 2	
İnhaleri iyice çalkalayınız ve sizden uzağa bakacak şekilde 1 test pufunu havaya püskürtünüz. Her test pufundan önce sallayarak toplam 4 test pufu edecek şekilde tekrarlayınız.	
Toplam 4 kere Çalkalama ve test pufu	
i Hazırlama aşaması için ekstra pufur sağlanmıştır. Hazırlama aşamalarını atlamayınız.	


i İnhalerinizi aşağıdaki durumlarda yeniden hazırlayınız:	Yeniden hazırlamak için 2 test pufu püskürtünüz, her test pufundan önce çalkalayınız.
• Püskürtme kabını duruladıktan sonra düşürülürse • 7 günden fazla kullanılmamışsa	Toplam 2 kere Çalkalama ve test pufu

GÜNLÜK KULLANIM, sabah ve akşam – İlacınızı soluyunuz

- **Günlük Doz: Sabah 2 puf ve akşam 2 puf.**
- Mantar enfeksiyonunu önlemek için 2 nefesten sonra ağzınızı suyla çalkalayınız.

Adım 1
Ağızlık kapağını çıkarınız. Ağızlığı yabancı maddeler açısından kontrol ediniz ve kullanmadan önce nesne varsa çıkarınız.






				
Adım 2				
Her puftan önce inhalasyon cihazını iyice çalkalayınız.	Nefesinizi tamamen veriniz.	Ağızlığı ağzınıza yerleştiriniz ve ağızlığın çevresini dudaklarınızla kapatınız. Dilinizi ağızlığın altında tutarak başınızı geriye doğru eğiniz.	1 puf püskürterek derin ve yavaş bir şekilde nefes almaya başlayınız. Artık çekemeyecek hale gelene kadar nefesinizi çekmeye devam ediniz.	Nefesinizi 10 saniyeye kadar tutabildiğiniz kadar tutunuz.
				

Adım 3	Adım 4	Adım 5
İkinci bir puf için Adım 2'yi tekrarlayınız.	Ağızlığın kapağını geri takınız. 	Ağzınızı suyla çalkalayınız. Suyu tükürünüz. Yutmayınız. 

HAFTALIK YIKAMA – Püskürtme kabınızı haftada bir kez suyla yıkayınız.

- İlacın birikmemesi ve ağızlıkta spreyi engellememesi için **sarı püskürtme kabını haftada bir suyla yıkayınız.**
- Kutunun ıslanmasına izin vermeyiniz.
- Duruladıktan sonra tekrar kullanıma hazırlayınız.

Yıkama 1	Yıkama 2
Kutuyu çıkarınız ve bir kenara koyunuz. Kutunun ıslanmasına izin vermeyiniz.	Ağızlığın kapağını çıkarınız.

	
Yıkama 3 Ağızlıktan 30 saniye boyunca ve ardından püskürtme kabının üzerinden 30 saniye boyunca ılık su akıtınız. Toplamda 60 saniye yıkayınız.   ➔  	Yıkama 4 Mümkün olduğu kadar çok suyu sallayarak uzaklaştırınız.  Havlu veya kâğıt havlu ile kurutmayınız.
Yıkama 5 İlaç birikmesi olup olmadığını görmek için püskürtme kabına ve ağızlığına bakınız. Birikme varsa, Yıkama 3'ten 5'e kadar olan adımları tekrarlayınız.  	Yıkama 6 Tercihen gece boyunca kurumaya bırakınız. Kutu hala ıslaksa püskürtme kabına geri koymayınız.   
Yıkama 7 Kurduğunda, önce ağızlık kapağını geri takınız ve ardından kutuyu yavaşça püskürtme kabının içine doğru bastırınız. 	Yıkama 8 İki test pufu püskürterek inhalasyon cihazını yeniden hazırlayınız; her bir test pufundan önce çalkalayınız. Toplam 2 kere Çalkalama ve test pufu