

KULLANMA TALİMATI

GENRECTO % 2 krem

Cilt üzerine uygulanır.

- **Etkin madde:** Her 1 g krem, 0,02 gram diltiazem hidroklorür içerir.
- **Yardımcı maddeler:** Propilen glikol, setostearil alkol, sıvı parafin, setomakrogol 1000, gliserol monostearat, fenoksietanol, saf su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

Bu kullanma talimatında:

1. **GENRECTO nedir ve ne için kullanılır?**
2. **GENRECTO'yu kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **GENRECTO nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **GENRECTO'nun saklanması**

Başlıkları yer almaktadır.

1. GENRECTO nedir ve ne için kullanılır?

GENRECTO, 30 g'lık tüplerde sunulan bir ilaç olup, etkin madde olarak bir kalsiyum kanal blokörü olan benzodiazepin türevi diltiazem hidroklorür içerir.

GENRECTO, beyaz renkli kremdir.

GENRECTO makat bölgesinde (anüs) kaşıntı, ağrı veya kanamaya neden olan küçük sıyrıkların, yırtıkların (anal fissürler) bölgesel tedavisinde kullanılır.

2. GENRECTO kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

GENRECTO'yu aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

- Etkin madde veya formüldeki yardımcı maddelerden herhangi birine alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) varsa bu ilacı kullanmayınız.



- Düşük tansiyonunuz, hasta sinüs sendromunuz, şiddetli kalp atımının azalması, kalp blokları, sol ventrikül yetmezliği/konjestif kalp yetmezliği, pulmoner yetmezliğiniz veya stabil olmayan angina pectoris (kalbi besleyen damarların daralması/tıkanması ile ortaya çıkan göğüs ağrısı) hastalığınız varsa bu ilacı kullanmayınız.
- İlacın kullanımından sonra herhangi bir kardiyovasküler yan etki ortaya çıkarsa veya mevcut bir kardiyovasküler semptom kötüleşirse hemen ilaç kesilmelidir.

GENRECTO'yu aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

- Ağızdan diltiazem kullanıldığında dikkatli kullanılması gereken ilaçlarla (beta-blokörler (kalp hastalıklarında kullanılan ilaçlar), dijital preparatları (kalp yetmezliğinde kullanılan ilaçlar), simetidin (mide ülserleri gibi fazla asidin sebep olduğu durumların tedavisinde kullanılan bir ilaç), karbamazepin (sara hastalığı için kullanılan bir ilaç), lityum (akıl sağlığı ile ilgili problemler için kullanılan bir ilaç), nitratlar (kalp hastalıklarında kullanılan ilaçlar), anestezipler (narkoz için kullanılan ilaçlar) ve diğer kalsiyum kanal blokörleri (kan basıncını düşürmek için kullanılan ilaçlar)) birlikte kullandığınız zaman dikkatli kullanınız.
- Gözlerinize, burnunuza ve ağız boşluğunuza temas ettiği takdirde, ilgili bölgeyi bol su ile yıkayınız.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

GENRECTO'nun yiyecek ve içecek ile kullanılması

GENRECTO'nun yiyecek ve içecek etkileşimi bildirilmemiştir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Gebe iseniz veya gebelik planlıyorsanız doktorunuza mutlaka söyleyiniz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Ağızdan kullanılan diltiazemin anne sütüne geçtiği bilinmektedir. Bu nedenle emzirme döneminde diltiazem kremi kullanmayınız.

Araç ve makine kullanımı

GENRECTO'nun araç ve makine kullanma yeteneği üzerine bilinen herhangi bir etkisi yoktur.

GENRECTO'nun içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

GENRECTO, bir tüpünde 9 g propilen glikol ihtiva eder. Propilen glikol cildinizde irritasyonlara (tahriş) sebep olabilir.



GENRECTO bir t p nde 1,2 g setostearil alkol ihtiva eder. Setostearil alkol b lgesel deri irritasyonlarına (tahriř) sebep olabilir.

Dięer ilalar ile birlikte kullanımı

Haricen diltiazem kullanıldıęı durumlarda etkileřim beklenmez fakat dahilen diltiazem kullanıldıęı zaman, etkileřim beklenen ilalarla kullanıldıęı durumlarda dikkatli olmalısınız. Bu ilalar;

- Beta-blok rler (kalp hastalıklarında kullanılır),
- Dijital preparatları (kalp yetmezlięinde kullanılır),
- Simetidin (mide  lserleri gibi fazla asidin sebep olduęu durumların tedavisinde kullanılır),
- Karbamazepin (sara hastalıęı iin kullanılır),
- Lityum (akıl saęlıęı ile ilgili problemler iin kullanılır),
- Nitratlar (kalp hastalıklarında kullanılır),
- Anestezikler (narkoz iin kullanılan ilalar),
- Dięer kalsiyum kanal blok rleri (kan basıncını d ř rmek iin kullanılır)

Eęer reeteli ya da reetesiz herhangi bir ilacı řu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız l tfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. GENRECTO nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklıęı iin talimatlar:

Yaklařık 2-2,5 cm'lik kremi kutu  zerinde yer alan doz  l m izelgesine g re ayarlayıp t pten ıkararak parmaęınıza s r n.

Doktorunuzun s yledięi řekilde kremi an s (makat) iine s r n.

Kremi bu řekilde g nde iki kez (sabah ve akřam) uygulayın.

Doktorunuzun s yledięi s re boyunca tedaviye devam edin. 6 haftadan uzun s re kullanmayınız.

Uygulama yolu ve metodu:

GENRECTO sadece haricen cilt  zerine uygulanır. GENRECTO'yu uygulanacak b lgeye, parmaęınız yardımıyla uygulayınız.

Deęiřik yař grupları :

ocuklarda kullanımı:

GENRECTO'nun ocuklarda kullanımı  nerilmemektedir.

Yařlılarda kullanımı:

Yařınız 65 yařın  zerinde ise; GENRECTO'nun kullanımı konusunda doktorunuza danıřınız.



Özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Böbrek veya karaciğer yetmezliğiniz varsa bu ilacı kullanmadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Eğer GENRECTO'nun etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz varsa doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla GENRECTO kullandıysanız:

GENRECTO sadece haricen kullanım içindir. Diltiazem ilaçlarının ağızdan alınması sonucu doz aşımı gözlenen durumlarda, tıbbi yardım almalısınız.

GENRECTO'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

GENRECTO'yu kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz kullanmayınız.

GENRECTO ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

GENRECTO kullanmayı bıraktığınızda bir etki ile karşılaşılması ile ilgili bir bilgi yoktur.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, GENRECTO'nun içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkilere neden olabilir.

İstenmeyen etkiler aşağıda belirtilen sıklıklara göre sınıflandırılmıştır.

Çok yaygın	:10 hastanın en az 1'inde görülebilir.
Yaygın	:10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan:	100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Seyrek	:1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Çok seyrek	:10.000 hastanın birinden az görülebilir.
Bilinmiyor	:Eldeki verilerden tahmin edilemiyor.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz.

Yaygın

- Baş ağrısı
- Sersemlik
- Ani kalkma ile oluşan baş dönmesi
- Perianal kaşıntı (makatta kaşıntı)
- Yanma
- Makatta kanama



Seyrek

- Temasla ortaya çıkan deri hastalığı (kontakt dermatit)

Bunlar GENRECTO'nun hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız derhal doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan "İlaç Yan Etki Bildirimi" ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5. GENRECTO'nun saklanması

GENRECTO'yu çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

2°C – 8°C arasında buzdolabında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra GENRECTO'yu kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz GENRECTO'yu kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat sahibi: GENVEON İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Maslak-Sarıyer/İSTANBUL

Tel: 0 212 376 65 00

Faks: 0 212 213 53 24

Üretim Yeri: MERKEZ LAB. İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Çekmeköy- İstanbul

Bu kullanma talimatı 16/10/2024 tarihinde onaylanmıştır.

