

KULLANMA TALİMATI

VICKS inhaler 415,4 + 415,4 mg/ 1 g Burun Çubuğu
Burundan soluyarak (inhalasyon yoluyla) kullanılır.

- **Etkin maddeler:** 1 g'da 415,4 mg kafur, 415,4 mg mentol içerir.
- **Yardımcı maddeler:** Sibirya çamı yaprağı yağı, metil salisilat

Bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu ilaç sizin reçetesiz olarak temin edip bir doktor yardımı almadan eczacınızın tavsiyesi ile hafif bir hastalığı tedavi etmeniz içindir. Buna karşın, yine de VICKS inhaler'den en iyi sonuçları alabilmeniz için dikkatli kullanmanız gerekmektedir.

- Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
- Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
- Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
- Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
- Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. **VICKS inhaler nedir ve ne için kullanılır?**
2. **VICKS inhaler'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **VICKS inhaler nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **VICKS inhaler'in saklanması**

Başlıkları yer almaktadır.

1. VICKS inhaler nedir ve ne için kullanılır?

- VICKS inhaler, burundan soluk alınmasını kolaylaştıran eter yağları içeren diğer nazal preparatlar grubundan bir nazal inhalatördür.
- VICKS inhaler, etkin madde olarak 415,4 mg kafur, 415,4 mg mentol, yardımcı madde olarak da sibirya çamı yaprağı yağı ve metil salisilat içermektedir.
- VICKS inhaler, burun tıkanıklığında nefes almayı kolaylaştırmak amacıyla kullanılmaktadır.

2. VICKS inhaler’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

VICKS inhaler’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

- Levomentol, rasemik kafur veya yardımcı bileşenlerden herhangi birine karşı (alerjik) yüksek hassasiyet durumunda kullanılmamalıdır.
- Astım veya solunum yollarındaki başka yüksek hassasiyet durumunda kullanılmamalıdır.
- 9 yaşın altındaki çocuklarda

Şikayetler devam ederse veya kötüleşirse ya da geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

VICKS inhaler’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

VICKS inhaleri kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Göz ile temasından kaçınınız.

VICKS inhaler’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

VICKS inhaler’in yiyecek ve içecek ile kullanılması hakkında bilgi bulunmamaktadır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamilelik döneminde kullanıma ilişkin yeterli klinik bilgi bulunmamaktadır.

Hamileyseniz, hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız veya hamile kalmayı planlıyorsanız, VICKS inhaler’i kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

VICKS inhaler hamilelik döneminde sadece bir doktor veya eczacı tavsiyesiyle kullanılmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme döneminde kullanıma ilişkin yeterli klinik bilgi bulunmamaktadır.

VICKS inhaler emzirme döneminde sadece bir doktor veya eczacı tavsiyesiyle kullanılmalıdır.

Araç ve makine kullanımı

Araç ve makine kullanımı üzerinde bilinen bir etkisi yoktur.

VICKS inhaler’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

VICKS inhaler’in içeriğinde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığınız varsa doktorunuza danışınız.

Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

Başka ilaçlarla etkileşim hakkında bilgi bulunmamaktadır.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza ve eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. VICKS inhaler nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

VICKS inhaler yetişkinlerde ve 9 yaş üzerindeki çocuklarda ihtiyaç duyulduğunda her iki burun deliğine uygulanır.

Şikayetlerin 3-5 gün içinde hafiflememesi durumunda, ciddi bir hastalık riskine karşı doktora başvurmanız önerilmektedir.

Uygulama yolu ve metodu:

VICKS inhaler'i bir burun deliğini kapatarak diğer burun deliğine sokun derin nefes alın, daha sonra aynı işlemi diğer burun deliği için tekrar edin.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

9 yaş altındaki çocuklarda kullanmayınız.

9 yaş üzeri çocuklarda ihtiyaç duyulduğunda her iki burun deliğine uygulanır.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlılarda kullanımına dair özel bir bilgi bulunmamaktadır.

Özel kullanım durumları:

Özel kullanımı yoktur.

Eğer VICKS inhaler'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla VICKS inhaler kullandıysanız:

VICKS inhaler'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

VICKS inhaler'i kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

VICKS inhaler ile tedavi sonlandığındaki oluşabilecek etkiler:

VICKS inhaler tedavisi sonrası herhangi bir etki gözlemlerseniz doktorunuzla veya eczacınızla konuşunuz.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi VICKS inhaler'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

Çok yaygın	:10 hastanın en az 1 inde görülebilir.
Yaygın	:10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan	:100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Seyrek	:1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Çok seyrek	:10.000 hastanın birinden az görülebilir.
Bilinmiyor	:Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Aşağıdakilerden biri olursa VICKS inhaler'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Çok seyrek

- Aşırı duyarlılık reaksiyonları (nefes almada zorluk dahil),
- Alerjik reaksiyonlar,

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

- Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin VICKS inhaler'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz.

Çok seyrek

- Burunda rahatsızlık

Bunlar VICKS inhaler'in hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu ya da eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan "İlaç Yan Etki Bildirimi" ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5. VICKS inhaler'in Saklanması

VICKS inhaler'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajındaki son kullanma tarihinden sonra VICKS inhaler'i kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat sahibi:

Procter & Gamble Tüketim Malları San. A.Ş.

Nidakule Ataşehir Kuzey Sit. C Kapısı Barbaros Mah. Begonya Sok. No:3E 34746

Ataşehir/İstanbul

Üretim yeri:

Procter & Gamble Manufacturing GmbH

Gross Gerau / Almanya

Bu kullanma talimatı tarihinde onaylanmıştır.