

KULLANMA TALİMATI

SYNPİTAN FORTE 5 I.U./ml I.M./I.V. enjeksiyonluk çözelti içeren ampul

Enjeksiyon yoluyla uygulanır.

Steril

- **Etkin madde:** Her bir ampul 1 mL'sinde (toplam hacim) 5 ünite (IU) sentetik oksitosin hormonu çözeltisi içerir.
- **Yardımcı madde(ler):** Klorbutanol, sodyum klorür, asetik asit, distile su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

Bu Kullanma Talimatında:

1. **SYNPİTAN FORTE nedir ve ne için kullanılır?**
2. **SYNPİTAN FORTE'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **SYNPİTAN FORTE nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **SYNPİTAN FORTE'un saklanması**

Başlıkları yer almaktadır.

1. SYNPİTAN FORTE nedir ve ne için kullanılır?

SYNPİTAN FORTE, ampul içerisinde renksiz, karakteristik kokulu berrak çözelti şeklinde sunulan bir üründür. 1 mL'lik 3, 6 ve 50 ampul içeren ambalajlarda sunulur.

SYNPİTAN FORTE, oksitosinden üretilmiş bir form (doğal bir hormon) içermektedir. Oksitosin, rahimdeki düz kasların kasılmasını sağlayan bir hormondur.

SYNPİTAN FORTE aşağıdaki durumlarda kullanılmaktadır:

- Doğum sırasında kasılmaları başlatmak veya yardımcı olmak için
- Planlanmış düşük yönetimine yardımcı olmak için
- Doğumdan sonra kanamayı önlemek veya kontrol etmek için
- Sezaryen sırasında

2. SYNPIŦAN FORTE’u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

SYNPIŦAN FORTE’u ařağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

- Oksitosine ya da yardımcı maddelerden (kullanma talimatı başlığı altında yer alan kısım) herhangi birine karşı alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) varsa
- Doktorunuz rahim kasılmalarını başlatmanın veya arttırmanın sizin için uygun olmadığını düşünüyorsa, örneğin:
 - Rahim kasılmalarının alışılmadık derecede güçlü olduğu durumlarda
 - Doğumu engelleyebilecek durumlarda
 - Bebeğinizin oksijen yetersizliği olabileceğı durumlarda
- Doğum veya vajinal doğumun tavsiye edilmediğı durumlarda, örneğin:
 - Bebeğinizin başı pelvise sığamayacak kadar büyükse
 - Bebeğiniz doğum kanalına yanlış yerleşmişse
 - Plasenta rahim boynuna yakın veya üzerinde ise
 - Rahim boynundan geçen kan damarları nedeniyle bebekte oksijen yoksunluğu olduğu durumlarda
 - Plasenta bebek doğmadan önce rahimden ayrılırsa
 - Bebeğiniz ile rahim boynu arasında, suyunuz gelmeden önce veya sonra, bir veya daha fazla göbek bağı halkası varsa
 - Rahminiz fazla genişlemişse ve yırtılma olasılığı daha yüksekse, örneğin birden fazla bebek taşıyorsanız veya rahminizde çok fazla su (amniyotik sıvı) varsa
 - Geçmişte beş veya daha fazla hamilelik geçirdiyseniz veya rahminiz önceki sezaryen veya başka bir ameliyatla yaralanmışsa
- Size prostaglandinler adı verilen ilaçlar (doğum sancılarını başlatmak veya mide ülserlerini tedavi etmek için kullanılır) verilmişse, her iki ilacın da etkileri artabileceğinden, SYNPIŦAN FORTE vajinal prostaglandinlerden sonra 6 saat kullanılmamalıdır.

SYNPIŦAN FORTE, ařağıdaki durumlarda uzun süre kullanılmamalıdır:

- Tedavi ile kasılmalarınız artmazsa
- Ağır pre-eklamptik toksemi (gebelik zehirlenmesi) olarak bilinen bir durumunuz varsa (yüksek tansiyon, idrarda protein ve şişlik)
- Kalbinizde veya kan dolaşıminızda ciddi sorunlarınız varsa

SYNPIŦAN FORTE’u ařağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

SYNPIŦAN FORTE yalnızca hastane ortamında bir sağlık uzmanı tarafından uygulanmalıdır.

Ařağıdakilerden herhangi biri sizin için geçerli ise SYNPIŦAN FORTE kullanmadan önce doktorunuza veya hemşirenize söyleyiniz:

- Önceden var olan kalp ve/veya dolaşım problemlerinden dolayı göğüs ağrısına yatkınsanız

- Düzensiz kalp atışınız (“uzun QT sendromu”) veya ilgili semptomlarınız varsa veya sendroma neden olduğu bilinen ilaçları alıyorsanız (“Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı” bölümüne bakınız)
- Daha önce sezaryen ameliyatı geçirdiyseniz
- 35 yaşın üzerindeyseniz
- Yüksek tansiyon veya herhangi bir kalp rahatsızlığınız var ise
- Eğer böbreklerinizde sorun varsa (SYNPİTAN FORTE su tutulmasına neden olabilir)
- Hamileliğiniz sırasında rahatsızlığınız olduysa (diyabet, yüksek kan basıncı, tiroid hormonu eksikliği gibi)
- 40 haftadan fazla hamile kaldıysanız

Doğumu başlatmak ve uyarmak için SYNPİTAN FORTE verildiğinde, infüzyon hızı normal doğuma benzer bir kasılma düzenini koruyacak şekilde ve bireysel yanıtı göre ayarlanmalıdır. Çok yüksek dozlar, siz ve bebeğiniz için ciddi komplikasyonlarla birlikte çok güçlü sürekli kasılmalara ve muhtemelen rahmin yırtılmasına neden olabilir.

SYNPİTAN FORTE düşük kan basıncına, ani ve kısa süreli bir ısı hissine (genellikle tüm vücutta) ve kalp atış hızının artmasına neden olabileceğinden, bir damara hızlı enjeksiyon olarak verilmemelidir.

SYNPİTAN FORTE nadiren anormal kan pıhtılaşması, kanama ve anemi gibi yan etkilere neden olan yaygın damar içi pıhtılaşmaya neden olabilir.

Yüksek dozlarda SYNPİTAN FORTE, amniyotik sıvının rahminizden kanınıza geçmesine neden olabilir. Bu amniyotik sıvı embolisi olarak bilinir.

Çok miktarda sıvı alımı ile birlikte, uzun süreler boyunca yüksek dozda SYNPİTAN FORTE uygulaması; midenizde aşırı doluluk hissi, nefes almada güçlük ve kan tuz seviyelerinizde düşüşe neden olabilir.

SYNPİTAN FORTE, oksitosin içeren burun spreyleleriyle aynı anda verilmemelidir.

Lateks alerjisi

SYNPİTAN FORTE’teki aktif madde lateks alerjisi olan hastalarda ciddi bir alerjik reaksiyona (anafilaksi) neden olabilir. Latekse alerjiniz olduğunu biliyorsanız lütfen doktorunuza bildiriniz.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

SYNPİTAN FORTE’un yiyecek ve içecek ile kullanılması

Sıvı tüketiminizi en aza indirmeniz söylenebilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Oksitosin doğum sancılarını başlatabilir. Hamilelikte yalnızca tıbbi gözetim altında kullanılmalıdır.

Geniş kullanım deneyimine ve bu ilacın doğasına dayanarak, SYNPIŖAN FORTE'un doğru kullanıldığında bebeğiniz için bir risk olması beklenmemektedir.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

SYNPIŖAN FORTE düşük miktarlarda anne sütüne geçmektedir. Ancak bebeğinizin sindirim sistemi tarafından hızla etkisiz hale getirileceğı için zararlı etkileri olması beklenmez.

Araç ve makine kullanımı

SYNPIŖAN FORTE doğum sancılarını başlatabileceğinden araç veya makine kullanırken dikkatli olunmalıdır.

SYNPIŖAN FORTE'un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün her bir ampulde 1 mmol (23 mg)'den az sodyum içerir yani aslında "sodyum içermez".

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini alıyorsanız veya yakın zamanda aldıysanız, doktorunuza veya hemşirenize söyleyin, çünkü bu ilaçlar SYNPIŖAN FORTE ile etkileşime girebilir:

- Prostaglandinler (doğum eylemi başlatmak veya mide ülserlerini tedavi etmek için kullanılır) ve benzer ilaçlar, çünkü her iki ilacın da etkileri artabilir.
- Anestezikler (örn. ameliyat sırasında uyutmak için), örneğın halotan, siklopropan, oksitosin ile kullanıldığında kalp atışınızda sorunlara neden olabilir.
- 'Uzamiş QT sendromu' adı verilen kalp ritmi bozukluklarına neden olduğı bilinen ilaçlar.
- Epidural anestezikler (doğum sırasında ağrıyı azaltmak için kullanılır). SYNPIŖAN FORTE, bu ilaçların kan damarlarını daraltma etkisini artırabilir ve kan basıncında artışa neden olabilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı řu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. SYNPIŖAN FORTE nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktorunuz veya hemşireniz durumunuza bağılı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

SYNPİTAN FORTE alırken hem siz hem de bebeğiniz yakından izlenecektir.

Uygulama yolu ve metodu:

SYNPİTAN FORTE genellikle kullanılmadan önce seyreltilir ve damarlarınızdan birine intravenöz infüzyon (damlama) olarak verilir. İntravenöz infüzyon hazırlamak için doktorunuz SYNPİTAN FORTE 5 IU enjeksiyon/infüzyon solüsyonu kullanabilir.

Belirli koşullar altında, 1 mL SYNPİTAN FORTE seyreltilmeden bir kas içine enjekte edilebilir.

Aşağıdaki durumlarda olağan doz farklıdır:

– **Doğum sırasında kasılmalara başlamak veya yardımcı olmak için**

SYNPİTAN FORTE, intravenöz (I.V.) damla infüzyonu olarak veya tercihen değişken hızlı bir infüzyon pompası yoluyla uygulanmalıdır. Damla infüzyonu için, 500 mL fizyolojik elektrolit çözeltisine (%0,9 sodyum klorür gibi) 5 IU SYNPİTAN FORTE ilave edilmesi önerilir. Sodyum klorür infüzyonundan kaçınılması gereken hastalar için seyreltici olarak %5 dekstroz çözeltisi kullanılabilir.

İnfüzyon hızı dakikada 2 ila 8 damladan (dakikada 1 ila 4 miliünite/dakika) başlayacaktır. Bu kademeli olarak dakikada 40 damlalık (dakikada 20 miliünite) bir hıza çıkarılabilir. İnfüzyon hızı, kasılmalar yeterli bir seviyeye ulaştığında, her 10 dakikada bir yaklaşık 3-4 kasılma olduğunda azaltılabilir.

Kasılmalarınız 5 IU'dan sonra yeterli seviyeye ulaşmazsa, doğuma başlama girişimi durdurulmalı ve ertesi gün tekrarlanmalıdır.

– **Düşük/Kürtaj**

Reseptör ekspresyonunun düşük olması nedeniyle, oksitosin kullanımı gebeliğin 14. haftasından itibaren önerilir. Doz, damla infüzyonu (fizyolojik sodyum klorür solüsyonunda seyreltilmiş 1 mL) veya tercihen değişken hızlı infüzyon pompasıyla 5 dakika boyunca damarınıza verilmesi şeklinde verilen 5 IU veya 1 mL SYNPİTAN FORTE 5 IU/mL'dir, gerekirse bunu dakikada 20 ila 40 miliünite hızında I.V. infüzyon izler.

– **Sezaryen**

Doz, bebeğinizin doğumundan sonra 5 dakika boyunca damarınıza damla infüzyonu (5 IU fizyolojik sodyum klorür çözeltisinde seyreltilmiş) veya tercihen değişken hızlı bir infüzyon pompası vasıtasıyla verilen SYNPİTAN FORTE 5 IU'dur.

– **Doğumdan sonra kanamanın önlenmesi**

Genellikle uygulanan doz damar içine infüzyon yoluyla 5 IU (fizyolojik elektrolit solüsyonunda seyreltilmiş 5 IU) veya plasentanin çıkmasından sonra kas içine uygulanan 5-10 IU'dur.

– **Doğumdan sonra kanama tedavisi**

Doz, damara infüzyon yoluyla 5 IU (fizyolojik elektrolit solüsyonunda seyreltilmiş 5 IU) veya kas içine 5-10 IU'dur. Bazı durumlarda bunu, 500 mL fizyolojik elektrolit solüsyonunda 5 ila 20 IU oksitosin içeren bir I.V. damla takip edebilir.

Değişik yaş grupları:

• **Çocuklarda kullanımı:**

SYNPİTAN FORTE, çocuklarda veya ergenlerde kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.

• **Yaşlılarda kullanımı:**

SYNPİTAN FORTE yaşlılarda kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.

Özel kullanım durumları:

• **Böbrek/karaciğer yetmezliği:**

Böbrek veya karaciğer hastalığı olan hastalarda kullanımına ilişkin bilgi bulunmamaktadır.

Eğer SYNPİTAN FORTE'un etkisinin çok güçlü veya çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla SYNPİTAN FORTE kullandıysanız:

Bu ilaç size hastanede verileceğinden, aşırı doz almanız olası değildir.

Kazara herhangi biri SYNPİTAN FORTE alırsa veya kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız derhal doktorunuza bildiriniz ve size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz. Kalan ilaçları veya boş paketi doktora gösteriniz.

Aşırı dozda SYNPİTAN FORTE şunlara neden olabilir:

- Rahminizin çok güçlü kasılmaları
- Yırtılma da dahil olmak üzere rahim hasarı
- Su tutulması, kan damarlarında spazm, yüksek tansiyon.
- Bebeğinize zarar verme.

SYNPİTAN FORTE'u kullanmayı unutursanız

Bir doktor size bu ilacı verdiği için, bir dozu kaçırmmanız olası değildir.

Bu ilacın kullanımıyla ilgili başka sorularınız varsa, doktorunuza veya hemşirenize sorunuz.

SYNPİTAN FORTE ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Doğum ilerledikçe infüzyon kademeli olarak kesilebilir.

İstenmeyen etkilerle ilgili bilgi bulunmamaktadır.

4. Olası yan etkileri nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi SYNPIATAN FORTE'un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıda sıklıklarına göre verilen istenmeyen etkiler şu şekilde derecelendirilmiştir:

Çok yaygın	:10 hastanın en az 1'inde görülebilir.
Yaygın	:10 hastanın 1'inden az, fakat 100 hastanın en az 1'inde görülebilir.
Yaygın olmayan	:100 hastanın 1'inden az, fakat 1.000 hastanın en az 1'inde görülebilir.
Seyrek	:1.000 hastanın 1'inden az, fakat 10.000 hastanın en az 1'inde görülebilir.
Çok seyrek	:10.000 hastanın 1'inden az görülebilir.
Bilinmiyor	:Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor

Aşağıdakilerden biri olursa SYNPIATAN FORTE'u kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

- Nefes almada güçlük, baş dönmesi ve sersemlik, bayılma hissi, mide bulantısı, soğuk ve nemli cilt veya hızlı veya zayıf nabızla birlikte şiddetli alerjik (anafilaktik/anafilaktoid) reaksiyon (seyrek)
- Yüzün, dudakların, dilin, boğazın ve/veya ekstremitelerin şişmesi (olası anjiyoödem belirtileri) (seyrek)

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin SYNPIATAN FORTE'a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

SYNPIATAN FORTE ile aşağıdaki yan etkiler bildirilmiştir.

Diğer yan etkiler:

Yaygın

- Hasta hissetmek veya hasta olmak
- Baş ağrısı
- Hızlı veya yavaş kalp atışı
- Bulantı
- Kusma

Yaygın olmayan

- Düzensiz kalp atışı (aritmî)

Seyrek

- Ciltte kızarıklık, kurdeşen
- Nefes almada zorluk, baş dönmesi ve sersemlik hissi, baygınlık hissi, mide bulantısı, soğuk ve nemli cilt veya hızlı veya zayıf nabız ile birlikte görülen şiddetli alerjik reaksiyon

Bilinmiyor

- Kanama (hemoraj)
- Hipotansiyon
- Göğüs ağrısı (anjina)
- Düzensiz kalp atışı (refleks taşikardi)
- Aşırı veya sürekli kasılmalar
- Rahmin yırtılması
- Sıvı tutulumu (su zehirlenmesi). Semptomlar baş ağrısı, anoreksiya (iştah kaybı), mide bulantısı, kusma, mide ağrısı, halsizlik, uyuşukluk, bilinç kaybı, kandaki bazı kimyasalların düşük seviyelerini (örn. Sodyum veya potasyum) içerebilir.
- Düşük kan tuzu seviyeleri
- Akciğerlerde ani sıvı yüklenmesi
- Hızlı bir intravenöz oksitosin enjeksiyonu, kan basıncında ani ve kısa süreli düşüşe, genellikle tüm vücutta ani ve kısa süreli bir sıcaklık hissine neden olabilir;
- Anormal pıhtılaşma, kanama ve anemi
- Rahim kaslarının spazmı

Bebekteki yan etkiler:

- Aşırı kasılmalar düşük kan tuzu seviyelerine, oksijen eksikliğine, boğulmaya ve ölüme neden olabilir.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5. SYNPIŦAN FORTE’un saklanması

SYNPIŦAN FORTE’u çocukların göremeyeceđi, erişemeyeceđi yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Preparatı 2°C-8°C arasında saklayınız.

Bu ürün ve/veya ambalajı herhangi bir bozukluk içeriyorsa kullanılmamalıdır.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra SYNPIŖAN FORTE’u kullanmayınız.

Eęer ürün ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz SYNPIŖAN FORTE’u kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geęmiř veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre, Şehircilik ve İklim Deęişikliği Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat sahibi:

DEVA Holding A.Ş.

Küçükçekmece/İSTANBUL

Tel: 0 212 692 92 92

Faks: 0 212 697 00 24

E-posta: deva@devaholding.com.tr

Üretim yeri:

Deva Holding A.Ş.

Kapaklı/TEKİRDAĞ

Bu kullanma talimatı .../.../... tarihinde onaylanmıştır.

AŞAĞIDAKİ BİLGİLER BU İLACI UYGULAYACAK OLAN SAĞLIK PERSONELİ İÇİNDİR

Doğum eyleminin indüksiyonu veya arttırılması

Vajinal prostaglandinlerin uygulanmasını takiben 6 saat oksitosin uygulanmamalıdır. SYNPIATAN FORTE, I.V. damla infüzyon olarak veya tercihen değişken hızlı infüzyon pompası aracılığıyla uygulanmalıdır. Damla infüzyon için 500 ml fizyolojik elektrolit solüsyonuna (sodyum klorür %0,9 gibi) 5 IU SYNPIATAN FORTE ilave edilmesi önerilir. Sodyum klorür infüzyonundan kaçınılması gereken hastalarda seyreltici olarak %5 dekstroz solüsyonu kullanılabilir. Eşit karışmayı sağlamak için, kullanmadan önce şişe veya torba birkaç kez çalkalanmalıdır.

İlk infüzyon hızı, 1 ila 4 miliünite/dakika (2 ila 8 damla/dakika) olarak ayarlanmalıdır. Normal doğuma benzer bir kasılma oluşana kadar, 20 dakikadan kısa olmayan aralıklarla ve 1-2 miliünite/dakikadan fazla olmayan artışlarla kademeli olarak arttırılabilir. Yakın dönem hamilelikte bu genellikle 10 miliünite/dakikadan (20 damla/dakika) daha az bir infüzyonla sağlanabilir ve önerilen maksimum hız 20 mililitre/dakikadır (40 damla/dakika).

Damla infüzyonla verilenden daha küçük hacimler sağlayan motorlu infüzyon pompası kullanılırken, önerilen dozaj aralığı içinde infüzyon için uygun konsantrasyon, pompanın özelliklerine göre hesaplanmalıdır.

İnfüzyon boyunca kasılmaların sıklığı, gücü ve süresi ile fetal kalp hızı dikkatle izlenmelidir. Her 10 dakikada bir 3 ila 4 kasılma hedeflenerek yeterli düzeyde uterus aktivitesi elde edildiğinde, infüzyon hızı sıklıkla azaltılabilir. Uterus hiperaktivitesi ve / veya fetal distress durumunda, infüzyon derhal kesilmelidir.

Doğum zamanı gelmiş veya yakın olan kadınlarda, toplam 5 IU infüzyonundan sonra düzenli kasılmalar oluşmazsa, doğum eylemini başlatma girişiminin durdurulması önerilir; ertesi gün tekrar 1 ila 4 miliünite/dakika hızından başlayarak tekrar edilebilir.

Her bir endikasyon için uygulama yöntemi, devamı:

– Tamamlanmamış, kaçınılmaz veya gecikmiş doğum

Reseptör ekspresyonunun düşük olması nedeniyle, oksitosin kullanımı gebeliğin 14. haftasından itibaren önerilir. 5 IU, I.V. infüzyon (5 IU seyreltilmiş fizyolojik elektrolit solüsyonunda ve İ.V. damla infüzyonu olarak veya tercihen değişken hızlı infüzyon pompası ile 5 dakikadan fazla süreyle uygulanır), gerekirse ardından İ.V. 20 ila 40 miliünite / dakika hızında infüzyon ile verilmelidir. Ağrılı uterus kasılmaları meydana gelirse, damlatma hızı azaltılmalı veya infüzyon geçici olarak durdurulmalıdır.

– **Sezaryen**

Doğumdan hemen sonra 5 IU I.V. infüzyonla (5 IU fizyolojik elektrolit solüsyonunda seyreltilmiş ve I.V. damla infüzyon olarak veya tercihen değişken hızlı infüzyon pompası aracılığıyla 5 dakika boyunca uygulanan)

– **Doğum sonrası uterin kanamanın önlenmesi**

Normal doz, I.V. infüzyonla 5 IU (fizyolojik elektrolit solüsyonunda seyreltilmiş 5 IU ve I.V. damla infüzyonu olarak veya tercihen 5 dakika boyunca değişken hızlı infüzyon pompasıyla uygulanır) veya plasentanın çıkarılmasından sonra I.M. olarak 5-10 IU'dur. Doğum eyleminin başlatılması veya arttırılması için SYNPIŖAN FORTE verilen kadınlarda, infüzyon doğumun üçüncü evresinde ve sonraki birkaç saat boyunca artırılmış bir hızda devam ettirilmelidir.

– **Doğum sonrası rahim kanamasının tedavisi**

5 IU I.V.infüzyonla (5 IU seyreltilmiş fizyolojik elektrolit solüsyonunda ve I.V.damla infüzyon olarak veya tercihen değişken hızlı infüzyon pompası aracılığıyla 5 dakikadan fazla) veya I.M. 5-10 IU, ardından ciddi vakalarda I.V.infüzyonu 500 mL elektrolit içeren seyreltici içinde 5 IU ile 20 IU oksitosin, içeren bir solüsyonun uterus atonisini kontrol etmek için gerekli hızda çalıştırınız.

I.V. oksitosin infüzyonu uygulanan bütün hastalar, bu ilaç hakkında geniş bilgiye sahip ve komplikasyonları tanıyabilecek sağlık personelinin gözetimi altında olmalıdır. Herhangi komplikasyon durumunda müdahale edebilecek doktorun bulunmadığı durumlarda oksitosin uygulaması yapılmamalıdır.

SYNPIŖAN FORTE intravenöz (I.V.) infüzyon ve intramusküler (I.M.) enjeksiyon ile uygulanmaktadır.s

I.V. infüzyon, oksitosin ihtiva etmeyen bir çözelti ile başlatılmalıdır. Bazı çok özel haller dışında fizyolojik infüzyon çözeltileri kullanılmalıdır. İnfüzyon şişesi çalkalanarak çözeltilerin iyi karışması sağlanır (10 mIU/mL). Bu çözelti hastaya infüzyon hızı tam olarak kontrol edilerek (örneğin sabit bir infüzyon pompası ile) verilmelidir.