

KULLANMA TALİMATI

KLORHEX PLUS 2,5 mg/mL + 1,2 mg/mL gargara

Ağızda çalkalanarak uygulanır.

- **Etkin madde:** 1 mL gargara solüsyonu, 2,5 mg flurbiprofen ve 1,2 mg klorheksidin diglukonat içerir.
- **Yardımcı maddeler:** Makrogolgliserol hidroksistearat 40, gliserol, sakkarin sodyum, sorbitol sıvı, kristalize olmayan (%70'lik), ecocool MP, patent mavisi V, sodyum hidrojen karbonat, propilen glikol, saf su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

Bu Kullanma Talimatında:

1. **KLORHEX PLUS nedir ve ne için kullanılır?**
2. **KLORHEX PLUS'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **KLORHEX PLUS nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **KLORHEX PLUS'ın saklanması**

Başlıkları yer almaktadır.

1. KLOORHEX PLUS nedir ve ne için kullanılır?

KLOORHEX PLUS, steroid yapıda olmayan (non-steroidal), yangı önleyici ve ağrı kesici bir ilaç olan flurbiprofen ve antiseptik (mikrop öldürücü) etkiye sahip klorheksidin glukonat içermektedir.

KLOORHEX PLUS, 200 mL amber renkli PET şişede, 15 mL ölçek ile birlikte karton kutu ambalajda takdim edilir.

KLOORHEX PLUS aşağıdaki hastalıkların tedavisinde kullanılır;

- Ağız ve boğaz mukozasında iltihap (enflamasyon) ve ağrıyla seyreden diş eti iltihabı (gingivit), ağız içi iltihabı (stomatit), boğaz iltihabı (farenjit), bademcik iltihabı (tonsillit) ve pamukçuklarda (aftöz lezyonlar),
- Ağız ve boğazda mikroorganizmaların üremesinin durdurulması, yutma işlevinin rahatlatılması ve diş eti rahatsızlıklarında belirti giderici olarak,
- Diş hekimliğinde işlemlerden önce ve sonra,
- Radyoterapi (ışın tedavisi) ve kemoterapi (ilaç tedavisi) sonrası veya diğer nedenlere bağlı ağız içi yaralarda (mukozit),
- Diş plaklarının önlenmesinde kullanılır.

2. KLOORHEX PLUS'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

KLOORHEX PLUS'ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

- Flurbiprofene, klorheksidin'e veya ürünün formülünde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı hassasiyetiniz varsa,
- Asetilsalisilik asit veya diğer steroid olmayan antienflamatuvar ilaçlara karşı hassasiyetiniz varsa,
- Önceden bronkospazm (bronşiyal daralma nedenli nefes alma güçlüğü), asetilsalisilik asit ya da diğer steroid olmayan antienflamatuvar ilaçların kullanımına bağlı nezle (rinit) ya da kurdeşen (ürtiker) geçirdiyseniz,
- Mide ve oniki parmak bağırsağı mukozasında oluşan yaralarınız (peptik ülseriniz) varsa veya geçmişte bu hastalığı geçirdiyseniz.
- Hamile iseniz veya çocuk emziriyorsanız, KLOORHEX PLUS'ı kullanmayınız.

KLORHEX PLUS'ı ařağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eęer,

- Böbrek yetmezlięi, kalp yetmezlięi ya da karacięer yetmezlięiniz varsa.
- 12 yařın altında kullanılmamalıdır.
- 12 yař ve üzerindeki çocuklarda doktor tavsiyesiyle kullanılmalıdır.
- Aralıksız olarak 7 günden fazla kullanılmamalıdır.
- KLORHEX PLUS, içerięindeki klorheksidin glukonat nedeniyle, ağız içinde, dil ve diř üzerinde geri dönüşümlü renk deęiřiklięi yapabilir. Geri dönüşümlü olan bu renk deęiřiklięi, ilacın kullanımı kesildikten sonra kendilięinden ortadan kalkacaktır.
- KLORHEX PLUS yalnızca ağız içinde kullanılır; gözler ve kulaklar ile temas ettirilmesinden kaçınılmalıdır.

Bu uyarılar geęmiřteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geęerliyse lütfen doktorunuza danıřınız.

KLORHEX PLUS'ın yiyecek ve iecek ile kullanılması

KLORHEX PLUS'ın kullanım yolu nedeniyle yiyecek ve ieceklerle etkileřimi yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

Hamile iseniz KLORHEX PLUS'ı kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduęunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

KLORHEX PLUS kullanılırken emzirmeye son verilmeli ya da ilaç kesilmelidir.

Ara ve makine kullanımı

KLORHEX PLUS'ın araba ve makine kullanmaya etkisi konusunda alıřılmamıřtır, fakat farmakodinamik özellikleri ve genel emniyet profiline dayanılarak bir etki oluřması beklenmez.

KLORHEX PLUS'ın içerięinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün, sorbitol ierdięi için, eęer daha önceden doktorunuz tarafından bazı řekerlere

karşı dayanıksızlığınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

KLORHEX PLUS'ın etkin maddelerinden flurbiprofen furosemidin diüretik faaliyetini nadiren azaltabilir. Ayrıca, flurbiprofen nadiren antikoagülan ilaçlarla etkileşime girebilir. Bunun yanı sıra flurbiprofenin digoksin, tolbutamid ve antiasit ile bir etkileşimi bulunmamaktadır.

KLORHEX PLUS içeriğindeki klorheksidin glukonatın diğer ilaçlarla etkileşimi ile ilgili herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. KLORHEX PLUS nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Seyreltilmeden kullanılmalıdır. 10 mL gargara solüsyonu günde iki veya üç defa çalkalama veya gargara yapılır. Aralıksız olarak 7 günden fazla kullanılmamalıdır.

Uygulama yolu ve metodu:

KLORHEX PLUS ağızda çalkalamak ve/veya gargara yapmak içindir. Gargara yaptıktan sonra kalan kısım dışarı atılmalı, yutulmamalıdır.

- **Değişik yaş grupları:**

Çocuklarda kullanımı:

12 yaş altı çocuklarda kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlılarda kullanımı ile ilgili veri bulunmamaktadır.

- **Özel kullanım durumları:**

Böbrek yetmezliği:

Böbrek yetmezliği olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

Eğer Klorhex Plus'ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla Klorhex Plus kullandıysanız:

Klorhex Plus'tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Klorhex Plus'ı kullanmayı unutursanız:

İlacınızı almayı unutursanız bekleyiniz ve bir sonraki dozunuzu zamanında alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Klorhex Plus ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

Klorhex Plus ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler hakkında bir bilgi bulunmamaktadır.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, Klorhex Plus'ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa Klorhex Plus'ı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

- Alerjik reaksiyonlar
- Aşırı duyarlılık reaksiyonları (hipersensitivite)
- Ani gelişen nefes darlığı, ciltte döküntü, yüzde ve/veya dilde şişme (anafilaksi)

Bunlar çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Klorhex Plus'a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

- Hassasiyet bulguları
- Lokal irritasyonlar
- Ağız içinde, dil ve diş üzerinde geri dönüşümlü renk değişikliği

- Tat almada deęişiklik
- Ağızda ięne batması ve yanma hissi
- Ağız kuruluęu veya susuzluk hissi
- Diş taşı oluşumunda artış

Bunlar KLOORHEX PLUS'ın hafif yan etkileridir.

Eęer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenlilięi hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5. KLOORHEX PLUS'ın saklanması

KLOORHEX PLUS'ı çocukların göremeyeceęi, erişemeyeceęi yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Çökelti görüldüğünde kullanmayınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra KLOORHEX PLUS'ı kullanmayınız.

Eęer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz *KLOORHEX PLUS'ı kullanmayınız.* Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre, Şehircilik ve İklim Deęişikliği Bakanlığı'na belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat Sahibi : DrogSan İlaçları San. ve Tic. A.Ş.
Oğuzlar Mah. 1370. sok. 7/3 Balgat-ANKARA

Üretim Yeri : DrogSan İlaçları San. ve Tic. A.Ş.
06760 Çubuk / Ankara

Bu kullanma talimatı ../../. tarihinde onaylanmıştır.