

KULLANMA TALİMATI

ETOVER 100 mg/ml Sprey, Çözelti

Deri üzerine uygulanır.

- **Etkin madde:**50 ml sprey çözeltisi 5 g etofenamat içermektedir.
- **Yardımcı maddeler:** Makragol 400, propilen glikol, sitrik asit çözeltisi, izopropil alkol.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

Bu Kullanma Talimatında:

1. **ETOVER nedir ve ne için kullanılır?**
2. **ETOVER'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **ETOVER nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **ETOVER 'in saklanması**

Başlıkları yer almaktadır.

1. ETOVER nedir ve ne için kullanılır?

ETOVER, kutuda, püskürtme adaptörü bulunan 50 ml çözelti içeren renkli cam şişede sunulur. Açık sarı renkte, hemen hemen berrak çözelti görünümündedir.

ETOVER, etkin madde olarak etofenamat içerir.

Etofenamat, steroid olmayan (kortizonsuz) anti-romatik (romatizma tedavisi) ilaçlar grubundadır ve iltihap/inflamasyon giderici (anti-inflamatuvar) ve ağrı kesici (analjezik) özelliklere sahiptir.

ETOVER, ařağıdaki durumların tedavisinde kullanılır:

- Spor yaralanmaları gibi k nt travmalardan sonra el ve ayaklardaki akut ezilme, burkulma ve zorlanmalara baęlı aęrılı durumlar.
- Diz eklemi iltihabı durumlarında, eklem evresi yumuřak dokulardaki (bursa, tendon, baęlar ve eklem kaps l ) aęrılı durumlar.

2. ETOVER'i kullanmadan  nce dikkat edilmesi gerekenler

Herhangi bir ilacı kullanmadan  nce doktorunuza ya da eczacınıza danıřınız.

ETOVER'i ařağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eęer,

- Etofenamata veya ETOVER'in ierdiği maddelerden herhangi birine karřı veya dięer aęrı kesici ya da romatizma ilacına (steroid olmayan anti-inflamatuvar ilalar) ařırı duyarlılıęınız (alerjiniz) varsa.
- Uygulamanız gereken cilt b lgenizde egzema, aık yara, inflamasyon veya enfeksiyon varsa.
- Dudak, burun ii ve g zler gibi mukoza alanları  zerine uygulamayınız.
- Hamilelięin ge evresinde (altıncı aydan sonra) iseniz.
- 18 yařından k  kseniz.

ETOVER'i ařağıdaki durumlarda D KKATL  KULLANINIZ

Eęer,

- Astım, saman nezlesi, burun mukozasının kronik řiřkinlięi (nazal adenoid olarak da adlandırılır), kronik obstruktif solunum yolu hastalıęınız veya kronik solunum yolu enfeksiyonunuz varsa,  zellikle de bunlar saman nezlesi benzeri klinik bulgularla birlikteyse.
- Bařka maddelere karřı, deri reaksiyonları, kařıntı veya  rtiker řeklinde alerjik reaksiyonlar yařıyorsanız.

ETOVER, cilalı mobilya veya plastik y zeylerde hasar ve renk deęiřiklięine yol aabilir. Bu nedenle, ETOVER'i uyguladıktan sonra ellerinizi yıkayınız veya yukarıdaki maddelerle temastan kaınınız.

Bu uyarılar gemiřteki herhangi bir d nemde dahi olsa sizin iin geerliyse l tfen doktorunuza danıřınız.

ETOVER'in yiyecek ve iecek ile kullanılması

Uygulama yntemi aısından yiyecek ve ieceklerle etkileřimi yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan nce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

ETOVER hamileliėin altıncı ayından sonra kullanılmaz. Bu dnemden ncede doktorunuz kullanmanız gerektiėini belirtmedike ETOVER'i kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduėunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan nce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

Etofenamatın anne stne kk miktarlarda gemesi nedeniyle ETOVER'i uzun sreli kullanmayınız ve gnlk dozu kesinlikle ařmayınız. Bebeėinizin emzirilmesi sırasında, ilacın bebeėe gemesinden kaınmak iin gės blgesinde ETOVER kullanmayınız.

Ara ve makine kullanımı

ETOVER'in ara veya makine kullanma becerinizi etkilediėine dair bilgi yoktur.

ETOVER'in ieriėinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında nemli bilgiler

ETOVER'in ieriėinde bulunan propilen glikol, ciltte tahriře neden olabilir.

Diėer ilalar ile birlikte kullanımı

Etofenamatın deri zerine nerildiėi řekilde kullanımında herhangi bir ila etkileřimi bildirilmemiřtir.

Eėer reeteli yada reetesiz herhangi bir ilacı řu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise ltfen doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

3. ETOVER nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklıėı iin talimatlar:

Doktorunuz hastalıėınıza baėlı olarak ETOVER dozunu size syleyecektir. Doktorunuz tarafından bařka trl belirtilmedike ařaėıdaki talimatlara uyunuz.

ETOVER'i, vücudunuzun etkilenen kısımlarına ve çevresindeki alana, günde 4 kez 7 püskürtme (1 püskürtme 18 mg etofenamata eşdeğerdir) şeklinde uygulayınız.

Uygulama yolu ve metodu:

ETOVER sadece derinize dışarıdan uygulama içindir. Asla yutmayınız.!

ETOVER'i etkilenen bölgeye 1 veya 2 kez püskürttükten sonra hafifçe ovarak yediriniz ve kurumasını bekleyiniz. Doktorunuz belirtmedikçe üzerini bandajla kapatmayınız.

ETOVER ile tedavi sürenizi doktorunuz size söyleyecektir. Spor yaralanmaları gibi künt travmalarda genellikle bir haftalık tedavi yeterlidir.

Romatizmal hastalıklar için, 3-4 haftalık tedavi çoğu vakada yeterli olmaktadır. Eğer şikayetleriniz devam ederse, daha fazla tedavinin gerekip gerekmediğini belirlemek için doktorunuza danışınız.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı:

Çocuklar ve ergenlik dönemi yaş grubunda etofenamat ile deneyim olmadığından, 18 yaşın altındaki hastalarda ETOVER kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda (65 yaş üzeri) kullanımı:

Doz ayarlamasına gerek yoktur.

Özel kullanım durumları

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Doz ayarlamasına gerek yoktur.

Eğer ETOVER'in etkisinin çok güçlü ya da zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla ETOVER kullandıysanız

Eğer deri üzerine önerilen dozdan daha fazla kullandıysanız, ETOVER'i deriden uzaklaştırınız ve su ile yıkayınız.

ETOVER'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

ETOVER'i kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

ETOVER ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Bulunmamaktadır.

4. Olası yan etkiler

Tüm ilaçlar gibi, ETOVER'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

İstenmeyen etkilerin değerlendirilmesi aşağıdaki sıklık bilgilerine dayalıdır.

- Çok yaygın : 10 hastanın en az birinde görülebilir.
- Yaygın : 10 hastanın birinden az fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
- Yaygın olmayan : 100 hastanın birinden az fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
- Seyrek : 1.000 hastanın birinden az fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
- Çok seyrek : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
- Bilinmiyor : Eldeki verilerden hareketle sıklık derecesi tahmin edilemiyor.

ETOVER , geniş cilt yüzey alanlarına ve uzun süreli uygulanırsa, etofenamat içeren ilaçların sistemik kullanımlarından sonra görüldüğü gibi spesifik organ sistemlerini veya tüm vücudu etkileyebilecek yan etkilerin gelişmesi olasıdır.

ETOVER için bildirilen istenmeyen etkiler

- Yaygın olmayan:
- Ciltte kızarıklık
 - Kaşıntı
 - Yanma hissi
 - Deri döküntüsü
 - Bazen kabarcıklar ve ürtiker tarzı bölgesel deri reaksiyonları
- Seyrek:
- Aşırı duyarlılık reaksiyonları
 - Bölgesel alerjik reaksiyonlar (temas dermatiti)

Bu ilacı kullanmayı bıraktığınızda, cilt reaksiyonları hızla ortadan kalkacaktır. Bu nedenle, başka bir spesifik uygulama yapılmasına gerek yoktur.

Eğer kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5. ETOVER’in saklanması

ETOVER’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25 °C’nin altında ki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ETOVER’i kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

Kentfarma İlaç A.Ş.
Beykoz / İSTANBUL

Üretim Yeri:

Farmamag Ambalaj San. Ve Tic. A.Ş.
Avcılar/İstanbul

Bu kullanma talimatı 07.11.2023 tarihinde onaylanmıştır.